

PROMPTVARIVM SINGVLÆ VACVATIONIS

Cacochymix rectè administrandæ.

IN QVO

DE MORBI MAGNITVDINE CACOCHYMA
vrgente, per se cacochymix sublationem sua
natura exoptante, tractatur.

*Idcirco GENERA ET SPECIES TVM MORBI MAGNITVDINIS
cacochyma, tum purgationis cacochymix exactè diluuntur.*

Hinc mensura, modus, locus, ac tempus educationis humorum declarantur.


Quocirca omnis Controuersia, quæ in quocunque euentu difficillimo
Medico occurrere potest, de cacochymix educatione, rectè
executioni mandanda, inuenitur, & conciliatur.

*Cuncta Hippocratis, & Galeni maximè autoritatibus, decretis, rationibus, experimentis, ac
exemplis ad verbum expressis illustrata: & in duos diuisa
libros, atque explanata.*

Cum Indice locupletissimo, & vtilissimo.

AVTORE VALERIO MARTINIO VENETO,
Philosopho, & Medico.

SVPERIORVM PERMISSV, ET PRIVILEGIIS.



V E N E T I I S, M D C X X V I I I.

Apud Io. Baptistam Combum.





P R O M P T V A R I I S I N G V L Æ V A C V A T I O N I S

Cacochymia rectè administrandæ
OMNIVM RERVM NOTABILIVM
INDEX AMPLISSIMVS, ET VTILISSIMVS.



A



*A*bsynthij cremor sua amaritudine
bilem à ventriculo euacuat, &
ventriculum roborat. 59.b
Albus subducitur tantum ab acre,
vel mordaci, falso, vel nigro expn
pultricem irritante facultatem.
65.c non autem alio modo.

Alui fluor in quo blandè purgandum, & in quo nihil pur
gandum. 42.a. & b

Alui fluente non est purgandum. 42.b

Alui fluor vomitu eripitur. 48.e

Alui fluor vide fluorem alui.

Animi delinquentes facillè, non sunt purgandi. 41.a

Ars medica in duas secatur partes ab Hipp. 1.a

Aspèctum ferocem, & obliquè videntes fortiter purgan
di qui non sunt. 41.a

Asthmatici spiritus non ab Hipp. vocati exaltè, seu vehe
menter purgandi non sunt. 39.a

Attractionis causa vel calor est, vel dolor, vel ingens re
siccatio 90.c. & d. & 51.a. & b. vel inedia 51.c. est.

Atre bilis vires, prauitas, natura qualitates, & sympto
ma. 64.b

In augmento febris quando exhibendum lenè lenienti.
64.d

Augmentum morbi cum urina signis concoctionis ma
nifesta incipit, qua concoctio manifesta est media in
ter debilem, & perfectam concoctionem reposta, 30.
d. & in quarto die incipit manifestissimè. ibid.

In augmento febris mali moris. ad ventriculi regionē,
propterea depuranda sanguinea massa, tanquam ad ter
minum euacuationis totius corporis, per quod facilius
puridam crassius cinerulentum educitur puridum id
transmissum, si non euacuetur, & partim coniepere
tur, tunc morbus deterior fieret, et recrudesceret, hinc
plura contingere mala; cum ex eo purida cinerulenta

Tomus secundus.

sanguinea massa secata, ac impura redderetur folio

64.b. & c

Autor cur de magnitudine morbi cacochymia egit. 1.a

& 2.a.b. & c

B

*B*ilbi, & blesi non sunt solatini purgandi pharmacia
41.e

Balnea aqua potestase, & aliu frigidè in quibus conue
niant morbis declaratur 62.c. & d. & 63.a

Bilem remedia euacuanda à ventriculo ex Gal. 59.b

Bilis flama sua lenitate ascendit, ideo per vomitum facillè
educitur. 53.d

Bilis fluxionibus lac praebebat Hippoc. quatuor de causis.
48.a. & 55.c. & d

C

*C*acochymia quid sit. 6.a. & b. & 11.e. & 22.d
Cacochymia vel vniuersalis, vel particularis ibid.

Cacochymia prauus succi triplex nempe tam in prima
qualitate, quam in qualitate gustabilis, quam in impuri
tate aequè cum excrementosa, tum putrida. 11.c. & d

Cacochymia non putrida, sed excrementosa vitium est
concoctionis f. cultatis coellicris partis coquentis, qua
in suas diuiditur differentias. 23.a

Cacochymia quot modis considerari potest. 23

Cacochymia in hoc opere accipitur ut ad magnitudinem
& ad euacuationem referatur. 23

Cacochymia ad euacuationem molendam, vel non agen
dam relata tresdecim habet differentias, qua singilla
tim in hoc opere dilucidanda sunt. 23

Cacochymia prima differentia declaratur, qua ex reme
diis est, nullo solatio et ducenda remedio, quod ostendit
& viginti rationibus probatur. 24.25. & 26

Cacochymia secunda differentia, qua ex concoctis, ne re
crudescat euacuanda est. 27. & 28

Index locupletissimus

Cacoehymis bona *invenitio* tantum sit, qua *concoctione*, & *discretione* natura habet. 27. b
Cacoehymia triū differentia, quæ parit *concoctio* medio quodam modo *subpurganda* venit. 29. b. c. & d. et 30. & 31. & 32. & 33
Cacoehymia *semicollis* *concoctio* *inebriativa* in augmenti principio tam in morbis acutis, quam in eructis magnis *subpurganda* est. 29. b
Cacoehymia *subcollis* *subpurganda* est signum *diagnosticum* ex urina desumptum. 29. c
Cacoehymia *subcollis* *subpurganda* in acutis simpliciter ante diem quintum educenda est. 29. d. & 30. a
Cacoehymia *semicollis* *subpurganda* secundum signum ex ventris murmure acceptum. 29. d
Cacoehymia quarta differentia, qua *proprie* *turgens* est. 34. 35. 36. 37. usque ad 46. a
Cacoehymia educenda *mensura* a *vacuanda* non a *efficacia* magnitudinis *cacoehymia*, nec a *copia* a *cacoehymis* desumenda est, sed a *virium* robore, quo ad *vicem*. 7. b. & c. & 8. a
Calor attractus *fluxionem* vel *naturalis*. 50. d. vel *præternaturalis*, ac *dicat* aliis, qui quinquæ modorum generibus contingere potest. 51. a
Caput *purgantia* *hermutoria*. 45. c. in dolore capitis.
Capitis dolores quos homines ad *purgantiam* alui nam ineptos reddunt, & quos non reddunt. 37. d
Capitis afflicti ad *fluxione* oritur *vehementis* *purgatione* requiritur per *secessum*. 47. b
In eardialgia leniente *purgabat* Hipp. 56. a
Cardialgia *purgatio*. 47. d
Cardialgia in quibus agitis primo die, seu quarto die ceciderunt. 68. a
Cardialgia recte curanda *vesicantiæ* competunt. 72. a
Celiaca *passione* facile vexantes non sunt *purgandi*. folio 43. b
Cassa *lentissima* sex conditiones continet; hinc in febris augmento maligna danda est, si eo leni *leniente* opus fuerit. 65. a
Cassa *solitaria* natura ex Amicehus, Mafur, Matheolo, Sarrapione, & Resti ibid. b. & c
Cassa *solitaria*, nempe *lentissima* quia calida in primo gradu est quomodo refrigerat. ibid.
Cassa *lentissima* sua *lentissima* *acredine*, & *mordacitate* *spasmodicam* *expultricem* irritando, *ventrem* blandè *subducit*; attamen cum eius *acredo* *parvissima* sit, ideo crudos agitare non potest humores, sic dicas de *syro. ros. sol. & viol. sol.* minima in quantitate dato. 65. c. d
Cinis sanguinis in atram bilem transire inis vero aliorum humorum est tanquam pus *eintrulentum*. 63. c
Cibi abstinentiam observantes non sunt *purgandi*. 43. a. & b
Cibos non retinentes, non sunt *purgandi*. 41. a
Cinis sanguinis in febre continens, ac in atram bilem conversa per sudorem egreditur. 63. e
Cinis humoris putrescentis in febre, in aliquo retenta causa est efficiens putrescentia aliteris humoris alterius novæ ventura putredinis. 63. b
Concoctionis celeritatem inditū portendunt. 25. a. b. & c
Concoctionis perfectæ signa. 30. e. & d
Concoctionis debilis signa. 30. d
Concoctionis media, qua est inter perfectam, & debilem

concoctionem, signa *diagnosticæ* ibid.
Cinis humorum putrescentium est veluti pus, & *sedimentum* per urinam egreditur. 63. 2
Cinis hinc evacuat non modo per sudorem, sed etiam per halitum insensibilem totius corporis. ibid.
Cinis humorum putrescentium crassum pauca mater, quia mater ex parte per halitum excrevitur. ibid.
Cinis humorum putrescentium in febre, qua nec per sudorem, nec per halitum insensibilem evacuat, & a crassior pars, præsertim ad ventriculi regionem in augmento, & statu accessuum, & in declinatione transmittitur a natura ex Hipp. sententia. 63. d
Concoctio expectanda est in omnino crassus pituitosis morbis. 56. e
Cholea *purgatio* 47. d
Colique quid prius in nostro corpore. 35. d
Corpus phlegmonosum non est *purgandum*. 33. a
Corpora pura non sunt *purganda*. 42. a
Corruptum a natura alienum, magnitudinem morbi & *cacoehymiam* impuram putredinalem gignens educendum est. 59. c. & d
Corpora ita ad *purgationem* inepta esse valet, ut etiam magnitudine morbi *cacoehymia* præsit, vel incipiente, vel imminente indicant, ab ea inepta corpora nihil solutio remedio *purgandum* sit. 37. a
Corpora ad *purgationem* alui nam inepta quæ nam sint ex Galeno, & quatuor modis talia corpora contingere possunt. 37. d. 42. a.
Corpora splenitica, quæ idem sunt ad *purgationem* alui nam *vehementem*, & quæ inepta sunt. 38. d
Corpora ad alui nam *purgationem* inepta, attamen idem sunt ad *purgationem* vomiti faciendam. 40. b
Corpora ut ad alui nam *purgationem* agenda parata sint sex conditiones habere debent. 40. d
Corpora ad alui nam *purgationem* inepta, quæ sana sunt. 41. b
Corpora ex aliis sana cur *purganda* non sunt. ibid.
Corpora ad alui nam *purgationem* validam agenda inepta, quæ sunt ex Hippocrate primus locus 37. d. secundus locus. 38. d. tertius, quartus, quintus, & sextus locus. 40. c. septimus. 41. d. octavus. 42. a
Crudorum succorum proprietas est quod bisuci per se, immobiles sint, & ratione loci in quo sunt, ut contradiſtincti sunt si succi iam cocti, & si succi mori peccantibus, nec non si succi tenuibus aqueis, ut boraginis, & acerbis; hinc non evacuandi sunt. 24. a. b
Crudi humores cur *purgandi* non cedunt pharmaco. 24. 25. & 26
Crudo humore solutio remedio agitato quomodo morbus recrudescit. 25. b
Cruda, & ineoctionis aut aeris, aut dolores, aut diuturnitatem aut recidivas ostendunt. 25. b
Crudorum humorum coctio a natura, preparatio vero, si a æquatio ab Arte fit. 62. e
Cruditates extrema ubi aurum tinium, & illeritiam, & urinam erudam facit, non est *purgandum*, cum ibi corpora ad *purgationem* inepta sint. 40. a
Cus defectus sua natura est, & cur. 52. a. & ad eam, ob cuius defectum facile fluxiones delabuntur, ibidem: vel aliquo membro transmittente existente ad id, vel membro illo transmittente non existenti ibidem.

Rerum notabilium.

Clyster vnde debemus in augmento febris. 64. d. & quando nec etiam clyster acri vnde debemus ibid.
Clyster conueniens in augmento vniuersali morbi acuti 64. d. & quando nec etiam clyster praebeendus acris, immo laxatiuus tantum ibid.

D

Defectus partis vel naturalis 52. a. vel accidentalis ibidem; & causa defectus partis recensetur ib. b.
 Defectus partis potest esse causa transmissionis fluxionis etiam nullo existente transmittente membro. 52. a. b.
 Deficientes facili animo non sunt purgandi. 41. a.
 Debiles non sunt purgandi. 42. d.
 Declores cur ad purgationem aluiam validam inepti sunt 38. a.
 Derivatio quid sit. 48. c. d.
 Derivatio ad latera, & reuulso vero per longitudinem. 47. 48. & 49.
 Derivatio antrosum, & retrorsum molienda in cacochymia fluxionibus retrorsum, & antrosum tendentibus 50. b. Derivationem hanc cautio ibid.
 Dissipantibus quibus purgatio non est. 41. a.
 Diarrhaea vomitu eripitur. 48. c.
 Dieta vtentes non sunt purgandi. 43. a.
 Dieta per accidenti vacatio est. 46. a.
 Dolor membri fluxionem cacochymia, & sanguinis attrahit. 51. a. & b.
 Dolor, qui attrahit, d quibus pendet causis. 51. b.
 Dolores habentes eum vigili non sunt purgandi. 41. a.
 Dolores & capitis quos homines ad purgationem aluiam, validam ineptos reddunt, & quos non. 37. d.
 Doloribus purgatis lac meli seu sali comissum confert, pro bile purganda, & contemperanda. 66. b.
 Dysenteria vomitu tollitur. 48. d.
 Dysenterici valde purgandi non sunt. 43. b.

E

Egri tantum a morbi, visus magnitudine, vel efficacia, seu vehementia valde laeduntur, siue interficiuntur, ideo primum Medici negotium est eam dignoscere, & adimere magnitudinem. 1. a.
 Egri, quibus primo die interna vrbantur & extrema algebant, quibus secundo, tertio, quarto, vel quinto, sexto, septimo, vel octavo die, & quibus undecimo, duodecimo, decimoquarto vel vigesimo. 67. d.
 Enema conueniens in augmento vniuersali febris. 64. d. et quando nec etiam enema eompertus, nisi laxatiuum, ibidem.
 Enacuationes extrema omnes periculo referta. 7. e.
 Enacuationes totius corporis aequaliter facilia humorum. 45. c.
 Enacuatio ubi fieri nequit ibi reuulsi, ac derivatio fiat. 67. b.
 Enacuatio per vicinam sit partem. 33. a.
 Exangues non sunt purgandi. 42. d.
 Exercitium enacuatio est per accidenti. 45. d.
 Extrema partes quibus aligerunt. 67. d. & interna vrbantur.

F

Febrium putridarum essentia est calor igneus putredinalis, pungens, ac erodens cordi primo inhane-

scens, & inde toti corpori. 60. d.
 Febrilis calor, ex humoris putredine, quomodo in corde inest. 60. d.
 Febrilis calor, ex putredine in venis genita ortus, quomodo cordi inharebit. 61. a.
 In febris mali moris augmento vniuersali an lenius prebendum sit. 63. 64. v. ne ad 67. a.
 Febricitantes ardens febre igneus solutius non sunt purgandi. 41. d.
 Febris ar densissima curanda est tunc aliu frigida potione, tunc natatione frigida aqua aliu frigida ad putredinem arcendam. 62. a.
 Febris mediocri curanda est rarefacientibus, non autem frigidis potionibus aliu datis, neque natationibus in aqua aliu frigida ad ministratis. 62. a.
 In febris augmento putridum encroscit crassius per sudorem, per urinam, & per insensibilem baticum non eductum, a natura ad ventriculi regionem transmittitur pro tota depuranda a massa sanguinea, & tanquam ad terminum euacuationis totius corporis, ideo id diebus paribus euacuare debemus leuissimo leniente. 63. d. 64. a. b. & c.
 In febris mali moris augmento quando exhibendum lenientem. 64. d.
 Flatuosi solutius pharmaciis non sunt purgandi. 39. e.
 Flatuosi eum venarum interceptione affecti, sunt illi flatuosi ab Hippocrite positi, qui non sunt purgandi. 39. e. d.
 Flatuosi duplices sunt, vel enim ex cruditate, vel ex venarum interceptione, neutrius vero isolum solutius validioribus pharmaciis purgatio molenda adducit. 39. d. cum illi ad purgationem inhabiles sint. ibid.
 Fluor alui vomitu admittitur. 48. c. d.
 Fluor alui in quo blande purgandum, & in quo nihil purgandum. 42. a. & b.
 Fluor alui & ricus imminuit in declinatione vniuersali ortus, imandus est. 27. e. ne recidat fiat. 28. a.
 Fluor alui ante vniuersalem flatum ortus, cum symptomatibus sit, non est auferendus, sed omnino natura opus relinquendum. 27. d.
 Fluxio cacochymia retrorsum & antrosum ingruens Hippo. & Gal. exemplis, & autoritatibus declaratur 50. b.
 Fluxio humorum seu materia respectu terminorum lationum, & motuum considerantur. 46. c.
 Fluxio fieri potest ex sola succi inclinatione ad fluxionem ad aliquam partem, siue vltimo membro mandante, ob situalem iam posituram. 52. c. d.
 Fluxione humorum ex lationibus, ac terminibus desumptis quatuor modis sunt, ideo etiam quatuor alij lationibus, ac terminibus contrarie oppositis in contrarium euertere sunt. 46. c.
 Fluxio humorum in prima latione, quae duplex est per longitudinem sursum vel deorsum, scilicet curatur pharmaciis, aluiam, & vomina deiectione. 46. d. purgatione antipastica ibid.
 Fluxionis prima lationis exempli Hippo. 47. a. b. c. & d. & Gal. & auctoritates ibid. & 48.
 Fluxionis prima lationis de vena sectione, seu sanguinis missione diuisio, ac terminus renes sunt, de purgatione vero diuisio, & terminus diaphragma est. solia 47. b.

Index locupletissimus

Fluxionis secunda latioris deorsum tendētis cacochymia purgatio tenuissima antispasmodica vomitionibus molenda; & exēpla. & auctoritates à pedibus ordiendo, vsq; ad rhenus ascendendo. 48. b. & c.

Fluxionis cacochymia tertia lato à centro ad eentem superficiem ingruens purgatione tam vomitina, tam aluina de crinativa antispasmodica tollēda declaratur Hippoc. & Gal. exemplis, & auctoritatibus. 48. d. & 49. a. b.

Fluxionis cacochymia quarta latior, tollēda purgatione non antispasmodica Hipp. & Gal. exemplis, & auctoritatibus declaratur. 49. c. d. & 50.

Fluxionum causa, vel partis attrahentes, vel recipientes, vel transmittentes fortes sunt. 50. c.

Fluxio per modum attractionis facta vel à dolore, vel à calore partis attrahentis fit. 50. c. & d. vel ab ingenti siccitate. 51. b.

Fluxio per modum transmissionis facta à transmittente fit vel vniuersale, vel particulare. 51. d. et si interdum hæc fluxio fiat sine transmittente. 52. a.

Fluxionis per modum receptionis facta ab aliquo membro causa temperamentum plus infuso frigidum & humidum est. 52. a. & b.

Fluxionis per modum receptionis facta dispositio membrorum maior, & minor esse potest, ut rarior, laxior &c. 52. b. c.

Fluxio sine transmittente ob partis defectum transmittitur. 52. a.

Fluxionibus bilis lac dabit Hippocrates quatuor de causis. 48. A. & 55. a. d. etiam in hydropse ad ignem contemperandam medicamentis. 55. d. & 56. d.

Fractis quibus purgatio valida aluina non conuenit 41. b. sed tantum vomitiones conferunt ibid.

Frictiones enacuationes sunt per accidentis. 45. d.

Frigiditatis extremarum partium recte curanda vesicantia maxime conferunt. 68. d. & 69. & 70.

G

Glandulosa partes superflua facillime, recipiunt. 52. c.

Graciles nimis ad purgationes inepti. 42. e. & d.

H

Hiera colocyntidis dosis à Galeno statuta est dracmę quatuor, & quinque; & bis hæc dabit dosim in quinque diebus in alopetia pro reuellendo. 47. e.

Hieris simplicis Galeni dosis est ad duo coelestria aqua tribus cyathis desumpta, ac temperata. 58. d.

Humores proprio surgente declarantur à sol. 34. vsque ad 46. a. inde surgentes humores.

Humores crassi, viscidissimi, glutinosi, leni, & immobiles in ventriculo, siue in cavitate, siue superficie tunica ventriculi educi possunt 58. b. immolico enacuandi sunt ibidem Hiera simplicis Galeni. 58. c.

Humores enacuandi vbi est magnitudo morbi cacochymia vel presens, vel incipiens, vel imminet, seu letibalis, vel infelix, seu tadiosa, in morbis simpliciter acutis etsi non turgent, vel colli non sunt. 36. d. & a 29. vsq; ad 33. 46. a.

Humores non solum corrupti seu putridi sed etiam qui in via sunt ad putredinem enacuandi. 59. c. d.

Humores putridi quando per urinam sunt enacuandi. 60. b. & quando per aluam ibidem quando per sudorem ibidem.

Humores crudi cur solutino non cedant pharmaca. 24. e. 26.

Humores, qui relinquuntur in morbis reciduas facere, consensere. 28. a.

Humorum crudorum proprietas est quod bi humores per se immobiles sint, & ratione quoque loci, in quo existunt: ut contradi. Similiter autem ab humoribus tam colli, & ab humoribus motu peccantibus, acque ab humoribus tenuibus potentia passiva mobilibus, & acerbis. 24. a. b.

Hypochondriis excusis quibus purgatio aluina vehementis non conuenit. 40. a.

Hypochondria inflata à flatu, interdum turgida sunt, cum flatu simul cum sua vniuersa exitum facere querant. 35. c.

I

Ialura, quæ ex medicamento purgante in materia cruda exhibitio oriri solent, recensentur. 24. 25. 36. Ichorum nomina, natura genera, ac differentia. 57. a. b. & c.

Ichores, ut pravi statim educendi sunt. 57. a. b. & c. Ichoroides sanguis mordax, acer, effrenus, & prauus est in morbis acutis, & magnus. 63. b. ad cerebrum ascendens, & ledens. ibid.

Inedia per accidentis vacuatio est. 46. a.

Inediam amplectentes non sunt purgandi. 43. a. b.

Imbeciles non sunt purgandi. 42. d.

Iudicatio à partis figuratone. 59. a.

Inflatio totius corporis effectus est. 40. b.

Inflatio, inter quas inflationes adema continetur. 40. b.

Inflationes habentes purgandi non sunt. 40. a.

Iudicati acri in per acutis morbis, in Hippocratis historiis. 31. c.

L

Lac cum humidum sit, ventrem non subducit effectiue sed despostruit; Hinc lac egeri mele, vel sale, vel utroque acre ut alium subducere possit. 65. d. & 66. b. Lac dare ad ventrem subducendum non modo Hipp. verum etiam aliorum antiquorum sententia est. 66. b. c. d. & 67. a.

Lac doloribus purgationis valde conducit. 66. b. & fluxionibus sistendis. 66. c. & 67. a.

Lactis vel feri magnam efferebant copiam Antiqui 67. a.

Lac præbetur Hip. in bilis fluxionibus quatuor de causis 48. a. & 55. e. d. & in hydropse ad solutino ignem acrum contemperandam, & 56. d.

Lac asinum collium meli, salis admixtum ad aluam blandè subducendum, & ad humorem calidum siccu, & acrum contemperandum dabit Hipp. 33. d. & 66. c. & 67. a.

Laxatina lenientia vocantur, & cur. 65. d.

Lenientia cur laxatina. 65. d.

Lenientia effiebat Hippocrates ex solutino panca in quantitate datus. 56. c.

Lenientia in febribus augmento data quæ nem nocuerit a effiebat possunt. 63. a.

Lenientia nostro aro in vsu posita, quæ Hipp. & Gal. tempestate nota non erat quandoque in cruda materia tuto dare possumus. 26. c. & 31.

Lenientia nostro tempore adhibita, tutiorem enacuationem consequi possunt, quam solutino Hippoc. & Galeni aro cognita. 27. b. 31.

Lenientia

Rerum notabilium.

*Leniens medicamentum quomodo à purgante seu solutio
differit phar. maco. 4.4.a*
Lenientium in cacochymia purgatione praestantia. ibid.
*Lenientia quomodo per accedens emacinando refrigerant.
ibidem.*
*Leniens lenissimum an sit daudum in augmento vniuersa-
li. 63. vsque ad 67.a*
*Leniens lenissimum in augmento febris recte, ac ino pra-
beri potest, & quando, disquiruntur ex Hipp. & Galeni
experimētis, ac exemplis ad verbum expressis; qui lac
sali, melius mātum ut leniens lenissimus exhibebant.
66. & 67.a*
*Leniens Hippocratis. 33.d. 48.a. 55.d. & 56. d. & 66.
& 67.a. in augmento morbi acies dandum.*
*Leniens lenis in augmento febris dandum sex habet:
debet conclusiones 64.d*
*Lenientia per alium subducentia Hippocratis. v. 48.a. &
95. e. & d. & 56.a. & b. & c*
Leniens Hippocratis in cardialgia. 56.a
*Lien valem atram. 1. melancholicum aitrabris ait Hippo-
cratis. 28.d*
Lien melancholicus, & aqua sedes est 54.d. in margine.
Lienosa corpora ad purgationē idonea. 37.d. in margine.
Lien turgens illico purgandus. 35.e. & d
*Loci affecti dignosco admodum valet ad expurgandum
suecum loci lss. 60.b*

M

*Magnitudinis cacochymia magnum educens cacochy-
miam remedium adaequatur. 3.b*
*Magnitudo morbi non simpliciter magnum euacuans in-
fensum remedium, sed ut turgens est, & magna vis. 3.
b. & c*
*Magnitudo morbi cacochymia per se, & ex aliis propriis,
& proximē veget, ac ita virgō cacochymia, ut eius
et causa in mediata educatione per se etiam indicat. 2.
d. & 3. & 4.a*
*Magnitudo morbi cacochymia & morbofa, & cacochy-
mia est, sed ut cacochymia notior est, quam morbofa. 4.
b. & c*
*Magnitudinis morbi cacochymia genera, & species di-
gnoscentia sunt ibid.*
*Magnitudinis morbi cacochymia genera quatuor existūt,
nimirum quo ad copiam, ad qualitatem, ad impurita-
tem, & ad motum terminatum. 5.a.b.c. & d*
*Magnitudinis morbi cacochymia copiosa genera, & diffe-
rentie perpenduntur. 6.7. & 8*
*Magnitudinis morbi cacochymia genus in copia perspe-
ctum. 6.a.d. & 7.a.b. & c*
*Magnitudo morbi cacochymia copiosa vniuersalis, & so-
la in toto corpore est, & alia. 6.c*
*Magnitudo morbi cacochymia copiosa magnitudinis sāgu-
inis comixta, in illecebris flava, & nigra ibid.*
*Magniudo morbi cacochymia & sanguinea simul in at-
leicis sunt corporibus. 6.e*
Magnitudinis morbi copiosa differentia omnes. 6.d
*Magnitudo morbi cacochymia copiosa extensua, vel ob-
struclina. 6.d*
*Magnitudo morbi cacochymia copiosa venam sciudens
non datur. 6.d*
*Magnitudo morbi cacochymia copiosa quo ad vasa, vel
quo ad vires opprimens, & ouerans habetur. 6.d. &
7.a*

*Magnitudo cacochymia qualibet sibi contrariam aqua-
lem opas purgationem. 7.a*
*Magnitudinis morbi cacochymia copiosa signa diagnosti-
ca. 8.d. & 9.a*
*Magnitudo morbi cacochymia quo ad qualitatem intem-
perata in genere, & in differentiis exploratur. 9. b. &
c. & d. & 10.a*
*Magnitudo morbi cacochymia intemperata simplex calida,
& frigida, humida, & secca est. 9.b*
*Magnitudo morbi cacochymia intemperata composita ca-
lida, & humida, & calida, & secca, vel frigida, & hu-
mida, vel frigida, & secca inspicitur ibid.*
*Magnitudo morbi cacochymia intemperata simplex, &
composita omnis sibi contrariam, & adaequatam petit
cacochymia purgationem. 9.b. & c*
*Magnitudo morbi cacochymia intemperata calida, & sic-
ca à quo emanat 9.e. quae purgationem refrigeratiuam
& humectiuam flagitat ibid.*
*Magnitudo morbi cacochymia intemperata frigida, & hu-
mida à quo producatur. 9.d. quae caliditatem, & sicca-
tiam insinuat purgationem ibid.*
*Magnitudo morbi cacochymia intemperata frigida, &
secca quomodo promanet quae calidam cacochymia,
& humidam petit purgationem. 9.d*
*Magnitudo morbi cacochymia intemperata calida, & hu-
mida quomodo cacochymia, seu sua causa immediata
refrigeratiuam & siccatiuam inducat purgationem.
9.d*
*Magnitudo morbi cacochymia in qualitate etiam in secū-
da qualitate inuenitur; quae in arte medica magnam
vim continet. 10.a*
*Magnitudinis morbi cacochymia intemperata nota inue-
stigantur. 10.b.c. & d*
*Magnitudo morbi cacochymia impura tam in genere,
quam in differentiis seu speciebus. 11.a.b.c. & d*
*Magnitudo morbi cacochymia impura excrementosa, &
putrida est 11.b*
*Magnitudinis ipsius impura excrementosa differentia,
ibidem.*
*Magnitudo morbi cacochymia impura putrida tres ha-
bet differentias. ibid.*
*Magnitudinis morbi cacochymia impura tam in genere,
quam in speciebus asumpta signa diagnostica. 12.a. b*
*Magnitudo morbi cacochymia siccus & fluxura, & flu-
xa. 12.c. & d. & 13.a*
*Magnitudinis morbi cacochymia siccus fluxura, & flu-
xa nota 13.b. & c*
*Magnitudinis cacochymia ut morbofa tria sunt genera,
sex vero sunt differentia. 13.d. & 14.a*
*Magnitudinis cacochymia, ut morbofa primum genus est
distantia recessus à statu naturali & est amplexum ibid.*
*Magnitudinis morbi cacochymia ut morbofa secundum
genus est à propria partis lesa substantia suo originali
temperamento inuicem acceptum. 13. d. cuius generis
prima differentia. 14.b.c.d. & 15.a. secunda differen-
tia. 15.b.e.d. & 16.a. tertia differentia. 16.b.c.d. &
17.a. & b*
*Magnitudinis morbi cacochymia ut morbofa tertium ge-
nus est à facilitate membri lesa perspicuum: 13.d. cuius
prima differentia reperitur. 17.d. & 18.a.b. & c.
secunda differentia. 18.d. tertia differentia. 19.a. b. &
& d*

Magni-

Index locupletissimus

Magnitudo morbi quacunque ex tribus morborum principibus emergere potest. 20. d. & 21. a. & b
Magnitudo morbi & coeconomya, ex putredinis in venis, & arterijs facta tribus differentiis, quae nam oriatur, dilucidatur. 61. b. e. d
Magnitudo morbi & coeconomya, quae sit in differentia prima putredinis secunda, ac tertia. 61. a. b
Materia turgens propter omnino dilucidatur fol. 34. usque ad 46. a. vide turgentes humores.
Medicari quid intelligat Hipp. 3. 1. a
Medicamenta omnia sunt, quae agrotantium praesentem remouent statum; & praecipue omnia valentiora medicamenta. 2. b
Medicamenta valida robustis praebenda; debilibus vero debilibus. 3. 3. a. & b
Medicamenta purgantia sunt ignea spiritibus & calidi innati vel luri flamma ignis in ventro peragitantur; ac sanguis bilisescit; sanguis vero, & caro coalescit, & ignescit. 26. a. & d
Medicamenta solutiva sanis corporibus obesse solent. 2. 5. d
Medicamenta purgantia in febre & data quae nam inferant noxia. 26. a. & b
Medicamenta solutiva in lassitudinibus exhibita, quae mala faciant. 26. a. & b
Medicamenta solutiva nocent in materia cruda vel sua ignea facultate, vel ratione improprietatis, quae improprietate est vel humoris, vel viae, aut corporis ad purgationem inepti. 26. d
Medicamenta purgantia lenia quarto die danda in morbis simpliciter acutis, & magnis, cum ibi fuit subcollio materia media concoctione facta inter debile, & perfectam concoctionem; quae medicamentum ab Hipp. indicationem inuentionis vocatur. 3. 2. e
Medicamenta solutiva ignis, in febre, & extra febrim emolumenta, & damnum. 3. 7. b. & c. d. mmm. 46. b
Medicamenta purgantia non emolumenta. 43. d
Medicamenta solutiva quomodo a lenientia differunt. 44. a
Medicamenta purgantia, vel solutiva quomodo per accedens emacuando refrigerant. ibid.
Medici praecipuum negotium quale est. 1. 1. a
Medicus agros & vitta graui impendens periculo repara re nequit, nisi morbi agnouerit, & eripuerit magnitudinem, seu efficaciam. 1. a
Medici Ventiarum in morborum augmento lenia lenientia praesent agrotantium emolumento. 63. a
Mel mistissimum album subducit. 65. e. ab acedinem mittit.
Mensura remedi veniendi coeconomyam non a vehementia magnitudinis, nec de copia coeconomya deprehendenda, sed de virium robore. 7. b. quod ad vicem. 8. a
Melancholia sua gravitate descendit. 52. d. ideo per feculentum purganda. 2. b. d.
Morbi pessimi sunt ex bile flama, & pituita simul orti, ut in Hermocrate, & Apollonio Abdera fuerunt. 64. e
Morbi acuti, & magni semper humoris biliosi feniatri agentis sanguis rebotouet morbus, acerr, effrenis, & prauis melle cerebrum ledens. 63. b
In morbis simpliciter acutis, & magnis Hipp. solutiva pharmacia & eire dicitur danda. 56. a
Morbus quomodo reuertatur a pharmaco solutiuo interm pssim d. 40. 2. 5. b
In morbis diuturnis concoctio expectanda, in acutis vero si materia turgat illico purgandum est. 28. a

In morbis non vehementer acutis praedeterminatione humorum finientium, & fluxurum facienda purganda. 29. a
In morbis acutis etiam collatio expectanda veniunt, nisi materia turgat, vel proprie, vel improprie. 28. d. in mer gime.
In morbis vehementer magnis clysmata tantum conueniunt, vel lenientia in principio. si vero non vehementer magni sint, post vena sectionem purgandum est. 23. d. in margine.
Morbi principium triplex. 30. b
Morbi principium acuti simpliciter exallit ad tertium, usque dicta pertrans in manifesta eruditate est, sed in manifesta collatione terminatur, ubi augmentum principium incipit. 30. b
Morbi simpliciter acuti principium in tertio die desinit, ubi manifestum signum iam finis huius principij, quod principij augmentum apparet, quod ex concoctione manifesta media inter debilem, & perfectam concoctionem reposita cognoscitur. 30. e. & d
Morbi initium, inter quae etiam augmentum initium Hipp. posuit. Vnde in augmentum principij purgare & expectare, in tertia & coeconomya differentia, nam si quid mouendum in principio moue. 30. d
Morbi per acutis particularibus vehementer, magnis in principij purgatio a solutiuo ignis molenda non competit, nisi materia turgat. 3. 1. a
**Morbi valde acuti, vehementer, magnis sola vena braebij dextri hepatica sectio conuenit, ac deinde enacuta Hippocratis, & Gal. decreto 3. 1. b sed lenientia dandi possunt ibidem in margine & 3. 2. a. 3. 3. d
Morborum, qui acuti sunt, ac etiam interdum chronici, & quibus primo vena sectio, deinde purgatio conferret, catalogum fecit Hipp. 3. 1. a. & b
Morbi per acutis secundo die symptomata vehementia incipientia contingere solent. 3. 1. b
Morbi per acutis universalibus nec etiam Hipp. solutiuum dabitur, amen lenientia frigida exhiberi possunt. 3. 1. e. & 3. 2. a. 3. 3. d
Mortui ex peracutorum morborum efficacia, in Hippocrate historijs. 3. 1. b. e
Mortui omnis corporis humani euacuatio est per aecidit. 45. d. balnea euacuaciones sunt. 45. d
Mulieris menstrua non sunt purganda. 43. a
Murmura ventris recentia signum est humorum semicorum subpurgandorum euacuatione inchoata. 29. d. & 30. a
Murmura ventris veterata, quae graui cludones appellantur signum non est humorum semicorum subpurgandorum. 30. a**

N

Noxia, quae lenientia efflere possunt in augmento febri maligna data. 63. a
Noxiarum medicamentorum solutiuum in febre. 37. b. 40. b

O

Obstructiones quomodo geminantur a materia cruda solutiuo lenientia remedio. 25. e. Duplex obstru ctionum generatio ibid.
Occasio, quae praecipue momentanea eire a rellit agendum est, a Medico exallit agnosci debet. 2. a. b. & c. & praesertim de purgatione humorum administranda.
Occasionis Hipp. accitimus ibid.

Partes,

Rerum notabilium .

Partes, quæ diffusius recipiunt excrementa, diffusius quoque ab alijs excrementis liberantur. 52.c
 Partes spongiformes apte sunt fluxionem recipere, & ad eas partes facile fluxus cacochymiae transmittitur. 52.b
 Partis mandam i prius studendum est, deinde parti recipienti incumbendum est. 52.c
 Partes, quæ facilius, vel difficilius recipiant. 52.c. ideo in his scribis fieri potest. ibid.
 Partes, quæ magis, & minus sunt purganda. 52.a.b
 Paraphrenitis quibus agnatisbus secundo die, tertio, quarto, quinto, sexto, septimo, octavo, nono, &c. incipit. 68.a. & b
 Paraphrenitis recte curanda phanigmata cõueniunt. 72.c
 Pellicula, & pulmo per tussim expurgatur. 45.c.d
 Phlegmatisa recte administranda exatid distinguuntur. 69.70.71.72. & 73
 Pituita vitrea, aut acida si ad ventrem, & intestina descendere, tormina, ac rosiones facere possunt. 26.d
 Pituita si humoris tenuis aquosi fluxu commissa fuerit, educi potest. 56.d
 Pituita in intestinis existens, nonquam vomitu renellenda; immo enatae acriter educenda. 49.c
 Pituita prius concoquenda, & deinde educenda. 56.c
 Pingues qui nam sunt. 42.b
 Pingues nimis, valde purgandi non sunt. 42.b. & c
 Polemoni purgans medicamentum non conuenit ratione materia iam in phlegmone fluxa. 48. a. attamen in fine, propter medicamentum Gal. 28.c. & d
 In principio vero lenientia conueniens ratione materia fluxus ibid.
 Preparatio humorum educendorum triplex est, nempe humoris, vis, & corporis virtutibus validis prædicti 42.d
 Preparatio citis facienda ubi quarto die surgare conuenit in principio augmenti. vniuersale morborum simpliciter acutorum 32.c. & d
 Preparatio citis vnius diei agenda ab Hippo. Galeno, & Orisasio statuta. 43.d
 Pulmo, & pellicula per tussim expurgatur. 45.c.d
 Pueri solutius non sunt purgandi remedijs. 43.a
 Primi generis putredinis tres species. 61.a
 Purgantia medicamenta castigabat Hipp. & isthac minimis in quantitate præbebat loco lenientium. 56.c
 Purgantia medicamenta euacuando quomodo per accidens refrigerant. 44.a
 Purgans medicamentum quomodo a leniente differt. 44.a
 Purgare ubi plus, & minus. 53.a.b
 Purgantia sterminatoria capui. 45.c. in capitis dolore.
 Purgantia a morbi magnitudinibus cacochymis, tum præcætibz, tum inuoluentibus, seu incipientibus indicantur. 46.d
 Principium morbi simpliciter acuti ad tertium vsque diem perdurat. 30.b
 Principium morbi acuti simpliciter in manifesta cruditate adest, sed in manifesta concoctione terminatur, cum ibi augmentum vniuersale incipiat. ibid.
 Principium morbi simpliciter acuti in tertio die terminantur, manifestum signum ex concoctione manifesta media inter debitum, & perfectam concoctionem reposita dignoscitur, ubi augmentum vniuersale incipit. 30.c. & d
 Principia morbi, in quibus Hippocrati augmenti princi-

pium posuit, ideo in augmenti in suo purgare oportet, in tertio cacochymia differentia, quia si quid mouendum in principijs moue. 30.d
 In principijs tantum solutius purgandum est, non autem in augmento. 36.c
 Purgantis agenda cautio in agenda opera cautio, prima & cautio secunda. 7.b
 Purgationes quando vsque ad animi desectum molienda sunt. 7.d. & 8.a. & b
 Purgationes cur in declinatione vniuersali omnino teneant. 27.c. & 28
 Purgationes non prope indicationem sed. procul a indicationibus faciendæ. 28.b
 Purgationes in materia concocta, in acutis simpliciter magnis, non exatid circa vigesimum diem, in exatid vero acutis ultra decimum quartum diem. 28.a. & b
 Purgationes in morbis inflammatorijs 28.b. iam materia tione facta ibid.
 Purgare solutius igneis pharmacis, in morbis peracutis iam vniuersalibus, quam particularibus, non licet, attamen lenientibus refrigerantibus tuto purgare, in his morbus, possumus. 31.a.b. & c
 Purgatio debita quarto die in simpliciter morbis acutis effici potest: ubi materia semicotta est, media concoctione inter debitum, & perfectam concoctionem. 31.d. & 29. & 30
 Purgatio in febris per vomitum in principio augmenti accessione sua, per secessum vero in fine accessione febris. 33.a. & b
 Purgatio in febre tertiana assidua. 33.b. ex Hippocrate.
 Purgatio solutius faciendæ febris cacochymis non conuenit. 33.c. nisi finita febre, ne fiat reuersio.
 Purgantia a solutius facta pharmaco, utilitas, ac damnum. 37.b. & c.d. annuum. 40.b
 Purgationes valida solutius facta pharmacis non conferunt quibus extensa sunt hypochondria, & qui deorsum, ac ad latera torquentes sunt, & obscuri videntur. 40.a
 Purgationes vt tuta fiant sex conditiones corporis purgandi requiruntur. 40.d
 Purgationes per vomitum sunt humorum turgentium, & peccantium supra diaphragma. 44.b
 Purgationes per alium sunt humorum turgentium, & peccantium infra diaphragma. 44.b.c
 Purgationes per vomitum, molienda patefunt per signa diagnostica. 44.c
 Purgationes per secessum agenda nota sunt per signa diagnostica. 44.c
 Purgationes recte molienda ex anni tempore, sursum per vomitum, vel deorsum per alium. 44.c
 Purgationes vomitionibus molita, sursum fluxiones cacochymiae deorsum ingruentes renellentes, exemplis, & autoritatibus Hipp. & Galeni declarantur. 48.b.c
 Purgationes alinis, & vomitina deriuatiua antispasmodicæ fluxionis cacochymiae a centro ad eam tendentis, Hipp. & Galen. exemplis, & autoritatibus declarantur. 48.d. & 49.a. & b
 Purgationes deriuatiua non antispasmodica Hippo. & Galen. exemplis, & autoritatibus dilucidantur. 49.c.d. & 50
 Purgationes antispasmodicæ prius molita remissa, & deriuatiua, postea non antispasmodica euacuatiua deriuatiua. 50.b

Tutæ

Index locupletissimus

Putredo quid sit. 60.b

Putredo in vasis duo generat. 1. & utrumque istorum generis tres habet differentias. 61.d

Putrescentium succorum differentia simplices. 61.d

Putredo tribus fit modis. 60.e.d

Putredinis secunda, ac tertie differentie succorum putridorum color, consistens, & odor, vario modo. 61.d

Putredinis in venis, & arterijs facta tres differentie. 61.b.e.d

Putrescentium humorum differentiarum simplicium, differentie composita novem sunt. 61.d. & 62

Putredinis venarum, & arteriarum quindecim differentie. 61.b

Putridi humores quando blandi, & quando valde purgandi sunt. ibid.

Putridorum semiputridorum curatio fit partim evacuando, partim alterando. ibid.

Putredo in febre intermittenti ubi fit. 60.c

Putredo scabris continentis, & continui inter lingua, & alas in venis est. 60.c

Putridum, seu coriuptum in carne quomodo evacuandum. 59.d. & 60.a

Putridum crassius cinerulentum, quod in febribus putridis nec per sudorem nec per insensibilem egreditur habitum ad venericis regionem a natura transmittitur tanquam ad terminum evacuationis totius corporis pro defecando sanguine, ut facilius vel a natura ipsa, vel ab artio auxilio longissimi lenientis, etiam in augmento dati diebus paribus medicinalibus ideo tunc tuto lenius id exhibere possumus. 63.d. & 64.a.b.e

Putredinis bubonis prima differentia, secunda, ac tertia. 61.a

Putridum a natura alienum, magnitudinem morbi cacoehymam impuram putredinem gignens educendum est. 59.e. & d

Quae relinquuntur in morbis recidivas facere consueverunt. 28.a

R **Aras totius corporis balneo, & alijs remedijs faciendum.** 62.a

Rauci, qui a d purgationem alvinam vehementem inepti sunt. 38.b

Recredefcunt morbi quomodo. 64.b.c.

Recredefcunt morbus a solutio intempestiva dato pharmaco, & quomodo. 25.b

Recredefcere quid sit. 63.a.b. in margine.

Remissio. 47

Rheumatici qui idonei ad purgationem alvinam validi, & qui inhabiles sunt. 38.e

S **anguine deficiente non sunt purgandi.** 42.d

Sana corpora nigra cur non sunt purganda. 41.b

Sana corpora humidam carnem habentia purganda non sunt. 41.b

Sana corpora secca non sunt purganda. 41.

Sanguinei homines igneis non sunt purgandi pharmacis. 43.d

Sana corpora cur purganda non sunt. 41.c

Senes valde non sunt purgandi. 43.a

Solutum medicamentum quomodo a leniente differt. 44.a

Soluta medicamenta evacuando quomodo per ventres refrigerant. 44.a

Stomatocoria caput purgia. 45.e

Succitas ingens membri causa est, ut membrum humiditatem suavitatem attrahat. 51.b

Sopor quibus agros, autibus contrigit. 68.b. & c

Sopores habentes valde purgandi sunt. 40.d

Sopori recte curando vesicantia plurimum conferunt. 68.d. 69.70

Splenitica corpora, qua apta sunt ad alvum, & valide molendam purgationem, & qua inhabilia sunt. 38.d

Subtissimi non sunt purgandi. 44.a

Subpurgationes in quarto die administranda in morbis simpliciter magnis, & acutis, ubi materia semicollata aperit, manifestia concessione media inter debilem, et perfectam concessione, quae media concessio ex virina concessione, & ex ventris recentis murmurare deprehenditur. 29.30. & 31.32

Stomacho laeso cur nec solutum pharmasum, nec vena scilio committit, nempe cum terminis sui evacuationis totius corporis prope eor existens. 64.a

T

T **otum venosum genus per vinum expurgatur.** 45.d

Transmissibilitas totius corporis, & variis balneo, & alijs curi admotis remedijs fit. 62.c

Turgescentes humores proprii dilucidantur a d. 34.ad 46.a

Turgentium humorum natura. 34.b

Turgescentes humores prima differentia cacoehymia, qua penitus cruda est opponitur. 34.b. & a secunda, & a tertia cacoehymia differentia contradijtingitur. 34.c

Turgentis humoris nomenclatura a quo desumatur. 34.c

Turgentium humorum efflatus est eorum quatuor motu indeterminato peccantium, nullam fidem firmam, nullamque stationem habentium. 34.d. & 35.d

Turgens humor quid sit definitur. 34.d

Turgescentes humores universales totius corporis. 35.a.b.

Turgescentes humores patientiae alienius partis. 35.b. in principalis tamen non principalis. 35.c

Turgentium humorum coparatio, & dilucidatio per turgentiam putredorum animalium ad coctum inclinationem habentium. 35.c

Turgescentes humores per lienem educendi. 35.c. & 36.a

Turgescentes humores proprii non peccant sicut determinato ut aliqui falso putarunt, inter quos Massaria fuit. 36.a

Turgescentes humores statim evacuandi & cur. 36.a

Turgescentes humores incipientes sunt morbo potissimum acuto ibid.

Turgescentes humores in motu, in latere & fluxu indeterminato, non autem quiete vlla pectant, ideo illico evacuandi sunt. 36.b

Turgescentes humores illico primo, vel secundo die educendi, alioquin in aliquam principalem offendendam ingruerunt partem ibidem.

Turgescentes humores statim purgandi sunt ratione excelsi, & motus horum humorum exitum querentium, & ratione naturae experientis eos humores, & respectu praefationis id iussu imminentis, si humores illi in aliquam fluerint partem principalem ibid.

Turgentium humorum cura preparatio. 36.c

Turgescentes humores purgandi diligenti cum praedicatione, & aequata cautione, & religione, ut ait Hipp.

& cur

Rerum notabilium.

& cur 36. c. usque ad 43. c.
 Turgentes humores tam proprii, quam non proprii in morbis valde acutis, ac vehementer magis, circa iui-
 tia tantum, cum tunc hi turgent, purgare oportet 36.
 c. & d. cum tunc hi humores morbosam, & cacochy-
 miam lethalem effugere possint magnitudinem ibid.
 Turgentes humores totum evacuationem per se non indi-
 cant, sed morbosam, & cacochymiam magnitudinem ventris
 imminuent eorum educationem indicat, turgentis vero
 humores coincidunt. 36. d.
 Turgentes humores peraro in morbis valde acutis, vehe-
 menterq. magni sunt, ideo etiam peraro in his mor-
 bis purgandum est in principio solutinis ignis phar-
 macis. 37. a.
 Turgentes humores licet sint exitum quercutes, morbosam
 ventris imminuent cacochymiam gignentes ma-
 gnitudinem purgationem infirmam, etiam inter-
 dum corpora adio purgationi inepta sunt, ut purgatio-
 nem iubeant. 37. a.
 Turgentes humores purgationem velitas, & iactura
 declaratur, quatenus corpora ad purgationes agen-
 dat, parata, vel inepta sunt. 37. b. usque ad 43.
 Turgens materia in corporibus inepta ad purgationem
 potest esse. 43. c.
 Turgentes humores an solum per alium educendi sint, vel
 quocumque per vomitum, & per alios locos dispartantur. 44.
 a. & b.
 Turgentes humores cur per alium tantum principaliter,
 & frequentius purgantur. 44. b.
 Turgentes humores cur etiam per vomitum extrahendi.
 44. b. & supra diaphragma turgent. 45. a. b. & c.
 Turgentes humores supra septo transverso, vomitionibus
 educendi: infra vero diaphragma turgentis alimnis
 evacuationibus extrahendi. 44. c.
 Turgenium humorum in toto corpore per vomitum edu-
 cendorum signa diagnostica. 44. c.
 Turgenium humorum per alium educendorum signa
 diagnostica. 44. c.
 Turgens materia sub diaphragmate per alium purganda
 frequentius est, quam ea, que supra diaphragma tur-
 get. 44. c. d.
 Turgens materia per alias partes, ultra vomitum, & al-
 minam purgationem, etiam turgere potest, sui exitum
 quarens, educenda est. 44. d. 45. c.
 Turgens materia frequentius, & principaliter per alium
 evacuanda est. 44. d. cum sub diaphragma turgat ibi-
 dem, & 45. a.
 Turgentes humores qui per cutem educendi sunt. 45. d.
 Turgentibus humoribus conferunt evacuationes per ac-
 cidens facta, ut exercitium, motus, frictio, balneum, et
 inedia. 46. a.
 Turgentes humores non indicant per se eorum evacuatio-
 nem, sed morbi magnitudo cacochymia ab his turgen-
 tibus ventris ut imminens, vel incipiens per se boni
 humorum, tanquam eius causa immediata citam, &
 sibi contrariam, & adequatam indicat evacuationem,
 ut magnum sibi aequale, & contrarium remedium.
 45. a. 46. d.
 Turgentes non proprii, qui nam humores sint. 46. b.
 Turgentes non proprii humores mota determinato pec-
 cant. ibid.
 Turgentes non proprii humores, vel praternaturales, vel

sani sunt. 46. b.
 Turgentes non proprii humores praternaturales. 46. b.
 Turgentes humores improprii sani, ut nunc, & naturales
 53. b. & 54. a. & b.
 Tussis quid sit. 39. a. b.
 Tussis sicca ibid.
 Tussis sicca, cui purgatio solutinis medicamentis molien-
 da purgatio non confertur. 39. b. c.
 Si tuculosi ignis non sunt purgandi solutinis. 39. c.
 Tussientes si est non sunt purgandi. 39. a. & cur ib.

Vacuationes que aequaliter totum expurgant cor-
 pus. 45. c.
 Vacuationes omnes omnium corporis humani. 45. c.
 Vacuationes per sanguinis missionem molita totum cor-
 pus aequaliter non expurgant. 45. d.
 Vacuatio omnium humorum est venefectio. 45. d.
 Vacuatio per cutem facta turgentibus educunt humores.
 45. d.
 Vacuationes per accidens facta turgentibus conducunt
 humoribus, ut exercitium, frictio, motus, balnea, et
 inedia. 46. a. ac potissimum ubi adest prohibens pur-
 gandi. ibid.
 Vacuationes per accidens, que sunt. 45. d.
 Venosum genus per triam expurgant. 45. d.
 Ventriculi formatio & natura. 59. a.
 Ventriculus terminus evacuationum, cum medicamenta
 ad ventriculi regionem excrementa attrahant, sua
 specifica qualitate. 51. d. in margine & 59. a.
 Ventriculus partim est spongiformis. 53. c.
 Ventriculi ore valde laeso, solutina remedia, & vena se-
 ctio non conveniunt, quia regio ventriculi, qua prope cor
 residet, terminus est evacuationis totius corporis, &
 alijs de causis. 64. a. b.
 Ad ventriculi regionem, in febris augmento, materia pu-
 trida cunctis transmissa. 63. d. si non evacuetur, et
 partim non consumperetur, tunc morbus deterior fio-
 ret, & recrudescit, & plura mala contingunt. 64.
 b. c. ideo evacuandum ibidem.
 Ad ventriculum, & intestina natura semper quod vitio-
 sum est, sine putridum, sine excrementosum, ut impu-
 rum prodecurandum, seu defecando sanguine transmi-
 tit, ut ad terminum evacuationis totius corporis, ut
 facilius educatur: ideo si in febris augmento id puri-
 dum in ea ventriculi regione transmissum a natura
 non educatur, auxilio lenissimum lenientis nos evacuare
 tenemur. 63. d. 64. a. & b. c.
 Vigilantes ob dolores amplius purgandi non sunt. 41. a.
 Vertiginosi qui non sunt purgandi. 41. b.
 Vescantia recte admoveunda perpendiculari. 69. 70. 71.
 72. & 73.
 Virus vitalis, & animalis in augmento febris cacochy-
 mibus valde laborat, ideo utraque respicienda. 63. b.
 Vomentes non sunt purgandi. 42. d.
 Vomentes nigra non sunt purgandi. 41. a.
 Ad vomitum proclues non sunt purgandi. 42. d.
 Vomitus digitis, & pennulis excidendus, ubi eo est opus
 49. d.
 Urina suum generis venosi expurgat. 45. d.
 Utilitas medicamenti solutini. 37. c.

Huius indicis finis.

Errata corrigenda Promptuarij singulari vacationis et acrobymie recte administrande.

Medica	lege	Medio 7	acideremus	andresen 33.d
vbi est phlegmosia		pulchrosula	proia	guria 36.a
seminibus		sermone 3.a	Alphandis	Triphancis ibid.b
offendum		offensum ibid.b	Pareo	Procreo 37.b
vim		vici ibid.d	Molere	Molere ibid.
impunitatem		impunitatem 5.a	paucitatem	paucitatem ibid.a
monitionem		monitionem 8.a	habere	habere ibid.
hyandria		hypenondria 9.a	correctum	correctum ibidem c
requet		requet 14.c	suas	suas 64.d
explicata		explicata 16.b	quodam	quodam 67.a
dicunt		dicunt ibid.d	cythra ibid.b	cythra ibid.d
vagabo		vagabo 17.a	nitroin	nitroin 68.d
infamatum		infamatum 18.c	formosa	formosa 68.b
creditis		creditis 19.c	me	me ibid.c
hucet		hucet 20.a	factorem	factorem 69.b
clyma		clyma 21.b	molumentum	molumentum 70.c
concomitibus		concomitibus 22.d	difficile	difficile ibid.d
legimus		legimus 23.a	valeo	valeo 71.a
Galeas		Galeas ibid.d	caput	caput ibid.a
capa		capa 24.d	adere	adere ibid.d
vicendo		vicendo 25.b	flaxima	flaxima ibid.c
deducunt		deducunt 26.d	diaphoretica	diaphoretica ibid.d
seminibus		seminibus 27.a	vomunt	vomunt ibid.
costrum		costrum 28.b	ipso	ipso 72.a
genoga		genoga ibid.a	cicere	cicere ibid.b
22.p		22.p 29.c	procreant	procreant ibid.d
balneum		balneum 30.a	inueniunt	inueniunt ibid.
acrobymia		acrobymia ibid.d	vbi est	vbi est ibid.h
glandia		glandia ibid.		
deficiunt		deficiunt ibid.b		



DE MORBI MAGNITVDINE

CACOCHYMA

Sua natura urgente, ideo succi peccantis educationem
per se indicante.

LIBER PRIMVS.

In quo

De generibus, ac speciebus tum magnitudinis morbi cacochymæ
tunq̃ue cacochymæ vacuationis cuiuslibet, ab ea
magnitudine indicatæ, pertractatur,

*Quare humorum purgationis quantitas expurganda vnâ, & modus,
vbi nimirum confestim, ac etiam modus vsque ad animi deli-
quium, vel paulatim, aut medico modo cacochymia
educenda sit, expenditur.*



CAPVT PRIMVM.

Huiusce operis indicatur vtilitas.



QVONIAM totum Medici optimi præcipuum negotium, ad eius reſum ſi-
nem aſſequendum, pro ægrorum vtilitate quidem eſt, dentaxæ ſuos d
vitæ magno, & euidenti, imminentiſq̃ue discrimine ægros reparare, &
cuſtodire: vt poſtea faciliſſimè proſus reliquum paruum eripere valeat
morbum. Hippocrætiſ decretis; qui Artem medicam in duas princi-
pales ſecut partes: quarum prima eſt, vt morborum vehementiam obtundat,
alia verò eſt, que ſanè in to um d morbus ægros vindict. Ideoq̃ue medicus
ſus d vitæ intigni periculo ægros reparare nequit, quin prius morbiſi-
cam exactè propriè urgentem dignouerit, ſimulq̃ue ſuſtulerit vehementiam; qua tantum miſeri
ægræ, aut interficiuntur, aut ita valde malè afficiuntur; vt niſi infelicitè, ac miſerè vitam degat.
Eunq̃ue ſanè ob cauſam omni in luſſa, ſtudio, labore, ac diligencia, recta ratione, rectoq̃ue ex-
perimento inuicta, nec noui autoritatibus, & exemplis ipſam exactè, propriè morbi urgentem,
adò agnoſcere magnitudinem cogimur, vt in anima noſtra habuiſſimo, & rectiſſimo, ſimulq̃ue
infallibili ex quæplurimis frequentatis tum ratiocinationibus, tunq̃ue rectis operationibus,
ad eum ſinem coarctatis, iam iam aſſequito illius magnitudinis certa, & infallibilis docti mæ.

Tomus Secundus.

A acquirat

A
2. De vitiis.
in morbo ac. 1. 8.
Lib. de Acie p.
6.

acquiratur; ut semper subinde facilè, tutò, citò, iucundè, & feliciter Dei gloria, egrotantium magno emolumento, artificum medicarum præstantia, atque medicis laude, medicus morbi tam adimere possit magnitudinem. Illæc ideo mihi opportunissima, finalis causa fuit; ut ego de morbi magnitudine generica, quò ad succum appellata, verba scriptis mandarem; quæ cum vniuscè in magnitudinem sanguineam, & cacochymam à me nuncupatam diuisa fuerit; postea etiam magnitudo sanguinea iam omnino fuit dilucidanda; proinde de ipsa cacochyma ægere magnitudine nunc teneor. Nisi namque ipsa pars artis medicæ ita necessitaria penitus in habitu iam infallibili nobis medicis testè operandi esset, circa morbi magnitudinis, exactè, propriè vrgentis sublationem, quomodo, quæso tepentè in occasione præcipiti, momentaneaque perpetuò ad eam eripiendam magnitudinem id, quod rectissimum est attingere, nos consequi poterimus? quippe ea ita operandi occasione elapsa, utique ægri maxima iactura, medicique dedecus non nisi fortiter potest. Cuius occasionis Hippocrates hoc modo meminit, et verò *ars medica breuem habet occasionem, & qui hoc nomen, illud constitutum habet, & nonis que sunt rerum species, vel non: ad quas agnoscendas occasio non est in arte medica, nempe quod alia subductiones per alium non feedunt, & reliqua quod contrario modo se habent.* Unde concludit à medico perito artis medicæ adæquato sponso hanc breuem auferendæ occasionem morbi magnitudinis vrgentis cacochymiz vndique dignoscendam esse: hinc etiam consequenter eam occasione purgante medicamento alium subducendi nos agnoscere debere, tanquam eam, quæ celesterrimè labitur, qua prætermissa, non amplius medico alia testè magnitudinem tollendi occasio euenire potest, quo fit, ut omninò mortifera euadat. Ea propter tunc magnitudo ipsa curationem non amplius admitteret. Nisi enim quod morbum magnum facit, dimoueris, augetur, & fit lethalis, omnia autem medicamenta sunt, quæ præsentem statum dimouent; valentiora autem omnia immutant, siquidem velis medicamento transmutare, & hæc ait eitea prima artis medicæ partem vrgentialem, antea allatam; quæ est, ut morborum vehemenciam olundat. De secunda autem parte artis medicæ; quæ est, qua sanè in totum à morbis paruis ægros vndicet, pergendo illico inquit, in morbis debilibus, nempe paruis, medicamenta valentia minimè sunt adhibenda, si itaque in morbis magnis præsidia magna, vehementem euacuationem efficientia insinuantur proinde sicuti in magnitudine sanguinea magnum euacuans sanguinem auxilium conuenit: ita in magnitudine cacochyma, adæquate, magnum, etiam educens cacochymiam, remedium optimum est; quatenus utrunque magnum præsidium à sua proportionata magnitudine exactè propria, per se indicante operatum est; ut Galenus his verbis statuit. *Nunc illud docere volo tum ipsam morbi, siue vim, siue magnitudinem appellare velis pro indicatrice quadam sanguinis detrahendi, vel purgationis adhibenda statuerendam esse.* At eum pro indicatrice quadam, nempe non simplici, ut curatiua sæculas indicatrix morbi simplici; neque ut est sæculas indicatrix præcuratiua, ut est morbi simplici causa; sed est indicatrix vrgens, & magna. Et alibi de his magnis auxiliis à Galeno præcipuis vocatis, & à morbi magnitudine vtrique enarrata indicatis ait. *Præcipua enim in his remedia sunt maxime quidem phlegbotomia, non nunquam verò, & purgatio.* Hinc iurè merito etiam eam morbi magnitudinem genericam, quo ad succum in sanguineam, & cacochymam secui. Cum itaque alio in opere de sanguinea morbi magnitudine vrgente per se sanguinis educationem indicante egerim, tanquam de præcipua magnitudine, prius dimouenda. Idcirco superest, ut modò de alia cacochymia morbi modis propositis exactè pertractem magnitudine, in morborum egrotantium vtilitatis gratiam; ut uariis operibus, fructus meis ægris semper ferre possim vberissimos.

CAPUT II.

Magnitudinem morbi cacochymiam per se, & exactè propriè, & proximè vrgentem esse. Ideo ipsam cacochymiaz, ut eius causæ immediatæ educationem per se quoque indicare, demonstratur.



Morbi magnitudo cacochymia per se vrgens indicanda est ipsi non tollenda. Ideo per se magnum euacuans cacochymiam indicanda est ipsi non tollenda.

Vamcunque autem cacochymiam morbi per se, exactè, propriè, proximè, ubique semper, & sua natura essentiali, vrgentem esse magnitudinem, simulque ipsidem modis eam quoque magnum euacuans cacochymiam indicare auxilium, ex iam antea statuis clarè patet fundamentis. Quandoquidem vnaqueque res morborifica, quæ sua natura essentiali, vel lethaliter nostras afficit actiones, aut vehementer hominis principes lædit functiones, procul omni dubio, his statutis modis vtget primò tollenda. Verùm quælibet cacochymia morbi magnitudo exactè propria sua natura essentiali, & his modis vel lethaliter nostras obcurpat actiones, aut hominis vehementer principes offendit functiones. Ergo necessariò quælibet cacochymia morbi magni-

Lib. de mag. Sanguine.

Lib. de mor. in. hem. p. 190. Procl. Id. Gal. aph.

Sup. lib. de lo. in. hem. codex p. 430.

Idem.

4. Meth. c. 6.

C

D

Lib. 2. de mor. magnitud.

A magnitudo exacte propria sua natura omnibus his terminibus vrget primò adimenda. Maior enim conspicua est, cum etiam idiotis notum sit, omnem rem, quæ vel lethaliter corporis humani actiones affligit, aut eius principes vehementer lædit actiones, vrgeri. Ideoque ipsam vt vrgentiorē cæteris cunctis rebus etiam eripiendam esse. Minor quoque patet; quoniam quæcunque magnitudo morbi cacochymia exacte propria sua natura essentiali, omnibus his terminibus, in morbis male conformationis, & in morbis intemperamentum cum materia, cacochymia relati, tum in morbis acutis, tum in chronicis, vel lethaliter nostras impedit actiones, aut vehementer hominis principes obcurpat actiones. Magnitudo namque morbi cacochymia soluta vitiatas, vt vlcus, seu vulnus magnum, vel impropria est, dum hi morbi magni, in tumoribus cacochymios transiunt, vt in erysipelam, vel scdema, aut scirrhum; vel propria non integrè, nec exactè reperitur, quæ duobus modis contingere valet; vel enim dum vlcus, seu vulnus vt mali foci soboles, à cacochymia, seu à morbi magnitudine cacochymia augete potest; & sic potestate, vt maius vlcus futurum, & imminens, cacochymia fluentis, & fluxuræ ad vlcus, sublationem deriuatiuam, & reuulsuam insinuat; vel quatenus ab ea cacochymia fluente, & fluxuræ inhibeatur vlcus, quo minus cicatrizari possit; Et hoc etiam modo, hęc magnitudo semper vt ventura vrget, nam sicuti remedijs resiste ad mortis curatur, & sanatur: ita denuo gignitur, ac ita cacochymia vlcus redditur. Et vt talis magnitudo cacochymia educationem deriuatiuam, & reuulsuam petat, tamen cum his duobus modis exactè non vrget, ideo nec exactè propria est, cum tantum vrget, quo ad tantum integram sanitatem partem deturpat, & sepe potius ad partem artis medicæ decoratiuam pertineat, ratione partis, eo vlcere cacochymia deturpat, non autem lethaliter afficit, nec etiam hominis ualde principes, aut non principes infeliciter obnoxias reddit facultates, seu actiones, functionesque. Proinde magnitudo hęc morbi cacochymia integrè non vrget, nec integrè propria se habet, nec primò ad ferecoda est; vt alia morbi magnitudo cacochymia est: quæ integrè per se, propriè, proximè, vbique, semper, & sua natura essentiali primoque vrget, vt exactè propria iouenitur: atque hinc primò ipsam modo eripiendam venit. Cuius dum Galenus meminit, cum de primo vrgente, primo moliendo in ordine plerumque indicantium adhibendorum egerit, inquit.

5 Meth. 4. 11.

B *Atque in eo quidem curationis consilio, quod ab vrgente initur affectus magnitudo perpendenda est.* Cum autem ibi pro magnitudine morbi tum genericam, tum specificam integrè propriam intelligat magnitudinem; proinde tam illam genericam, quod ad succum posuit magnitudinem, quam sanguineam, nec non etiam cacochymiam, integrè vrgentem per se, propriè, proximè, vbique, semper, & sua natura formalis. At verò quoniam, vt iam ostendimus est, omnis ea magnitudo, integrè vrgens circumstantijs allatis, succi superuacanei, seu eius causæ immediatæ magnam indicat substructionem.

C Ergo magnitudo cacochymia integrè propria, ipsi sicut conditionibus vrgens cacochymia tanquam eius causæ immediatæ magnam insinuat subductionem, & conuertibiliter omnis cacochymia magna educio à morbi cacochymia indicatur magnitudine. Eandem sanè ob causam quoties morbi vehementia à peccante aliquo modo prodeat sanguine, seu à causa proxima, tunc sanè ea sanguinea est magnitudo, sanguinis missionem per se indicans: cum ob eum peccantem sanguinem ipsa magnitudo per se integrè vrgeat. Sicuti etiam vbi morbi magnitudo cacochymia appellata quatenus à sua immediata emergit causa, ibi vtiq; ea magnitudo, vt integrè per se vrgens, cacochymia educationem indicat: cum propter eam morbosam integrè, propriè, & per se vrgeat cacochymiam. Nec tamen asserendum est obijciendo, si magnitudo cacochymia propter cacochymiam vrget, & indicat. Ergo magis vrget, magisque indicat ipsa cacochymia: cum propter quod vnumquodque tale, & illud magis tale sit, Aristotelis decreto; quoniam respondeo, id Aristotelis axioma verissimum esse in terminis reciprocabilibus: enim itaque non omnis cacochymia suam cacochymiam habere magnitudinem, immo solum omnis magnitudo cacochymia suam continet cacochymiam; proinde cacochymia per se nunquam indicat, nec vrget; venim per accidentem tantum magnitudinis cacochymia ope courget, & coindicat vñ cum ipsa magnitudine. Præterea ipsa cacochymia si per se vrgeret, & per se indicaret, semper quidem, & vbique sui ipsius euacuatione eriperetur; sed non semper, immo tantum presente, aut incipiente, aut imminente cacochymia magnitudine sui ipsius magna tollitur euacuatione. Ergo sequitur insitutum, nempe ipsam nec vrgeri, nec indicare per se, maior enim patet, & minor probatur, quandoquidem media, excitacionibus, frictionibus, balneis, & alijs his similibus presidijs cacochymia, sine vlla magna euacuatione subrahitur, Galeni sententia. *Præterea digerentibus medicamentis, exasperans equè tum plethoriam, tum cacochymiam sine sanguinis missione, sineque humoris educatione facta, dissolui potest.* Insuper Hippocrates ait corpora cacochymia sine purgatione per accidens à cacochymia vindicantur, dum ait corpora calidiori exposuit, tum excretionibus, tum vim calidiori calidi potu, & cibis, qui talem obtineant facultatem. Quocirca ducatur morbi magnitudo cacochymia per se magnam cacochymia educationem indicat, vt Hipp. & Gal. asserunt, vbi habetur. *De purgatione in hoc libro prodierat, atque ob eam rem Hipp. tum in reliquis omnibus operibus, tum in eo quod de vlcibus prodixit,*

Totum Secundum.

A 2 etiam

Vlcus, seu vulnus magnum, si in tumoribus cacochymiosis transiit, non vrgit nec indicat per se ita magnam improprie ducitur. Vlcus vero seu vulnus magnum, in eo, si a morbo vel aeger, vel prohibetur ne sanetur, sic parum vrgit, vt in foci magni possit, tunc difficile sanabile est, vt vnde magnitudo morbi intempera, vel incipiente est, non sanetur potius

Oportet nulli.

120. Cacochymia nec per se vrget nec per se indicat.

4. De facultat. 1. 4. 11. 12. 13. 14. & de cur. tum. ne per san. inf. 1. 10. 11. Meth. 4. 6. De vlcibus in morbo 1. 11. 4. Meth. 1. 6.

etiam morbi magnitudinem ad purgationem indicationem desiderat, & in fine ait. Sed ne illius obli-
tus, quod aliquid interim ex alijs, quae ulceribus accidunt indicationem propriam suggerat, veluti, &
magnitudo, his verbis clare docuit Hippocrates ulceribus omnibus, quales praevalida sunt, pur-
gationem esse utilem. Et reliquis, quae diuturna ulcera reddunt. Si ergo magnitudo ulceris,
quae non integrè propria cacochymia est, per se indicat cacochymiae eductionem. Ergo eò ma-
gis eandem cacochymiae purgationem per se, ea morbi magnitudo cacochymia, quae integrè
propriè urget, indicabit. Verùm concludendo Galenus statuit. Nunc illud docere volo nom-
ipsum morbi, sine vim, sine magnitudinem appellare velis pro indicatrice sanguinis detrahendi, vel
purgationis adhibenda statuentem esse. Et alibi idipsum confirmando, exarat, vacuumque sanè to-
tum corpus, non modò cum in redundantia succorum est habitu, sed etiam cum mediocritatem suc-
corum continet, si morbi magnitudo suadeat. Verùm egregiè nobis posteris prodidit Hippocra-
tes, ut etiam capite praecedenti iam dixi; ubi de magnitudine morbi cacochymia agendo, de
valentioribus etiam praesidijs, alium subducentibus scribit, hunc in modum. Nisi enim quod
morbum magnam fecit, demeritis, augetur, valentiora autem omnia, medicamenta euacu-
antia immutant, si quidem velis medicamento solutio transmutare ad morbi cacochymiam tollen-
dam magnitudinem.

A

Ibidem.

23. Meth. 25.

Lib. de locis
hom. 4. 9. & 10

CAPVT III.

B

Magnitudinem morbi integrè propriam cacochymiam, & morbosam, &
cacochymiam esse, de qua utroque modo agendum esse polli-
cet; verùm prius de ea vt de cacochymia, ceu de
notiori, & faciliori, verba facere con-
sentaneum est.



Acciderim, quoniam cacochymia, & morbosa magnitudo, duas quidem con-
tinet relationes, pro vt aequè ad cacochymiam, tanquam ad eius imme-
diazam referatur causam, & ad morbum spectetur, cuius efficacia est, ægrè
vel lethalius, vel saltem vehementer ladens. Cum autem doctrinae ordo
semper à nobis notioribus, simulque à facilioribus ad ignotum progredi
debeat. Idcirco huius magnitudinis dilucidationem prius ingrediar, qua-
tenus magnitudo ea cacochymia se habet: subinde ipsa in eo vt morbosa
inuenitur, splendescere tenetur. Quandoquidem cacochymiae peccata
faciliora, & notiora utique nobis longè morbis ipsis semper sunt, consequenterque magnitudo
cacochymia, ceu cacochymiae effectus valde nobis est notior morbis ipsis, ac etiam morbo num-
magnitudinibus. Neque obijcias, si asserueris, morbum nobis notiozem esse humore peccante,
in ordine cognitionis morbi ipsius. Vltra quod etiam morbi magnitudo generica quo ad suc-
cum est etiam sanguineae magnitudinis, iam omnino alio opere declaratae, communis igitur
peius magnitudo morbi, quatenus morbi diluenda est. Nam modò, non de ordine cogniti-
onis morbi, per suam causam oborti, agitur; immo de generibus, ac speciebus magnitudinis mor-
bi cacochymiae, generibus, speciebusque eductioni cacochymiae adaequatis, ac de indicantibus
sermo esse debet. Proinde quia cacochymiae vacuatio in genere, ac specie mollien-
da certè non indicatur, nisi à magnitudine morbi cacochymia in ge-
nere, ac specie per se indicante. Idcirco prius de magnitu-
dine ipsa, vt de cacochymia agere cogor, sicuti
etiam opere alio prius de magnitu-
dine, vt sanguinea actum fuit;

C

deinde de magni-
tudine,

vt morbosa disquirimus, vt lib. 2. liquet. Eanque
sanè ob causam ordo propofitus
iure meritò seruan-
dus est.

D

Obiectio.
Prima ratio.
Secunda ratio.

Solutio.

CAPVT IIII.

Quatuor cacochymæ magnitudinis genera declaranda esse proponitur;
nempe quò ad copiam, ad qualitatem, ad impunitatem, &
motum determinatum.



Quatuor genera autem magnitudinis sanguineæ introspectiuntur, tot etiam ad æquatè magnitudinis cacochymæ habentur genera: Sed sanguineæ magnitudinis quatuor sunt genera, vt pote quò ad copiam, qualitatem, impunitatem, & motum; Ergo etiam cacochymiz' magnitudinis totidem sunt genera. Minor autem patet, maior verò ita probatur; Nam quoties duæ vniuocatz' adfunt differentiz', æquè tum suum vniuocatas diuidentes genus, tum duas species illius generis constituentes vniuocatas, ibi quoque necessariò ambz' differentiz' conueniunt genere, ac differit specie; verù vt genere conueniant, æqualiter plura subalternata continere debet genera. At verò

Magnitudo
autobi cacochy-
mæ quatuor ge-
nera esse, vt ma-
gnitudo cacochy-
mæ est.
Primum argu-
mentum.

Secundum argu-
mentum.

Primo hæc ma-
gnitudo generi
ca copio à est.
Secundum est in
qualitate.

In prima quali-
tate.

In secunda qua-
litate.

Tertia est im-
punitas.

Quæ vel impu-
ritas quæ ad factu
m in vniuocato
so est, vt ex
bitum impu-
ritatem.

Purgare enim
corpus quod fit.
Vel impura ex-
crementa, vel
putrida.

Quarta est in
motu, quæ vel
fusa est, vel in
fusa vel in
fusa.

- B** morbi magnitudo sanguineæ, & cacochymia duæ quidem vniuocatz' inspicitur differentiz', æquè tum magnitudinem morbi genericam, quò ad succum vniuocantem diuidentes, tum illius generis hæc duas vniuocatas constituentes species. Ergo sicuti morbi sanguineæ magnitudo genericæ, quò ad succum diuidit magnitudinem, in ea quatuor genera subalternata, simul; eadè quatuor genera constituit in copia, in qualitate, in impunitate, & in motu terminato. Sic etiam magnitudo morbi cacochymia eadè morbi genericam magnitudinem, quò ad succum diuidere debet in ea quatuor genera vniuocata, & subalternata; & simul eadè quatuor genera constituitur tenent. Insuper tot sunt genera cacochymiz' magnitudinis, seorsum distincta, quot etiam cacochymiz' tanquam causæ illius magnitudinis immediatz' sunt differentiz', vicissim sciuntur; sed quatuor cacochymiz' differentiz' sunt, ad inuicem segregatz', prout causæ immediatz' huius magnitudinis esse possunt. Ergo quatuor magnitudinis morbi cacochymiz' genera sunt, seorsum distincta. Quandoquidem cacochymiz' copia procul omni dubio cacochymiam efficit magnitudinem, ab alijs tribus omnino distinctam, quò ad copiam vocatam, sicuti etiam purgatio ipsius cacochymiz' molenda, & ab ea magnitudine indicata euacuatiua reperiatur. Sicuti cacochymiz' qualitas mala, seu malitia, seu prauitas cacochymiam producit magnitudinem, ab alijs tribus cacochymiz' magnitudinibus sciuntur, quò ad qualitatem vocatam, siue sit in prima, in secunda, in tertia, & in quarta.
- C** atrabilis, vel frigida, & humida, vt est pituitosa cacochymia, siue acida, siue vitrea, vel sit in secunda qualitate peccans, vel calida, & sicca, vt est biliosa, vel frigida, & sicca, vt est melancholica, seu atrabilis, vel frigida, & humida, vt est pituitosa cacochymia, siue acida, siue vitrea, vel sit in secunda qualitate peccans, vt est succus vitiosus, acer, mordax, abrasus, & vlcerosus, aut sit succus prauus, crassus, viscidus, atque glutinosus, aut sit amarus; simulque tenuis, & levis biliosus, aut ichorosus, siue sit acidus vna, & crassus, & grauis, melancholicus, siue aerabilis. Quo circa etiam ipsius cacochymiz' eductio à magnitudine cacochymia ipsa insinuat malæ qualitatis moderatiua est ab alijs tribus purgationibus contradistincta. Quæ modum etiam cacochymiz' impunitas aliam cacochymiam progignit magnitudinem, ab alijs tribus magnitudinibus vndique sciuntur, quò ad impunitatem appellatam, vel sit impunitas succorum, in vniuocato desumpta, contradistincta à purgatione, seu purificatione, seu depuratione massæ humoralis; quæ ab ea cacochymia impura conuincitur: ea propter purgare totum corpus nil aliud quidem est, nisi eam massam humoralem omnino depurare, seu purificare, coinquinationem eam tollendo. Vel si cacochymiz' impunitas excrementosa, vel putredinalis, & si excrementosa, vel sit nigro colore, vt est melancholica, & bilis atra, vel sit colore flauo, seu vitellino, siue croceo, aut viridi, vt est bilis pallida, deusta, vel sit colore albo, vt est pituita. Vnde sicuti ipsa cacochymiz' differentia, impunita ab alijs differentijs sciuntur: ita quidem magnitudo cacochymia, quò ad impunitatem distincta est ab alijs cacochymiz' magnitudinibus. Pariter etiam ipsius cacochymiz' impunitas euacuatio, quæ depuratiua nuncupatur, ab alijs tribus euacuatiombus sciuntur. Similiter cacochymiz' motus, ad aliquam partem terminatè fluens, magnitudinem vtique cacochymiam gignit, à cæteris enatis magnitudinibus segregatam, quò ad motum vocatam; quæ sanè etiam purgationem sibi propriam, ab alijs purgationibus separatam, reuulsuam, seu deriuatiuam flagitat. Eandem etiam ob causam, isthæc magnitudinis cacochymiz' quatuor genera, vna cum suis speciebus profus dilucidare deinceps.

CAPVT V.

Cacochymia quid sit, explanatur.

Cacochymia
quid sit.

Voniam vetò alicuius rei effectum dignoscere neutiquam possumus, quin prius ipsius effectus causam immediatam quidem ab Aristotele. Syllogisticam nominatam animo complectamur; proinde prius quàm magnitudinem, propositum explanationem ingrediar, cacochymiam essentiam explorare teneor; ipsa namque cacochymia omnino cognita, facilius posset cuiuslibet magnitudinis cacochymiam tanquam eius effectus cognitionem adipiscar. Cacochymia itaque nō nisi succorum, humorum vitium est, seu prauus succus, aut malus humor, mala qualitate, seu malitia peccans, in nostro corpore, Galeni sententia, ita memorie prodientis, vitium humorum, quam cacochymiam vocant, & alio in loco ait, eum habitum cacochymiam, quasi succorum vitium, & ibidem etiam habet, succorum vitium cacochymiam appello, quod & vel flaua bilis, vel nigra, vel pituita, vel serosis humoribus refertum corpus iam fuerit, purgatione, qua cuique superanti succo sit commodata, corrigitur. Quam sanè ob rem ipsam cacochymiam excrementosam in flauam bilem, & nigram, & pituitam, & in serosum humorem diuisit, quod etiam fecit alibi, vbi medicinali posteritati hunc in modum prodidit, que euacuanda sunt, qualitates indicant, hoc verò est nū aquosa, ac tenuia vacuare expediat, nūm pituitosum humorem, nūm biliosum, nūm atram bilem, nūm horum quendam, nūm etiam omnia, ipsa autem cacochymia, vel est vniuersalis in toto corpore, vel particularis in aliqua particula determinata, ac vetò de differentiis ipsius cacochymiam capite primo libri secundi sequentis adamussim verba faciam.

Cacochymia vniuersalis vel particularis sit.

CAPVT VI.

Magnitudinis morbi cacochymiae genus, quo ad copiam, inquiritur.



Magnitudo morbi cacochymiae copiam vel vniuersalem in toto corpore sit, & vel alia sit habet.

Vel vbi est magnitudo sanguinis est, & in serosis flaua, & nigra copiosa. Magnitudo morbi cacochymiae, & sanguinea in Athleticis corporibus inueniatur.

Erunt cacochymiae, seu vitiosi succi copiam, cacochymiam parientem magnitudinem, quò ad copiam vocatam, Galenus recenset; & etiam inquit ratione habita de abundantis succi copia. Magnitudo autem cacochymiae, & quò ad copiam, vel sola quidem in corpore humano inest, vt in ictericia alba, cachexia, seu leuco phlemacia vocata, & in hypochondria, & in ascite; vel vna cum magnitudine sanguinea, in copia existit nec, repetitur; vt in ictericia flaua, & nigra conspicitur, ac etiam in alijs pluribus affectibus. Caterum hæc gemine morbi magnitudines, potissimum à cacochymia insigni emergentes, certè Athleticorum corporibus vsu eueniebant Hippocratis æuo. Ac tunc sanè, vt Galenus asseuerat, necessariò adfertur periculum, ne ab his morbi magnitudinibus imminetibus aut vix aliquod rumpatur, aut suffocato calore naturali, mors sequatur repentina. Quod ià Athleticis quibusdam vsu venit, qui ad summam corporis plenitudinem perducti, de repente sunt mortui. Nā tamen si ibi plus sanguinis copia adsit, quàm cacochymiae multitudo, nihilominus ingens cacochymiae quoque; exuperantia inueniri debet. Ne ergo ita repentinè talia corpora obeant, atque simul, vt in corpore alterius nutritioni locus, pleniorè illam habitudinē oportet sine mora solvere, que nimium eius solutio per euacuationem fieri debet, æquè tū venæ sectione, tum cacochymiae eductione molienda. Verò aduerte quòd cacochymiam purgatio vel aluiua, aut vomitotia esse valent. Quam doquidem, si morbi non vehementer magni, immo simpliciter magni magnitudinis ventura imminet, tunc sanè, post sanguinis missionem secutè, & mediocriter porrigendum aluiuum solutiuum auxilium est. At verò si vehemens, & magnus fuerit morbus, venæ sectio in his præferenda venit, dicinde ethymis est opus: Sed vbi sanguis in laeis huiusmodi propter venarum repletionem spiritum præseruare non permittit, Vnde in frigiditates sunt oblationem, vt rigines, aphonia, epilepsia, & paralyxis. Talibus sanè ab initio venarum confectum scire oportet. Postea rescire expedit, & superiorem ventrem, si non leuatur, purgare. Caterum magnitudo morbi cacochymiae, quò ad copiam multiplex quidem inuenitur: quandoquidem, & quò ad vasa, & quò ad vires, & vtrique vel vniuersalium primæ regionis cruditatium, tum secundæ regionis, vel primæ tantum regionis, vel secundæ regionis, vel alicuius patris, aut plurium partium, conspicitur. Ea verò, quæ quò ad vasa habetur, adhuc etiam duplex est; nam aut obstruens, aut extendens repetitur. Nam cacochymia vasorum capacitatem sua copia replendo, æquè tum vasa extendit, tum obstruit, ita etiam cacochymiam maiorem, & minorem progignit magnitudinem copiosam extendentem, atque obstruentem. Quam autem cacochymia sola, vasa non scindat, nisi sanguine plenè udiui annexa sit proinde magnitudo morbi cacochymia copiosa scindens minimè repetitur; vt sanguinea morbi magnitudo.

4. Meth. 4.
23. Meth. 6.

B

6. Epid. cema.
c. 1. de. 11.
Idem etiam Gal.
lenus habet 4.
9. ph. 17.

C

9. De febris
c. 1. de. 11.
Idem etiam Gal.
lenus habet 4.
9. ph. 17.

1. Aph. 4.

Ibidem.

D

Hipp. 4. de vit.
c. 1. de. 11.
Ibidem.
Gal. ibidem 4.
20.
Hipp. ibidem 4.
20.
Hipp. ibidem 4.
20.
Hipp. ibidem 4.
20.

Atudo, quo ad copiam vasa rumpens intropicitur. Hæ autem duæ magnitudines, etiam duas cacochymie sibi iunctæ subitas ipsi contrarias exoptant sublationes, alijuna, aut viciosa, aut rectæ purgatione, mollienda, nimirum, & extensiois libetatiuum, simulque deobstruentium purgationem flagitant. Magnitudo verò cacochymia copiosa, quo ad vires, absque quo extensio, vel obstruentia sit, sine repletionis capacitatis vasorum, adesse valet, cum à paucis quidem copiosa cacochymia magnitudo ipsa exotici possit, vires opprimendo, caloremque naturalem compedendo, & onerando. Verum si admodum paucæ cacochymia copiosa fuerit, hæc procreans magnitudinem, necesse est, vt vnâ cum ea cacochymia copia, etiam aliqua praua qualitas subsit, quæ suâ intemperie, caloris naturalis temperamentum ita offendar, vt oë dum magnitudo hæc onerando, verum etiam intemperando, vires opprimat. Ideoque tametsi ipsa mibi vehementer per se cacochymie sibi annexæ citam ei contrariam exoneratiuum insinuet substructionem; tamen per accidens cum purgationem quoque malâ intemperantem subductionem flagitat. Quæcumque verò cacochymia morbi magnitudo copiosa, tam quò ad vasa, quàm quò ad vires, sicuti vel vniuersalis, aut particularis, vel superna, aut inferna, ita sanè ipsi adequatam, & contrariam, citam, & magnam quærit purgationem, vel vniuersalem, aut particularem, vel superiorem, aut inferiorem. At verò cacochymia copiosa, hæc cacochymias pinguissimas magnitudines, vel

Myrmecodia ca-
cochyma copin
si quo ad vires
oppositas di-
stans.

Qualiter carn-
ichyma magni-
tudo fiti etiam
etiam aequali
petit purgatio
necesse ac illud
agendum.
Causa in dan-
da opus circa
purgationem.
Secunda ratio
circa idem ag-
endum.
Multa prefi-
dij vacuandis
cochyneis no-
n est vehemens
magnitudo
nec a copiosa
enchyma sed
a vitium robore
Eius ratio.
Secunda ratio

Confirmatio.
Exemplum ad
causam pen-
sionis ad vitam
Prima 1899.

Scotanda rarior.

Quando v. sp. ad
animi desidia
rapietis purga
re.
Prima nota quæ
nam sit.
Secunda nota
quæ nam sit.

Die Lösung:

Solomon.

1-Aph. 1.

Ibidem.

2. Deviation
no aut. t. 17.
Fidelity 6. t. 2.

Com. 3.3ph₂f₃

1. April:

Inders.

1. Aphy. 27.

Thidion nomen
 a. g. h. 2. 2.
 Thidion a. g. h.
 p. 2. 2. 2. 2. 2.
 2. 2. 2. 2. 2. 2.

4 Dec 1967, Jan. 64.

pro qualibet vi
et videretur vi-
cium nobis re-
sistere debe-
re.

Quoniam morbi
magnitudo ca-
cchyma est
copiosa fuerit
& virium robur
permixtum ad
animi et defe-
ctum purgan-
do est.
Cui magnitudo
ad eundem con-
pice, est pra-
uiter infir, & ex
leues flos, seu
florosa quousque
fuit.

Obiectio ab Au-
gustino Galda
dicta facta.

Quae obiectio
Magnitudo de
est copiat.

Propter ad
animi deliquit
agenda, non ve-
deliquit praes-
su, nec incipit
verum tantum
laxationem.
Si vices autem
de hila fuerit,
tunc purgandi
vires purgandi
venit.

fucci molestantis copiam educendam duobus modis nos considerare posse, vel enim copiam
in qualibet vice educendam, vel pluribus vicibus totam eam copiam purgandam: primo enim
modo in nostra declaratione est intelligendum, secundo vero modo postea Gal. statuit. Caterum
si humorum speciem offendentem euacuandam ponderare velimus, ea quidem vel sana bilis,
vel nigra seu melancholica vel pituita, vel serosus humor est. Qua perspecta, simul cum virium ro-
bore magno existente, si magnitudo morbi cacochyma summe copiosa fuerit, tunc etiam ad
animi vique deliquit purgare poterimus, per aliuam educationem administrandam. Verum
eam molliendam esse reor, potissimum ubi magnitudo talis cacochyma extreme copiosa, valde-
que praua, & celeriter, seu vehementer sinens, seu fluxura sit, ad aliquam partem principem, vel
principali parti subordinatam, sine inferuentem, quoties tumor aliquis cacochymus, magnus-
que in aliquo membro nobili incipiens, vel imminens fuerit. Et quoties his modis, dolores ma-
ximi cacochymi concitentur, reuulsiones, seu deriuationis gratia, cum dixerit Galenus. In maxi-
mis vero doloribus nullum praestantius noui remedium ea enacuationem, quae ad lipothymiam usque
fuit, cum ea tamen distinctione, ut intelligatur phlegbotomia, an purgatione, ad deflectionem usque animi
vbi conueniat, quam obrem demonstramus in commentariis, quos de phlegbotomia conscripsimus. Sed
huic instituto Augustinus Galdaldinus in margine obijcit, iniquis. Hae verba non sunt in tra-
slatione veteri, nec in oribasio, qui libro 7. collectionum medicinalium Imperatorem cap. 3. hunc
locum ponit, nec in libris de phlegbotomia hoc dixit Galenus; quod scilicet purgandum aliquando sit
usque ad animi deflectionem, ergo Galeni sententia tantum de sanguinis missione est, ut ad lipo-
thymiam vique administraretur, non autem purgatio. Cui obiectioni respondeo satis esse Hip-
pocratis decretum. Deflectionis ubi usque ad animi deflectionem expedit ducere, facientiam, si eger
posse tolerare, & si talia deiciantur, qualia conueniant. Vnde si Galenus idem non asseuerasset, pro-
cul omni dubio crimen perpetrasset, ideo satis est asserere Galenum id confirmasse, quod cum
deliquisse, ex quo Galdaldini pace, horum autorum consensu interdum cacochymia purga-
tio, & magnitudine cacochyma valde copiosa indicata, & à virium robore valido permixta, ac
toleranda, usque ad lipothymiam recte molienda venit: non ut lipothymia praesens fiat, verum
tantum imminet, ut etiam in venae sectione est exploranda, ut iam ostendi. Quoniam vero saepe
vfu venit, magnitudinem morbi cacochymam vehementer copiosam adesse, humoris molestan-
tis magnam, & copiosam adaequatè indicantem mensuram educendam, viribus tamen imbecil-
libus praesentibus, proinde tunc per vices plures, seu per epyeasim humores vacuandi sunt, ut
Hippocrates ait, paulatim verò quod sit tutum, & ea propter Galenus hanc rem confirmando
et arat. Oportet namque; ubi indicationes ita sibi aduersentur, & paulatim, quod vti isom est vacua-
re, & paulatim immere, quod salubre est, pro ea reponere, id est reficere, vocantur mediei eiusmodi vniuersi
fucci curationem Graeci epesum. Caterum ubi magnitudo cacochyma valde copiosa intropiscit-
tur, tamē vires ita imbecillae se habent, tum ratione sui, tum ratione alicuius symptomatis adeo
vires prostermentis, ut penitus nullam admittat purgationem, ut est os ventriculi angor à Ga-
leno tradita, & à Paulo confirmata ex Hippocratis decreto. Vnde tunc, & vniuersibus, & si cilio-
nibus, & alijs internis praesidijs id symptoma de medio tollere cogimur, & exinde viciolos hu-
mores preparare, ac denique educere.

CAPVT VII.

Magnitudinis morbi cacochymae, copiosae signa diagnostica
traduntur.

Magnitudo in
cacochyma copio-
sa particularis
notat.



Magnitudinis
morbi cacochy-
mae copiosae vi-
rius notat.
Magnitudo
morbi cacochy-
mae copiosae, quo
ad oppres-
sum sunt quae
notat.

Orbi autem cacochyma magnitudo, quod ad copiam appellata, vasorum ca-
pacitatem replens, à vasorum quidem repletione, ac extensione, simulque
obstructione magna innotescit; quae utique à partibus sua natura spongio-
sibus intensionibus, ac in tumores elatis dignoscitur, dum membrum aliquod
ipsius naturae ex raro, molli, vacuo, & paruo, cacochymiae copia repletur,
necessario non nisi densum, durum, & amplum etiam euadit, ut venterculo,
pulmoni, hepati, lienii, mammis, mesenterico vtero, vesicae, & rectis abdomi-
nis musculis facile contingit; si cacochyma magnitudo talis alicuius harum partium particu-
laris fuerit. Sicuti vniuersalis magnitudo ipsa cacochyma, facile dignosci poterit, cum ea in ca-
chexia, anasarca, seu byposarca etiam leucophlegmatia vocata, & in ascre insit. At vero crudi-
tatem pituitosam, & actum, seu mordacium primae, secundae, tertiae, & quartae cruditarum re-
gionis notae alio opere, de cruditatibus recte dignoscendis, recteque curandis inscrip-
to à me tra-
duntur. Alia vero morbi magnitudo cacochyma, quod ad oppres-
sum sunt quae notat, ex virium hercè affectuum ipsa oppressione facile nota effici poterit, aequè tum particularis, tum vniuersa-
lis. Potissimum vero hypochondriacorum dolor grauius, ac tensionis sensus eundem magni-
tudo cacochymas ostendunt, verum etiam flatuosas affectiones à crassis, & viscosis humoribus
obstru-

A

11. Meth. 2. 6.
6. Epid. 2. 6. 11
& 1. Aph. 47.

Com. 1. Aph. 31.

B

1 Aph. 31.

1 Aph. 31.

C
9. Meth. 6. 20.

11. Meth. 2. 6.
Lib. 3. 6. 19
4. De vitiis in
mor. 2. 6. 41. 6
44.

D

non autem ab una specie tantum cacochymie. Cui dubio respondeo, hanc magnitudinem calidam, & humidam, ex duobus cacochymijs foris contrarijs simul comitis confurgij: nimirum ex bile, & pituita, seu ferulo futo, vincente bilis caliditate, & pituita, vel aquosi humoris humiditate predominante: vt in articolorum maximis doloribus ab his humoribus ita intemperatis obortis vni venie; & in adematate, & typhelate, & alijs ijs similibus magnis afflictijs cacochymijs caliditate, & humiditate intemperatis contingere solet. Ac tunc tan ab ea magnitudine, magna eius cause immediatæ sibi contraria, & subita indicatur substractio, refrigeratio, & exsiccatio mollienda. At verò cum qualitates gustabiles magnam habeant vim, in arte medica, ex parte artis sensibilibus, vt libro primo de medicina certitudinem iam demonstrauimus proinde de cacochymie qualitatibus gustabilibus statum naturalem excedentibus, plures cacochymie morbi oriri possunt magnitudines; cum talis magnitudo amara, salsa, nitrosa, acida, acris, seu modice esse valeat; ac tunc ingens cardialgia, vicerario, emetico, thoracique lincatio orioris solet: vt Hippocrates ait. Vterius, & purius, & sensus vkerosis lassitudinis, magnum venturum denuntians morbum, & vigilie, & mæror, & mæstia, & animi motus cum terror, & mordaci, & acri cacochymia enegere valent. Quocirca ibi humorum qualitatium gustabilium, infestantium magna, subitaque infusatur purgatio, vt in octaua, & decima humorum differentia cap. 14. & 16. libri secundi huius operis gestillat declarabo.

De prüfer möge
s. 2.1.

C A P V T. IX.

Magnitudinis morbi cacochymæ intemperatæ notæ indagantur.

Vacunque verò cacochymia morbi magnitudo, quò ad qualitatem vocata, & intemperata vtriusque dignoscitur, à specibus cacochymiae quatenus hæc intemperata sunt. Species verò intemperatae cacochymiae, & à statu colli intemperato elapsa, & à viciu ratione præcessa intemperata, & ab exercitationibus intemperatis, vel ocio extremo, & à consuetudine cumuli cacochymiae, intemperie peccantis, & ab animi perturbationibus transactis, nec non simul ab excrementis exeuntibus intemperatis cernitur, actandem ab accidentibus, quæ illius cacochymiae intemperiem sequuntur, elucescit. Quandoquidem cacochymia species biliosa, calida, & sicca, hinc etiam ignea interposita. Species verò cacochymiae pituitosa, frigida, & humida, consequenterque etiam aquea habetur. Sicuti melancholia, & bilis atra, terrea, frigida, & sicca reperitur. Cacochymig, verò intemperata species calida, & humida, simplex nequaquam reperitur; tamē aut componitur ex commixtione bilis, & pituitæ, seu humoris aquosi, dum bilis caliditas prædominium obtinet, cuius siccitas ab humiditate pituitæ, vel aquosi humoris vincitur. Celi autem status æstiuo tempore in plethica intemperatus in caliditate, & siccitate apparet; qui status ab Hippocrate squallidus appellatur, sicuti è conuerso hyemali tempore celi status frigidus, & humidus intemperatè se habet. Tempore verò autumnali in plethica frigidiatur, & siccitati intemperatè proportionè respondet. Quò circa eo tempore non nisi excrementa necessaria terrea, frigida, & sicca cumulantur. Vicius autem ratio an intemperata sit omnibus intemperijs, vel non patet ex Hippocrate sententia; nam ea cibaria, quæ à natura sperari non possunt, cum sua propria substantia, tuncque proprio suo intemperamento dolores, morbos, & mortem afferre possunt. Nunquid autem vehementes exercitationes cacochymiam intemperatam, igneam, & siccam gignere valeant, ex perimento quotidiano clare percipitur; vt etiam Galenus faretur, sicuti etiam nimium ocium (siccum frigidum, & humidum, simulque viciu) prætere. Prætere animi perturbationes non nisi cruditates, homini intemperato proportionè respondentes producere possunt. Quomodo autem excrementa etiam intemperata, & exeuntia noscè habeantur; vnicuique arti me-

L'Es. de pol. mod. n. 14.

D

excuntibus mutatis, & a Symptomatibus,
quæ ex eo membro lefo
emanant.

Magnitudo
aestus canchy-
tis quo ad qua-
litatem oritur
in Graecia in-
venitur qualitas
siveque in se-
ne medica ma-
gnam obtinet

A quibus nobis
magnitudine
morbi carceri-
bus quo ad qua-
litate, scilicet
comparare non
posse digni-
ficamus.

Peri infu à quibus
que morantur,
generibus esse
celes.

A

CAPVT X.

Magnitudo morbi cacochymia impura vocata, cum suis speciebus dilucidatur.



Æterum magnitudinis morbi cacochymia tertium genus à cacochymia impura quidem prodit, tanquam à sua causa immediata; proinde magnitudo hæc generica impura nuncupari valet, vt ante cap. 4. iam dictum est. Impuritas autem cacochymia accipitur quidem, prout contradistincta sit à purificatione, seu depuratione quatuor humorum massæ humoralis, dum ab ea cacochymia impura talis humorum massa deturpatur. Hinc, vt antea dictum est, purgatio

aluina nil aliud quidem est non nisi eam succorum massam co inquinatam purificare, seu depurare, deturpationem eam eripiendo. At verò quoniam sicuti cacochymia impura, vel excrementosa, vel putrida esse potest: sic patitur cacochymiam magnitudinem impuram, vel excrementosam vel putridam sibi proportionatam efficere potest. Quæ sanè purgationem depuratiuum sibi adæquatam etiam vel excrementosam, vel putridam indicat, vt etiam de magnitudine sanguinea impura dictum est. Insupet sicuti cacochymia excrementosa, vel biliosa, flaua, vel atra, seu melancholica, vel pituitosa, seu aquosa habetur, vt cap. sexto iam dixi Galeni sententia, hinc etiam flaua, & nigra, & alba, sic etiam necessariò magnitudinem cacochymiam sibi proportionatam gignit biliosam, flauam, atrabilem, & melan cholicam nigram, & pituitosam albam, aut aquosam similiter albam. Magnitudo autem cacochymia putrida triplex vtique reperitur, vel enim toto genere præter naturam putrida est, ab humore penitus putrefactio emanans, qui cum nihil ad benignum secundum naturam redigiqueat, illico adimendus est, magna alui educatione molienda; vt libro sequenti cap. 13. videbis, vel parum est à statu naturali actu recedens, verum potestate proxima, magna putrida imminens est, seu incipiens, & hæc, ne fiat, methodo præseruatur, magnam cacochymiam putrescens, & citam indicat purgationem depuratiuam; vel medio modo semiputrida cernitur, & hæc partim, ne fiat methodo præseruatiua, partim verò, vt actu facta methodo euacuetur magnam cacochymiam squærum putrescens; rum putrefacti, seu eius causæ immediatæ, & subitam insinuat suberactionem depuratiuam. Verum hic dignè obiectio emergit, cum genus hoc magnitudinis morbi cacochymia superfluum videatur constitutum esse; quoniam anagnitudo morbi cacochymia genericè ab alijs magnitudinibus distincta illa est, quæ vt talis vrget, vel lethaliter, vel admodum nostras ledendo actiones, vel tediosa, ac rebellis est vrgentia; Sed magnitudo hæc, vt impura non vrget, ergo magnitudo ipsa generica constituenda non est. Cui respondeo impura corpora ab Hippocrate vocata, ea quidem esse, in quibus mali succi collecti prius concoctio variatur, nouum accedens alimentum. Quo fit, vt cacochymia quantitas à nimio alimento assumpto augeatur, & rectineatur qualitas. Id verò maxime fieri solet, quomodo venter prauis quibusdam humoribus repletus fuerit, vt ait Galenus. Quocirca cacochymia ipsa ab his auctoribus vtique, vt copiosa, & vt prauus succis qualitate intemperatus peccans, nec non qualitate impurus vitiosus sit, corpora humina co inquinans. Ea propter sicuti & copia, & qualitate intemperata, & gustabili insalubri, cacochymia morbi cacochymiam producere valet magnitudinem, ijs proportionatam, sic etiam cacochymia vt impura tantum morbi cacochymiam sibi adæquatam efficere potest magnitudinem impuram prauam; nam cacochymia prauus succus non modò reperitur, in prima qualitate, & in qualitate gustabili; verum etiam in qualitate impura, vel excrementosa sua natura specifica praua, vel putrida. Vnde negatur minor: quia hæc magnitudo in morbi cacochymia impura sua natura vrget, quatenus valde ledit, ob impuritatem præternaturalem, & vitiosam. Sicuti quoque omnis eius specics vrget, nempe magnitudo morbi cacochymia impura excrementosa valde ledendo, ob impuritatem excrementosam præter naturalem, & insalubrem, vrget nec non magnitudo morbi cacochymia impura putrida vehementer offendendo, ob impuritatem præter naturalem affligentem, vrget. Eandem sanè ob causam quælibet eorum magnitudo, vt vrget, magnam eius causæ immediatæ, & citam flagitat sublationem, depuratiuam, magnam cacochymiam euacuante administratam remedio.

Magnitudo morbi cacochymia impura, & excrementosa, & putrida esse valet. Magnitudo ipsa impure excrementosa dilucidatur eorum sententia.

Magnitudo morbi cacochymia impura putrida tres possidet differentias.

Obiectio.

Solutio.

Cacochymia, prout locus est tripliciter, tum in prima qualitate, tum in qualitate gustabili, tum quatenus impuritas repleat excrementosa, & quam putrida.

11. Meth. c. 6.
& de epid. c. 1.
c. 13. & 2. aphor.
37.

1. Aphor.

C A P V T X I.

Magnitudo morbi cacochyma impura, & quælibet eius species, quibus notis cernatur, disquiritur.

N Agnito autem morbi cacochymia, hæcenus declarata, impura, sua natura, utgens iisdem modis, quibus magnitudo morbi interperata cacochymia reputari potest, dignoscitur. Cum autem magnitudo hæc vel excrementosa, vel putrida intropiciatur, primò quomodo ea excrementosa dignosci valeat, subinde verò quomodo alia putrida elucescere possit, explorabo. Ipsa itaque excrementosa, ut speciebus, ut coloratis cacochymia cernitur. At verò species excrementosa cacochymia impura primò à Cæli statu præterito, in quo iam ea species exorta est, facile invenitur. Quandoquidem sicuti alio tempore flava cacochymia, & virescens, & crocea emergit: sic etiam quidem hyemis tempore cacochymia alba, nedum impura, verum etiam cruda promanet. Pariter autumnali tempore cacochymia nigra facile cumulat. Insuper à vietus ratione, antea clapsa, tæquam à causa procatartica, seu antegressa qualibet cacochymia impura haud difficile indagatur: nam si vietus ratio frigida, & humida fuerit, procul omni dubio tunc non nisi cacochymia alba, & cruda progignitur, sicuti à vietus ratione calida, & secca necesse est, tantum cacochymia, flavo colore inæcia prodit, quemadmodum etiam à vietus ratione frigida, & secca necesse est, quod solummodo cacochymia impura nigra oboriatur. Vtremvis à vehementi exercitatione, deambulatione cacochymia dunta sat ignea, impura, & flava emergere potest, sicuti à nimio ocio perpetuò cacochymiam impuram, albam, & crudam gigni æquum est. Præterea ab animi perturbationibus, amore, & tristitia iunctis, nec non à morbis longis non nisi vietusque cacochymia impuritate nigram exoriri posse, reor. Quæcumque autem cacochymia impura semper ab excrementis excentibus facile apprehendi potest. Porro accidentia, quæ cacochymia impura superueniunt nobis cacochymiam impuram, aut albam, vel flavam, vel nigram esse, ostendunt, maximè quoties hæc accidentia partibus nonnullis inhaerescunt; quoniam quilibet pars lesa, & à natura formationis pars lesa, & à situ regionis particulæ offensa, & à facultate illius particulæ affecta lesa, & ab excrementis excentibus mutata, & à symptomatibus, quæ ex ea particulâ obutpata emergunt, certè dignoscitur. Sicuti itaque cacochymia impura excrementosa qualis est, cum partem deturpans, talis affluat quoque ipsa modis adæquatè nobis manifestatur. Alia verò magnitudo cacochymia impura putrida facile ex putredine dignoscitur.

C A P V T X I L

Magnitudo morbi cacochyma, quò ad motum, ad aliquam partem terminatum, genericè accepta cum suis speciebus declaratur.

Quartum autem magnitudinis cacochymiae genus, quod ad motum ad aliquam partem lasam determinatum, acceptum in duas diuiditur differentias; quarum alia; vel iam fluxa est in aliqua parte affixa, vel nouum fluxa, & haec fuit iterum subdivisio. Quandoquidem, vel fluens est, & incipiens, aut fluxura, & imminens, quo circa huius magnitudinis tres quidem sunt differentiae, vel enim iam fluxa, & praesens at Galeno vocatur, aut fluens, & incipiens, non completo principio; co qua tunc praesens est, non autem incipiens, vt at Galeno appellatur. Alia vero fluxuram se habet, quae ab eodem aurore imminens dicitur. Quilibet autem istarum magnitudinum subitum, & simulque magnam eius causae immediatam, & sibi conerariam indicat euacuationem; nam magnitudo praesens, & iam fluxa, non exiguum fluxum cacochymiae euacuatum, & exoneratum indicat purgationem, caeterum quoniam cacochymia colicis, & infixa, vndeque firmata in aliqua parte nunquam solutius medicamentis cedit, vt Hippocrates, & Galenus affirmant, vt etiam experimento quoridiano id non obicitur, patet, ideoque prius concoquenda est ea cacochymia, & postea in morbi declinatione, ne iterum cruda fiat, educenda est; vt abunde demonstrabo libro sequenti cap. xxi. ubi de secunda cacochymiae differentia eductenda verba faciam. Quam sane ob rem, tametsi magnitudo ipsa humorum purgationem indicauerit, nihilominus at cruditatibus, solutius medicamentis, nihil cedentibus prohibetur ne talis purgatio adiuuans fiat nisi ea fiat ratione adhuc fluentis magnitudinis, aut fluxura; Vnde magnitudo ipsa, iam fluxa cacochymia, cum semper alia magnitudini sanguinea annexa, proinde in principio, & in augmento venae sectione magnitudo ea sanguinea tollitur, parcing; etiam ipsa cacochymia magnitudo, cum alia sanguinea in venae sectione molita, egreditur quia crudities

Quo ad motum
magis modo
bi. carochyma
vel id fluxu est.
Vel non dū fluxu
est, q̄ sit fluxu
est, & incipit,
aut fluxu, &
incipit.

Et vaneque
iūram purga
uocem eūcū
sic propoſita
tam indicat.
Quomodo haec
magna de iū
ſura audire.

D
De ontzorging
farg. 2016-4

4. De vieti, rătăcit
pe-aici, pe-acolo. În
de în apăs, de
uor, purgare.

A cruditates, quæ in dicamentis solutius non cedunt, venæ sectioni cedere conantur; vt iam dictum est libro secundo de morbi magnitudine sanguinea capite duodecimo. Secunda verò differentia, quæ magnitudo fluxus, seu incipiens habetur, magnam fluentia cacochymiz sibi contrariam, & citam deriuatam exoptat euacuationem. Sicuti alia fluxura, ac imminens eximiam fluxuræ cacochymiz ei contrariam, & subitam reuulsuam flagitat purgationem. Cum autem iam dictum sit, reuulsionem à longinqua parte, & per antipastum, hoc est per contrarium, reuulsione seruata, catæxi græcè vocata, & per longitudinem fieri debere. Proinde purgationis reuulsuæ dux tantum sunt species sursum, deorsumque vomitiua, ac dexteriora. Ad hæc etiam dictum est, deriuationem à parte propinqua effici debere, cum ea tam euacuet, tum reuellet, partemque per contrarium euehat, seruata etiam catæxi, & ad latera; Ideo quilibet deriuatiua purgatio, seu vomitiua, aut aluiua, semper ad introitum molienda venit, vel sit magnitudo morbi cacochymia incipiens, & fluxus ad partem sinistram, siue dextram, siue anteriorem, siue posteriorem, vel ad circumferentiam. Hæ autem magnitudines dux posteriores, vel in corpore sano, ab alto cadente, vel percussio seu vulneratio adesse possunt, de quibus dicam libro sequenti cap. 7. vel in corpore egrotante, quarum doctrinam tradam libro sequenti c. 6. quomodoque ea fluxio fiat, vel per attractionem, vel per receptionem, ac transmissionem.

Quomodo hæc indicetur.

Et quomodo alia fluxura indicetur.

Omnes deriuatiua purgatio ad introitum fit.

De mag. lib. 1. c. 10.

Ibidem.

CAPVT XIII.

Magnitudinis morbi cacochymiz fluxus, fluentis, & fluxuræ notæ inuestigantur.



Magnitudo autem morbi cacochymia iam fluxa, & præsens, à tumore quidem magno dignoscitur cacochymio. Cum tumor verò cacochymus siue ædema legitimum, seu cryspelas legitimum, aut scirrhus legitimus sit, vel extrinsecus, vel intrinsecus habetur; ac uterque propriis vtique dignoscitur signis. Potissimum autem extrinsecus sensu tactus, & visus percipitur. Sicuti intrinsecus à partis læsæ formatione, & regione, & à læsæ membri obnoxii offensa facultate, & ab excrementis exeuntibus, ac denique ex accidentibus et particula affecta superuenientibus, nobis notus sit. Quenadmodum magnitudo cacochymia fluxus incipiens iisdem cunctis signis incipientibus, sibi proportionatis, innoscere potest. An verò magnitudo hæc per attractionis, vel receptionis modum oboriatur ex his dignosci valet; Nam si primo modo emergat, necessariò vel ex dolore ingenti, vel ex calore, præternaturaliter superaddito attrahente, inuenitur; si verò secundo modo fiat, tunc ex parte imbecilli frigiditate, & humiditate intemperata, & laxa, seu defectiua, facili agnoscitur. Magnitudo verò morbi cacochymia fluxura, & imminens omnibus iisdem notis imminentibus nobis patere valet; sicuti namque magnitudo iam facta est, ita & signa, sibi proportionata iam facta semper sunt. Pariter quenadmodum magnitudo incipiens se habet, eodem modo signa etiam sibi adæquata debent incipere. Denique sicuti magnitudo morbi humoralis imminens reperitur; sic etiam signa sibi æquæ pollutia imminencia perpetuò esse debent.

CAPVT XIII.

Tria magnitudinis morbozæ genera esse, sex verò eiusdem differentias, itidem dilucidandas, proponitur.



Hæc magnitudinis morbi humoralis, vt cacochymiz generibus, simulque speciebus omnino declaratis, ideo nunc ad magnitudinem eandem, vt morbosam, patefaciendam accedere quum est. Tria itaque huius magnitudinis morbozæ inspicuntur genera, & si à Galeno duo tantum exprimantur; aliud verò supponendum. Quandoquidem primum genus à distantia recessus à statu naturali desumpta habetur; Secundum verò à propria partis læsæ substantia suo originali & proprio temperamento iuncta introspicitur. Tertium denique à facultate membri affecti obnoxia inspicitur. Galenus verò duo prima genera tantum expressit hoc modo, Magnitudinem verò duplicem esse, vel propria substantia vitium vel declinationis à naturali habita. Substantia verò facultatum propria triplex est, vt potè partes solidæ, spiritus, & genus carnosum; Quamuis verum substantia tum ex spiritu, tum ex carnosa specie, tum solidis ipsi completur, nam corporibus solidis calor insitus sua natura annexus; qui vitium quidem, & facultatum omnium corporis nostri primus motor corporeus, seu agens corporeum salubre, & insalubre inuenitur. Facultates verò, seu virtutes in spiritu hercle insunt, tanquam

Tria magnitudinis morbozæ genera sunt. Primum genus à recessu à statu naturali. Secundum à parte læsæ. Tertium verò à virtute affectu inspicitur. Galenus duo tantum genera expressit, ac vitium spiritibus, quæ sunt vitia supposita, & motu, & actione differentia declinationis prænotat.

Tomus Secundus.

B in

De Mag. lib. 1. c. 10.

Ibidem.

in calidi innati substantia; in specie verò carnosæ reperiuntur veluti in partium solidarum indumentis, ut etiam dictum est tam in libro primo de medicina certitudine, quàm in libro secundo de magnitudine sanguinea capite decimo quarto. Tertium autem genus Galenus supponit, ut antea asserui. Tres verò differentias secundi generis idem conlucit hunc in modum. Cuius enim trifariam non hæc modò tota, verum etiam reliqua omnia grauius, magnaque reddantur, nempe vel propter afflicta partis præstantiam, vel propter affectus magnitudinem, vel propterea, quod sunt cacothia, sicuti etiam alios tres tertij generis assignat differentias, hoc modo. Alia, quæ ex lesa actionis præstantia præstat. Alia, quæ ex propria affectus essentia; ac tertia, quæ lesam corpus gubernat, assumatur. Quæ sex differentie vndique dilucidandæ veniunt.

Secundū genus
sex est: tres dif-
ferentia.

Tertium genus
alios sex habet
differentias.

CAPVT XV.

Prima secundi generis magnitudinis humoralis, & morbosæ, ut morbosæ differentia, ex loci læsi propria substantia, suoque originali temperamento iuncta exhausta, explanatur.

Prima secundi
generis magni-
tudinis cacochy-
mæ, ut morbosæ
differentia ex-
planatur.

Quæ ob lesa par-
tis præstantiam
habetur.

Et quæ cerebri,
vel cordis, aut
hepatis est po-
tissimum, licet
etiam aliarum
functionum de qua
pauca aliquid
modo præstat
sunt.

Hæc ita morbo-
sa vel essentialiter
vel per vici-
tudinem obcur-
rit.

A quibus hepar
res iustiores
per vici-
tudinem
offendi valent.



Rima verò secundi generis magnitudinis cacochyma, & morbosæ, ut morbosæ differentia membri propria substantia affecta, suo originali temperamento annexa, desumpta propter afflicta partis præstantiam emanans, vel cordis, vel cerebri, vel hepatis est, cum hæ tres partes præstantiores quidem sint, tanquam tria omnium nostrarum actionum principia nobiliora, ut Galenus ex Hippocratis decreto asseuerat. Magnitudo igitur cacochyma morbosæ vel ob cordis læsi, vel cerebri affecti, vel ictericis obcurpati, nobilitatem emergit. Quandoquidem hæ tres partes alijs cæteris cunctis partibus adeo præstantiores longè inueniuntur, ut ne dum prima omnium nostrarum actionum sint principia, ad indiuiduale hominis conseruationem possidendam; verum etiam ad perdurationem perennis successiue adhibere humane speciei facultatem contineant. At verò per integra dilucidatione, adiecto hæc tria principia vel essentialiter lædi posse, vel per consensum à toto genere venoso, aut ab aliqua parte aggroante; ac tunc vel per consensum ab aliqua parte ijs partibus principalibus subordinata, simulque deferente, & præparante, ut à ventriculo hepatis chylum in sanguinem conuertendum disponente, vel à pulmone cordi aërem attrahendo in spiritus vitales conuertendum præmuniente, ut hoc modo calidum cordi insitum, seu alimentum refrigerante, & ali, & refrigerari valeat. Præterea hæ partes principales affecti possunt per consensum à parte his partibus subordinata vna, & inferuiente læoria vocata, ut cor ab arterijs, cerebrum à nervis, & hepar à venis, tanquam à partibus læorijs valde offendi valeat. Vt rursus ill hæc membra præcipua affligi possunt etiam per consensum ab aliqua particula obcurpata, cetera à parte solum ijs membris præcipuis subordinata, vel à liene, aut à chyli fœca, siue à mesenterico, pancreo, vesica urinaria, vasis vtericibus, ac spermaticis, & ab intestinis, tendinibus, musculis, renibus, glandulis, ac tandem à membranis. At verò quoniam quarta partium humani corporis differentia adest, quæ partes nec principales sunt nec principalibus inferuunt, nec subordinatæ existunt, ac solum habent vsum, ut articularum ligamenta, ossa, adeps, pinguedo; à quarum consensu ea tria viscera affligi possunt, licet videatur ill hæc viscera à tertia, & à quarta partium differentia non posse lædi, nisi mediantibus læorijs, antea statutus particulis; cum ab ijs partibus cor offendi nequeat, nisi mediantibus arterijs, & cerebrum per nervos, & hepar per venas tantum affligi valeat. Verum partem præstantem non modo primam partium differentia esse inuenio, sed & secundam differentiam, quæ partibus principalibus tum deferunt, tum subordinata est, ut ventriculus, & pulmo se habet. Cum aut magnitudo morbi tum sanguinea, tum cacochyma triplicem vnguentiam continere possit, vel enim lethalem, vel in eo ut vehementer nostras lædæ actiones, vel per ut rectum inferat magnum, ut vlcera cacochymæ contumacia, ac rebellia sunt. Vnde primo, ac secundo modo integrè propria est magnitudo per se vrgens, ac per se eius causæ immediate magnam indicans liberationem, tanquam magnum euacuantis humores insinuans remediū. Tertio verò modo integrè propria non est magnitudo, immo tantum prout de ea participat vrgentia; & est duobus modis, vel namque quatenus vlcera à cacochymie fluxione, cuius soboles sunt, valde in uia fieri possunt, aut in eo ut eadē fluxione, sicuti à medicamentis vlcera sanantur, iterū gignantur, ac ita incurabilia reddantur, magno aggroatū radio. Et his duobus modis est magnitudo hæc, non integrè propriè vrgens, per se illius fluentis prauis humoris, magnam, & renuissimam, seu deriuatam indicat educationem. Præterquam quod etiam per accidens indiciat, nempe quatenus pars vlcera imminet à prauis succi fluxione aliquo cacochymo tumore magno, superuenientio afflicti valet, & omnibus ijs tribus modis quatenus aliquod membrum præstans, per consensum offendi possit, hic consideratur. Sicuti et si prima, & secunda partium differentia essentialiter non sint læsa, verum ex lesione tertijs, seu quartæ differentie, magnitudo lethaliter, vel

A

4. Meth. 1. 6.

7. Meth. 11. 1.

B

4. Meth. 1. 6.

1. Prehensio
1. 1. 1. 1. 1. 1.

C

D

vel

- A** vel valde obcurpantur, omnino propriē vrgēdo, eius causā immediatā magnā, & citā exoptat sublationem purgantē pharmaco moliendam, vel sit magnitudo humoralis morbi malā confor-
a. Meth. c. 6. marionis, vel morbi intemperiei materiæ cacochymiaē iunctā. Ad hanc itaq; doctrinam Galenus ex Hipp. decretis, respiciendo, exarat vsique in capitis, ventrisq; vulneribus præstantiam lesæ partis indicans ventrem autem hoc in loco non solum inferiorem intelligendam, sed etiam superiorem. Vnde Hippocrates. *His verbis clarē docuit, vlcerebus omnibus, & vulneribus quoties prævalida sunt, purga-
tionem esse vtilem, Nempe Hippocrates purgatio iniquis per aliam plurimis vlcerebus prodest, præ-
terea vulneribus, quæ in capite, quæ in ventre, & articulis, ad hæc ipsi, in quibus esset caries impendit. Pre-
terea, quæ sunt in, & quæ exceduntur, & berpetibus, & reliquis, quæ vlcera diuturna reddunt, etiam,
quæcumque deligenda sunt.* In fine verò capitis air, incipientem fluxionem ad contrariam trahendā ef-
fe, & c. quod à principio hæc à longinquo: postea ab ipsis vlcerebus partibus sit molienda, & c. pharmacū
quod ad bilem fluxam, vel atram, vel pituitam educendam vim habet, dabis tamen id supponit Gal.
quod antea c. 1. 1. dictum est nimirum ipsam morbi sine vim, sine magnitudinem appellare velis pro
indicatrice quādam purgationis adhibenda fluxionem esse ait enim pro indicatrice quādam, necne
pro indicatrice sua natura vrgente primò eripiendā, vt alibi conscribit, in eo quidē curationis con-
silio, quod ab vrgente imitur affectus magnitudo perpendenda est. Quocirca magnitudo hæc per se,
B propriē, & proximē magnam eius causā immediatā, & citam indicat subtractionem.

CAPVT XVI.

Secunda generis secundi magnitudinis cacochymia, simulque morboſa, vt
morboſa differentia, quæ ex membri affecti propria substantia
eius originali temperamento annexa defumitur,
dilucidatur.



Secunda verò differentia morboſi, & cacochymi generis magnitudinis, ex partis
propria substantia obnoxia, suo temperamento originali decotata, defumpta,
propter affectus magnitudinem emergens, non modò morbi solutæ vnitatis con-
spicitur, quoties vlcus, & vulnus adeò magnū, & amplum est, vt sanè id velsu-
turis, vel deligaturis esse coniungendum, verum etiam eò magis longè morbi in-
strumentalis malæ compositionis inspicitur, vt cuiuslibet eximij, & ampli-
tudinis cacochymi, nec non etiam morbi intemperiei à materia cacochymia proficiscentis. Dixi
autem longè eò magis morbi instrumentalis magnitudinem humoralem, & morboſam esse, quā
morbi solutæ vnitatis; quoniam, vt iam dudum vidisti, magnitudo ipsa solutæ vnitatis, non in-
tegrè propria vrget, nec etiam integrè propria est; tum quia non vrget vrgentia lethali, nec etiā
quatenus admodum nostras infestet actionē; verum tantum vrgentia propriæ particeps est, vt,
vrgentia solum radiosa, contumaci, seu rebeli, infelicitè etiam hominem quodam modo viuere
facientem etiam eò quòd ipsa morbi solutæ vnitatis magnitudo humoralis veget, cum à flux-
ione humoris ea maior fieri possit; vel etiam in eo, quòd, sicuti medicamentis rectè ad motus
ipsa magnitudo curatur, simulque sanatur, cum fluxionis humorum soboles sit iterum, atq; ite-
rum tegigni valeat, & hinc in curabilis ea magnitudo reddatur. Verum duntaxat prout ea magni-
tudo solutæ vnitatis tum vulneris, tum vlcis non vrget, nisi prout aegeri, aut regiendi potest, nō
autem prout aucta, aut regenita sit, nam tunc quatenus aucta, & regenita magna solutio vnitatis
est tantum per se indicat magnū vniens auxilium esse ad mouendum; non autem magnū ca-
couchymiaē euacuans indicat remedium; & causa huius rei est, cū ea morbi magnitudo humo-
ralis in fieri, dum suum effectum parit, non amplius in sua natura manet, verum solum in natura
maioris vlcis, vel in naturam vlcis regeniti transit, cum ergo in alienam naturā transmigra-
uerit, nempe in naturam magnitudinis penitus impropria, per se tantum magnū vniens indi-
cans remedium, sequitur quòd nostrum institutum verum sit. Neque mihi obijcias, si asserueris
fluxio humorum, dum fluxerit ad magnitudinem solutæ vnitatis, & eam magnitudinem in na-
turam alicuius naturis humoralis conuerterit, vt in eiysipelam, aut ædemā, & scirrhum. Ergo
ea fluxio, quæ in fieri est, dum est iam fluxa in eam partem, vlceratam, nonne transit à po-
tentia ad actum? si tibi adeo magnitudo morbi humoralis, iam fluxa, facta, & præsens? Præte-
rea si ea magnitudo solutæ vnitatis intemperata, materiæ iuncta: ergo ea potentia magnitudi-
nis fluxuræ, seu fluentis transit de potentia ad actum, dum sit magnitudo humoralis, iam
fluxa intemperata. Nam tibi respondeo dum ea magnitudo humoralis fluxura, seu fluens
ad magnū vlcus, & ad magnū vlcus, & efficit partem vulneratam, aut vlceratam, tumote ma-
gno affectam, vel magna intemperie lesam. Tunc vtique non est magnitudo solutæ vnitatis,
quæ transeat in naturam morbi instrumentalis humorosi, vel quæ transit in naturam magni-
tudinis morbi intemperiei, humocibus annexæ; sed tantum est pars vlcetata, seu vulnerata.

Totius Secundus.

B 2 quæ

Secunda scilicet
generis magni-
tudinis cacochy-
mie, vt morboſa
differentia de-
claratur.
Eaque ob mor-
bi magnitudinem
posuitur.

Obiectio.
Tumra ratio hu-
ius obiectio.

Secunda ratio.

Solutio.
Ad primam &
secundam ratio-
nem.

que acquirat aliam magnitudinem humoralem morbi instrumentalis, & morbi intemperiei humoralis; cum multe sint partes, que has tres morborum magnitudines eodem tempore valeant continere, nimirum, & magnitudo solutę vnitatis, & intemperiei humoralis, & male conformationis simul esse possunt, nihilominus ea magnitudo solutę vnitatis omnino impropria se habet nullam per se humorum indicans purgationem. Verum adhuc dubium cadit; eo quia neque a parte tumefacta, neque a parte magna intemperie humoralis intemperata magna cacochymię educio insinuat; verum dum pars tumefacta, & ad suppurationem apostematis peruenit, solim euacuatio puris incisione partis suppurate adhibenda est, non autem magna humorum purgatione administranda. Pariter membrum humore fluxo intemperatum educatione topica humoris fluxi curatur, ut cerebri masticatorijs, & nasi putijs curatur, si hoc modo intemperatum esset, similiter renes, & vesica per urinam purgantur, vterus per menstrua, & hepatis pars gibba per urinam. Cui respondeo quoties membrum aliquod apostemat, prius quam apostemetur, semper deriuationis gratia debeamus nos, tum ad reuellendos humores fluentes, tum etiam ad euacuandos pro maiori parte eos humores, iam fluxos in partes circumadiacentes membri apostemandi, prius quam ab ipsis partibus, & circumadiacentibus ad eam partem apostemandam fluant. Sicut etiam de magnitudine sanguinea phlegmonosa, iam fluxa dictum est loco proprio. Similiter etiam eadem responsione dubio de magnitudine morbi cacochyma, fluente, simulque fluxa ad partem non intemperatam, sed ad partes adiacentes partis intemperate satisfaciā. Insuper eo magis responsum dabo, quod antequam fiat euacuatio topica, semper tenemur nos maxima euacuacione loci intemperati, vel aluma, vel vomitoria, pluries administrata membrum illud purgare, ut vberim dicam, ubi de cruditatibus recte dignoscendis, recteque curandis verba faciam. Quandoquidem toto corpore iam omnino tum sanguinis missione, semper tenemur nos maxima euacuacione loci intemperati, vel aluma, vel vomitoria, seu nasi purga accedamus, prius pilulas capitalis prebemus post primum elapsum fontanus illico noctis tempore super iterum dormiendos sic etiam de omnibus alijs partibus asserere nunc dum esse, clare perspicitur.

Dubium.

Solutio dubij.

Alia solutio.

CAPVT XVII.

Tertia secundi generis magnitudinis humoralis, & morbosa, ut morbosa differentia, ex partis substantia propria afflicta, suoque originali temperamento ornata, perspecta, declaratur.

Tertia secundi generis magnitudinis cacochymie, ut morbose differentia, ex partis substantia propria afflicta, suoque originali temperamento ornata, perspecta, declaratur.



Estque verò secundi generis magnitudinis cacochymie, & morbose, ut morbose differentie, ex membri obnoxij substantia propria, suoque proprio, ac originali temperamento iuncta, desumptę habetur propterea quod sunt cacochymie, que cacochymie magnitudines a Galeno explicantur, hunc in modum principio vocabulo quo ad uocem cacochymie, id est maligna appello. Verum hæc magnitudo maligna omnino lethalis non est, immò admodum nostras sedendo actiones periculo resecta se

Morbus cacochymie non est morbus intemperatus.

habet, vel etiam tantum parum nostras offendit actiones, tamen vix reclusa, contumacia, & rebellis virgencia, non integrè propria, ut ex Galeni sententia exhauro, cum hæc verba Autor ipse nobis consignauit, cacochymie morbos, id est malignos appellamus, quicunque periculum minenter, spem salutis non adiungit. Nunc quod suum periculosum existit, non e cacochymie sed mortiferum dicitur. Postea aliam magnitudinem malignam, reclusam, contumacem, ac rebellem, ex planando, inquit, vlcera, que omnibus ritę dactylisque saluti, non sanantur, a medicis e cacochymie, id est maligna contumacia, rebellisque dicunt. Quam particularius alibi dilucidat his verbis e cacochymie vlcera ex dyspepsio clarius intelliguntur, quia eam ex humorum confluxu, vel vltiorum, vel acriorum oriuntur, sine eo, quod locus affectus, hanc dispositionem habuerit, ut licet bonum sit quod influit; tamen ipsum locum affectum corrumpat. Dyspepsiois nomino, quia distam dispositionem iam obtinet principio vocis abudo e cacochymie, id est, maligna appello. Quocirca magnitudo hæc maligna est, ob dispositionem eam malā membri, valde offensa, bonum succum et in se iam fluxum, coriompente; ex quo succo corrupto necesse est, ut eo magis is locus obnoxius corrumpatur. Nihilominus et magnitudo morbi cacochymia non maligna, sed contumax, diuturna, ac rebellis sine ea loci affecta mala dispositione, ut febiles humorum prauorum, copia etiam peccantium, ad eam affectam partem confluentiu, emergit, magnam indicans purgationem, tum ne ea confluxione augetur, tum ne sua curatio medicamentis, rectè adhibendis, prohibeatur, tamen propterea cacochymie malignus morbus is est eam malam habens dispositionem; nam morbum constat e cacochymie esse, ubi cum rectè omnia administrantur, nihil fiat minus ob eā malā dispositionē. Ceterum quoque alio modo hanc cacochymia explanat magnitudinem, que ut prauorum succorum febiles sit, ob partem suā naturā vacuam, ac imbecill-

4. Morb. 1. De corp. mor. p. 1. g. 1. 1. 1.

Com. 1. p. 1. 1. 1. 1. 1.

1. Ibidem. 1. De corp. mor. p. 1. g. 1. 1. 1.

A imbecillum, non modò contumax, ac rebellis habetur, verùm etiã maligna introspicitur, dũ ait.

4. Meth. 6. *Quoniam etiam cacochet statim fieri quacunque in articulis accepta vulnera sunt. Vbi enim tendones, & ner in carne vacua, atque ossa loca vacua sunt, ut ossium iuncturae inspicuntur, hic dolores vigilantes, consilii mis, delirij periculum instat. Iam exceduntur ea, tum cacochet sunt, tum malorum suc corum soboles.*

3. Epid. 3. c. 11.

*Qui morbi ma-
gis sunt in cacochet.*

Advenit autem Calculus magnitudinem ipsam cacochetam, malignam, etiam mali modi, seu mali moris vocasse, ut contradistinctam à magnitudine simplici, quæ cacochymiz fluentis, & fluxus detruatua, ac reuulsiva purgatione facta, exinde facillè sanatur. Insuper perpende eundem Autorem febres cacochetam mali modi, seu mali moris febres, & malignas etiam appellasse; quæ, ut plurimum, acutè simpliciter inveniuntur. Ex his autem hæcenus allatis, plures morbosas, & cacochymas inuenies magnitudines, sub hac cacochetia comprehensas magnitudines: Quandoquidem vel hæc magnitudo maligna inspicitur, periculo referta, non tamen omnino mortifera, sed difficilè medicamentis cedens, quæ adhuc vel lethalis est, vel nostras admodum lædēs actiōis confpicitur; quæ vel morbi instrumentalis malæ conformationis habetur, aut morbi inteprietis humoris innoxia; ac harum magnitudinum quæcumque eius humoris, tanquam causæ eius immediatæ, sibi contrariam, magnam, ac citam insinuat purgationem, & hæc omnes magnitudines integre propriè existunt. Præterea etiam magnitudo ipsa cacochetia parum nostras offendens fun

B tiones reperitur, quæ vel maligna dysepulotica est, ob malam partis affectus dispositionem succum bonum iam fluxum corruptum pectem oborta, vel maligna propter partis lesæ imbecillitatem ex ear nis vacuo exorta, inuenitur. Et quæ prauorum humorum soboles est. Alia verò datur, quæ maligna haud habetur, verùm diuturna, contumax, ac rebellis perspicitur, non propter eam malam, dispositionem bonum succum fluxum corruptum pectem, nec ob eam carnis, seu ossis vacuitatem; sed propterea quod pars affecta imbecilla apparet, & hinc ad eam succi prauis fluendo accret, quo minus ea magnitudo curari, & sanari possit, ut in crurum veteratis, & nō malignis viceribus vñ veniit. Ac hæc tres magnitudines ut videntur participes sint, & ut propriè sed non integre, ut capite præcedenti, & libro primo de magnitudine sanguinea ostensum est, per se propriè, & proximè extimari, & reuulsio, seu detruatua suam cacochymiz indicat purgationem. Quarum trium differenciarum Hippocrates meminisse mihi videtur, dum hæc protulit verba. *In magna vicerū parte inferiorum alium purgare conuenit, non etiam in viceribus capitis, & ventris, & articulorum, tū in quibus partis corruptela immineat, itemq̃, in his, quæ excedunt; & serpunt, tum aliis in his viceribus, quæ inueterauerunt.* Quæ omnia colaudat Gal. At verò dubitatu dignum esse inuenies, cum in dysepulotica viceribus cacochymia nō adest, immò bonus succus ad partem lesam ingruit, & ibidem corruptitur. Ergo ibi non adest magnitudo cacochymia fluens, nec fluxura; quæ cacochymiz purgationem indicet. Cui respondeo cum bonum succum ad partem affectam consuetè su peruenientem quidem esse, ac ut succus su perueniens sit fluxurus, & fluens est, ad locum afflic tum ingruens; ac tunc quatenus in membrum dysepulotico vlcere offensum influit, corruptur, ac ideo ea magnitudo humoralis fluxura, & fluens, quatenus in vlcus malignum dysepulotico in incurabile conuerti valet, eius humoris superflui fluxura, & fluentis sibi conerariam reuul siuam, seu detruatuiam insinuat purgationem; ut etiam in quacunque morboſa cacochymia magnitudine violentè, & repente genita, vbi humores sani sunt, ut libro sequenti capite 7. demon strabo. Adverte autem in magnitudine dysepulotica, vbi magnitudo tum sanguinea, tum cacochymia adest, tamen longè maior sanguinea reperitur, quàm cacochymia; sicuti in non dysepulotica è contra maior magnitudo cacochymia inest, quàm sanguinea.

*3. De vicerib
hæc Periculis
inueniunt.*

4. Meth. 6.

Dubium.

*Respondet ad do-
ctorem.*

C A P V T X V I I I.

Prima tertij generis magnitudinis humoralis, & morboſæ differentia, ex facultate laxa relata, pateſcit.

D

Rima autem tertij generis magnitudinis cacochymiz, & morboſæ discretia, quatenus morboſa cōtinetur, quæ ex virtute, siue facultate, siue actione, siue functione offensiva refidet. *Ex laxa actionis præstantia præstat. Ipsa quidem ex substantia, tunc virtutis, siue facultatis, aut actionis obnoxia præferturque, cum ex eadem magnitudine morboſa, tamen sanguinea antea explanata, nec non ex prima secundæ generis discretia capite 5. dudum declarata, satis manifestè vigeat; ideo*

nunc pauca mihi dilucidanda veniunt. Quandoquidem ex communi doctrina generica magnitudinis morboſæ sanguineæ, ut sanguineæ, etiam cacochymiz competente magnitudini, ob actionis, seu facultatis obturpationem præstantiam desumpe, facillè huius magnitudinis in cognitionem adipisci poteris, si hæc duæ magnitudines, ut morboſæ genere conueniant, ut verò illa sanguinea, hæc autem cacochymia differant specie. Præterea omnes conditiones magnitudinis cacochymiz morboſæ propriè afflicta, partis præstantiæ narrat, et huic magnitudini ex laxa actionis præstantia acceptè comparari valet. Nā conditiones mēbris præstātibz assignatæ, nēpe cordi, cerebro, iecinoti,

Tomus Secundus.

A 3 ventri.

*Prima tertij ge-
neris agnoscit
ex cacochymia,
ut morboſa dif-
ferentia expe-
ditur, quæ ex af-
fectu actionis
præstantia desi-
nit.*

7. Meth. 12.

*Lib. 1. de mag-
nitudine.*

*4. Meth. 6.
cap. 13.*

ventriculū, & pulmonē, his quidem hæc assignatæ sunt, ob eorum virtutes, facultatesque præstantes affectas; vt cerebri virtus imaginatiua, discursiua, seu memoriatiua, vel sensitiua, siue motiua ob-
 turpata esse valet; & cordis facultas vitalis, aut pulsantis, vel irascibilis, animosa appellata ob-
 noxia; & hepatis facultas sanguificatrix, vel ventriculi virtus chylicificatrix, & pulmonis respira-
 tiua facultas afflicta esse potest. Ipsæ autem facultates præcipue vel per prothoparyam, vel ex
 simphathya, seu consensu aliarum partium, facultatumue non principalium male afficiuntur;
 quarum omnium tum partium, tum facultatum non principalium iam fusè memini locis citatis.
 Speculator autem substantiam suo originali, & proprio temperamento decoratam, virum,
 seu facultatum tum lazarum, tum non, triplicem esse, & propriam, Nam *virum substantiam tum,*
ex spiritu, tum ex carnosa specie, tum ex solidis ipsis complemur. Hæc autem substantia perpetuò
 sicuti affligitur, necesse est, quod virtus eius quoque offendarur, Eandem sanè ob causam nulla
 actio, nullaque virtus afficitur, quin etiam substantia propria, suoque originali temperamento
 ornata, simul cum suo membro organico lædatur. Principaliter autem omnes humani corpo-
 ris facultates solum à partibus solidis, spiritu, seu calido, ijs in se originaliter temperato decoratam, deco-
 ratas proficiscuntur, vt iam abundè ostendi, vbi de calore naturali disputationem habui. Species
 autem carnosa dumtaxat eas partes in suo robore tuendas solidas à Deo, & à Natura procrea-
 ta est, veluti solidarum partium indumentum. Ea propter illa specie læsa carnosa, necessariò
 non nisi partes solidæ quoque obturpantur. Quibus ita obnoxii, consequenter etiam vires, &
 actiones non possunt non affici. Pariter cordis solida parte læsa, quæ spiritum gignit, vires quo-
 que, & actiones spiritus cordi insiti affliguntur. Hinc etiam morbi magnitudinē cacochyma,
 præstantia actionis læsæ, virtutis affectu præstantis, non minùs à specie carnosa valde læsa produ-
 ci potest, quam etiam à solidis partibus læsis, & à spiritibus læsis gigni valeat. Verùm differen-
 ter; quoniam à genere carnoso quidem, vt à fomite, seu à subordinato, ac inferuente, ac mediā-
 tibus partibus solidis affectis, seu mediantibus spiritibus læsis, magnitudo cacochyma præ-
 stantia actionis læsæ præcellentis facultatis affectu oboriri valet. A partibus verò solidis offen-
 sis, seu à spiritibus obnoxii magnitudo ipsa immediatè, ac principaliter nullatenus specie car-
 nosa læsa progigni valet. Præstantior autem magnitudo cacochyma alia altera est, in eoque
 præstantior actio læsa, seu virtus affecta habetur, in præstantiori substantia, instrumenti offensi
 implantata; cuius rei, cum iam satis lib. 2. de mag. sang. cap. 18. meminimus. Ideo hic opus non
 est, quod de hac re dicam. Verùm tantum inquam quod purgatio maior, aut minor es-
 se debeat, non prout actio, seu virtus loci præstantioris, aut minùs præstantis obnoxia fuerit, ve-
 rum quatenus fluxio cacochymie suo motu in via disposita ad eam actionem, seu virtutem ma-
 gis, ac minùs lędendam se habet, ac in eo, quod ea fluxio cacochymie peioris, aut minores sit,
 aut morus celerioris, seu velocioris, vel tardioris, vel cacochymie copiosioris, aut minùs copio-
 si; quæ autem trium differentiarum humorum, motu peccantium in valida purgatione reuocenda-
 rum iam Galenus meminisse, mihi visus est, vbi dixit, *que enim ex humorum confluxu nempe velo-*
ci, vel multorum, vel æquum oriuntur. Nam quo ad principalem aliquam partem principalem læsa, vt
 hepar est leuius purganda, quam pars non principalis, vt lien immittitur, qui dum læsus est, admo-
 dum purgandus; hepar verò leuius liene purgandum, cum lectur sanguificationis officina sit.

Galeni verba.

CAPVT XIX.

Secunda tertij generis magnitudinis cacochymæ, & morbosæ, vt morbosæ
 differentia, ex virtute contristata perspecta, exploratur.

Secunda tertij
 generis magni-
 tudinis cacochy-
 mæ, vt morbosæ
 differentia ex-
 ploratur.
 Que ex propria
 morbi fuerit in
 affluente affectu
 elicta cap-
 tua.

Magnitudo he-
 par in pectus ex
 fuitur cordis
 & hepatis, non
 uero cerebri
 lethalia inq-
 uat.



Secunda verò tertij generis magnitudinis humoralis, & morbosæ differentia, ex
 virium substantia propela, suo temperamento originali prædita, iube factata per-
 pensâ quidem est, que ex propria affectus essentia sua natura magna, seu graui, vel
 lethali, vel admodum nostras contristante functionis exiliatur: quæ exactè
 propria est integrè sua natura vrgens primo tollenda, quæ vel præsens, vel inci-
 piens, aut imminens viget, vel cacochyma copiosa, aut intemperata, vel impu-
 ra, vel fluens, seu fluxura; hinc per se, exactè propriè, & proximè, vbiq; & imper necessariò
 cacochymie, seu eius causæ immediatæ, magnam, & subitam sibi contrariam indicat subtrahonem;
 tanquam magnum euacuans insinuet auxilium. Contemplor autem magnitudinem hanc
 per se vrgentem, lethalem in plerisque ex virtute cordis vitali, & pulsantis afflicta emergere; nec
 non ex hepatis sanguifica facultate valde contristata exoriri; & si etiam interdum hæc ex cerebri
 facultate obcurpata, & ventriculi chylicificatrici virtute admodum offensa, & à pulmonis respiratione
 abolita imminente promanet; Nā ab his facultatibus admodum læsis maiori ex parte hec
 magnitudo per se vrgens præfert, quatenus vehementer nostras malè afficit functiones, quibus
 hunc in modum labefactis, etiam in morbis chronicis magnis ita perspectis, semper magnitudo
 ipsa integrè & essentialiter vrget, infelici, & functionalis vrgentia, primò eripienda; purga-
 tione ei contraria administranda.

CAPVT

1. Med. 4.

De med. em.
lib. 1.

B

C

1. De em. vel
per gen. 11

D

7. Med. 21.

CAPVT XX.

Tertia differentia tertij generis magnitudinis humoralis, & morboſaꝝ, vt morboſaꝝ, ex virtute labefaſcata deſumpta perpenditur.

7. Meth. 4. 11.



Tertia autem tertij generis magnitudinis cacochymiaꝝ, & morboſaꝝ differentia, ex facultate laſa exhauſta, *qua ex facultate, qua leſum corpus gubernat aſſimatur*. Virtutes autem quæ totum noſtrum gubernant corpus, à tribus quidem præcipuis emergent partibus, nimirum à corde, cerebro, & iecinore, veluti à tribus omnium corporis humani operationum principijs. Nam cerebrum quidem functionem carum, *qua ex voluntate oriuntur, cor vitalium appellatarum, iecur verò ca-*

Venia tenij ge-
neris magnitu-
dinis cacochy-
miaꝝ morboſaꝝ de-
ſumpta perpendi-
tur. *Quæ ex faculta-
te, qua leſa cor-
pus regit, aſſi-
mu-
tur conſtituta
perpenduntur.*

B *rum, qua alimonia inferiunt, quas & naturales vocant, & ſicuti hæc omnium corporis noſtri actionum principia præſeſerunt, ita pro noſtro omnino regendo corpore, ſecundum omnes noſtras exercendas functiones arteriam cor, & venam hepar, & neruum cerebrum continent, ceu principia continentia, & latiora actionum horum trium principiorum, quæ actiones ab his tribus membris effici nequeunt per ſe ſolis, immò tantum arteriaꝝ, venæ, & nervi auxilio. Quandoquidem tamenſi cerebrum corpus humanum ſecundum principes functiones, ſcilicet ſecundum imaginationem, reminiſcentiam, & intellectionem rectè gubernet, non tamen id in ſenſatione, & motione regere valet, niſi neruorum ope. Pariter licet cor totum noſtrum adminiſtret corpus circa animoſam facultatem etiam iracibilem virtutem appellatam, non tamen id circa vitalem, & pulſatilem functionem, nec etiam circa functionem, nec etiam circa influentem calorem dirigere poteſt, niſi arteriarum beneficio. Similiter quauis hepar ſanguinem gignat, nihilominus quælibet noſtri corporis pars ſanguinem alimentalem attrahere nequit, niſi à venis. Hæc igitur magnitudo morboſa, *qua ex facultate, qua leſum corpus gubernat, aſſimatur, ex aliqua harum facultatum, noſtrum regentium corpus læſum aſſiſcita delumi debet, quæ facultas laſa, vel à membro dontaxat affecto emanat, vel tantum à parte latoria; vel ab vtroque obcurpato emergit loco, vel ſit magnitudo morboſa cacochymia copioſa, vel immoderata, aut impura, vel fluens, ſeu fluxura. Verum differentia, quæ inter venas, arterias vna, & nervos adeſſi, perpendenda venit, quatenus iſtæ partes horum membrorum principalium latorum inveniuntur. Quoniam cordi, & cerebro facultates influentes inſunt, in hepate verò nulla quidem influens virtus reperitur, vt alijs dixi, primo lib. de medicinz certitudine. Quocirca nervi, & arteriaꝝ cerebri, & cordis latoriarum partes exiſtunt, quo ad facultatem influentem omnem à cerebro per nervos, & à corde per arterias proficiſcentem; venæ autem latoriaꝝ iecinoris partes inveniuntur, quatenus quæcunque noſtri corporis particula ſanguinem ſibi adequatum alimentalem pro ſuo nutrimento, ab hepate exortum, à venis, tanquam à ſanguinis ſinibus, ad ſe attrahere poteſt. Vnde ſicuti iecur ſine vlla influente virtute, ſanguinem, ab eo genitum per venas omnes æquè diſtribuit: ita etiam æquè ab illo ſanguis ab vnaquaque particula attrahitur. At verò cor non modo vitali, & pulſatili facultate influendo, totum regit corpus, verum etiam cor ſuum calorem, ei inſitum, primo-genitumque, cæteris cunctis partibus accommodatum, toto corpori influendo, totum regit corpus, ſuo calore viuido, aſuali ex influente eo, & ex membrali compoſito, atque vigente, id ita conſeruando conducit. Alia verò hic pro huius magnitudinis, doctrina vndique patefacienda, addere poſſim, quæ cum iam ſtatura ſint, vbi hanc ſanguineam explanationi magnitudinem, iecur fruſtra non repetam. Verum tantum**

2. De magn. ſu-
c. 10.

D inquam hanc humoralem magnitudinem morboſam per ſe, & primò primariè vrgentiali primò tollenda eius humoris peccantis, ceu eius cauſæ ſyllogiſtiz magnam ſibi contrariam, & citatè iudicare ſublationem, purgatione molientiam.

CAPVT XXI.

Magnitudinem cacochymam morbi, non vt magnitudinem, verum, vt morbosam cacochymam, à naturali habitu plùs, ac minùs recedentem, per se maiorem, ac minorem cacochymiaè mensuram educendam esse, indicare, demonstratur.

Mensura reme-
di agendi tem-
poris à morbi
magnitudine
inducitur.
Mensura vero
rebus ad aliqd
à perueniendi
valido motore
vitium defici-
unt.
A quib. maior
seu minor tem-
pus cacochy-
mie educenda
esse possit.



Vm remedij quantitas, seu mensura, à morbi quantitate improprie vocata, nempe, à morbi magnitudine indicetur, Galeni testimonio. Quæ morbi quidem magnitudo solum per mensuram distantia recessus ab habitu naturali perditio mensurari valet. Quæ sanè magnitudo etsi valde, difficile mensurari possit. Nihilominus ait, Galenus eam vtiq; à natura agnoscant, & à viribus permittentibus, & ab ætate, & ex tota antea acta vita, consuetudine, iam in naturam aduenturiam conuersa, ex mutatione habitus corporis, ac temperamenti, & coloris, atque ex aere nos ambiente, regione, anni tempore, ac cœli statu, conseruatione, seu varietate, nos indagare posse. Cæterum non à magnitudine morbi hæc mensura educenda desumitur genericè, cùm quid agendum indicans, non genericum esse debeat, sed specificum. Vnde magnitudo hæc, vt morbosà, & cacochyma est, indicat maiorem, seu minorem humorum mensuram vacuandam esse; prout maius, aut minus peccatum inest copia, qualitati, impuritati, ac motui, seu minori, tollendum; vt etiam de magnitudine sanguinea proprijs locis iam satis demonstratum est. Vnde à specie cacochymia, magnitudo vt morbosà & cacochyma virens, à qua produciunt, & à peccato eius maiori, aut minori, prout magnitudo cacochymia magis, aut minus distat, à naturali habitu, maiorem, seu minorem cacochymia vacuandam mensuram per se indicat. Verum enim verò mensura ipsa cacochymia educendæ, non modò à quantitate, & à specie, & à peccato cacochymia peccantis vacuandæ. Verum etiam à naturæ vitium permittentium tolerantia indicatur. Quo circa perpetuò ad ipsas naturæ vires validas, seu imbecillas, aut medio modo se habentes, oculos dirigere ac intentionem pendere cogimur, vt iam c.6. ostensum est. Vnde copia cacochymia maior, aut minor, vt coindicans mensuram educendam, indicat per accidens, vt coindicans. Nam indicans, vt virens principale per se, certè morbi magnitudo cacochymia est.

CAPVT XXII.

Omnis morbi magnitudo tam cacochyma, quàm sanguinea ex tribus morborum principijs quidem confurgit, nempe ex mala victus ratione, ex cœli statu incongruo, ac ex valente accidenti Hippocratis decreto.



Exerit, vt cuncta, quæ de morbi magnitudine cacochyma, simulq; sanguinea, hucusq; in medium allata, à me facere, ad sua generalissima principia perstringam; tum facilius dilucidationis studio, tam penitioris doctrinæ gratia; Hippocratem vtiq; inuenio, ita exarantem: Cum tria sint principia, ex quibus morbi oriuntur. Vnum quidem iam à me dictum est, quaque, & quanta in corpore efficiat. Ostendi eum quomodo, & quam ob causam homo nisi reparetur, agrotet cùm dixerit. At nunc ex illius quam ob causam, homines agrotent, mihi discendum est, simulque exponendum, quæ sint morborum principia, & quæ homini quidque efficiat, statim autem primum principium patet, hanc in modum. Atque autem, sententia, si cibi quidem plus iusto copiosius, iam concocti intus morantur, neque homo reparetur, & altera cibaria insuper adiciantur corpus priore humore, & recenti plenum lucet, indeq; homini febris contingit. Verum sic oborta febris, neque periculi plena, neque vehemens est, in qua humor copia equalis paulo plus nobis molestus est. Si enim sit res habet, & quis admodum sit robustus, eaq; quæ conueniunt, adhibeat, sanus euadit. Si in massa sanguine æquabiliter multo plùs equo multitudine aucta fuerit, tunc etiam periculo plena, ac vehemens profectò erit, multoq; plus nobis molesta febris erit; vt synochæ febris viù venit, in qua sanguinis missio, quàm copiosa conuenit; ac id, quod in mala victus ratione copiosiori adhibita contingit, idem pariter de cibis mali succi, aut difficilissime coctionis attendendum venit, quorum cùm meminere Hippocrates, inquit. Omnia pro hominis natura, & viribus composuere, rati eibos valentiores ingestos, quod à natura superari non possent, dolores,

7. Morb. c. 4. h.
21. Meth. c. 1.
c. 6. q. 1. c. 1. c. 1.
de 15. de 15. de
anis coctione.
15. de 15. de 15.
15. c. 4.

B
7. Meth. c. 2.
q. 1. c. 1. c. 1.
15. de 15.
9. Meth. c. 15.

C

D
De morbo
15. de 15.
Lib. 1. c. 1. c. 1.
15. de 15.
15. de 15.

De pila mol.
p. 15.

A dolores, morbos, & mortem afferre: eas verò, quia à natura superentur, alimentum, incrementum, & sanitatem praestare. Idipsum de cibis cacochymis intelligas; qui cum pravi succi sint, non nisi malsa humoralis etiam cacochymia, ex ipsis cibis gigni valent; ex qua postea facillimè morbi magnitudo cacochymia vrgens promanat. Verùm secundi principij magnitudinum morborum mentionem fecit Hippocrates, statim postquam primum principium statuerit, his verbis. *Alterum est, si quæ ex celo pendunt, minimè sint commoda.* Ab aere enim nos ambiante, corpus nostrum vel tuerur, vel offenditur; tuerur nanq; à celi statu, aerem temperatum, ac salubrem, & suam producente. Afficitur verò à celi tempestate, aerem intemperatum extremè, hinc etiam insalubrem, insuauemq; efficiere. Læditur enim corpus humanum, non solum in humoribus, verùm etiam in partibus similibus, ac instrumentalibus, quæ & chylum, & sanguineam massam celebrant, vt ventriculus, & hepar est. Quibus intemperatis facillè cacochymia oritur, à qua sanè, si magnitudo morbi cacochymia proficiscatur, vt vrgens, humorum vacuationem per se indicat. Deniq; verò tertium principium morbi magnitudinis statuit, inquit, *Tertium est, cum quid violentum inciderit.* Violentum autem esse dico, & casum ab alto, & vulnus, & percussione, & immoderatam laborem, & alia id genus. Ac horum principium, vis si magna fuerit, maximum est. Verùm hæc magnitudo violenter facta, si quò ad succum non fuerit, tunc impropria morbi magnitudo erit, & magnū euacuans remedium non indicabit, vt magnam vulnus. Si verò quò ad succum fuerit, vt casus ab alto, & percussio, & immoderatus labor, quæ succorum alteratione, & fluxione vel magnitudines cacochymie, aut sanguineæ fieri valent, tunc magnitudines propriæ dici possunt, & magnū euacuans indicant auxilium. Neque mihi obijcias, inquit, morbi solutæ vnitatis magnitudo, magnum vniens insufficiens remedium, est magnitudo propria: ergo malè institutum est, asseuerare hanc magnitudinem impropiam esse. Quandoquidem respondeo magnitudinem morbi propriam esse tantum eam, quæ vt vrgens sua natura, primò eripienda sit, vt Galenus statuit, & vt lib. I. de magnitudine sanguinea capite iam ostensum est, cum itaque morbi solutæ vnitatis quælibet magnitudo sua natura non vrgeat, nec ideo sit primò adimenda, proinde nec etiam propria est magnitudo. At verò morbi magnitudo quò ad succum cum sanguineal, cum humoralis quæcunque sua natura vrgens, propria quidem est. Hinc eò quia hæc magnitudo vel vrget omnino integrè, vt est magnitudo quò ad succum vrgens, vel vrgentia lethali, aut infelici, vel non integrè, vt vrgentia tardiosa se habet, proinde etiam magnitudinem eam, vel integrè propriam, vel non integrè propriam esse demonstrari.

Dubium.

Finis Libri primi.





DE MORBI MAGNITVDINE CACOCHYMA

Vrgente, cacochoymia etiam educationem necessario
indicante.

LIBER SECVNDVS.

Qui videlicet complectitur exactissimum tractatum. De vniuer-
sa totius humani corporis cacochoymia educenda.

*Qua de causa tresdecim modi ipsius cacochoymia ad amissim explicantur: Et præ-
cipue locus, ac tempus purgationis illius indicantur.*

Ideo quilibet casus humores purgandi, qui Medico euenire posset, disqui-
ritur, ac dilucidatur.

*Hinc de leniente in febris cacoethis incremento exhibendo, Ac de Vesicantibus in
paraphrenitide, & cardialgia relictissimè admonendis, laconicè
pertrahatur.*



CAPVT PRIMVM.

Libri presentis scopus, atque vtilitas ostenditur; simulque: Cacochoymia A
genericè descriptio, ac eius differentia indagantur: præsertimque;
tresdecim ipsius differentia dilucidanda proponuntur.



VM duæ huius libri intentiones potissimum snt, nimirum Cacochoymiam
in relatione tum ad morbi magnitudinem, tum ad euacuationem molien-
dam, aut non dilucidare. Verum quoniam in præcedenti libro de morbi
magnitudine cacochoymia sua natura, cacochoymia ipsius purgationem indi-
cante, egerimus: Ideo modò de ipsa cacochoymia ordine proposito agere
tenemur. Alia ergo intentio est ordinem, ac tempus cacochoymiam ipsam
educendi, explanare, ac etiam magis mensuram, & modum purgandi illa,
iam libro primo examinatum, penitus declarare. Sed quia doctrinali methodo pergere cogor;
prius cacochoymia ipsius in suo genere generalissimo accepta, descriptionem aggrediar: subin-
deq. eam in suas differentias diuidam. Est igitur cacochoymia prauus succus: vt libro præceden-
ti cap. 5. iam diximus. Qui considerari potest duobus modis; nempe vel per se, & secundum
suam

A suam naturam, aut per accidens: per se sumitur quotiescunque nulla habita ad locum, uel motum differentia ipsius prauī fucci, in humano corpore contenti, si praua aliqua sint prædicti qualitate. Quæ quidem qualitas uel est alicuius putredinis, quæ est magna, seu toto genere præter naturam praua, & alia quæ à naturali statu non admodum recedit; Vel medio modo se habet.

Quæ tres differentiæ ruius conflantur, uel in primis qualitatibus, uel in secundis, atque fit ficut uel in pituita, uel in bile, uel in melancholia, uel in ferro excremento, uel in atterogeno quoddam mixto, æ prædictis omnibus conflante. Uel ipsa cacochymia non est putrida, sed tantum uitium est concoctionis, facultatis concoctrices, partis coquentis, quæ iterum scindi potest in pituitosa, in biliosa, in melancholicam, ferofam; si uero consideratur cacochymia secundum accedens, hoc est non quantum ea cacochymia est; tunc in illa poterimus considerare quantitatem, uel motum. Quantitas uero uel magna, uel parua est; motus autem quantum humores prædicti, qualitate donati mouentur, suum impetum faciunt, uel a parte ignobili, ad nobilem, uel contra à nobili ad ignobiliorem. Vel rursus à nobili, ad nobiliorem, & motu, uel ueloci, quod præcipue contingit bili, æque tenuioribus humoribus, uel lento, quod crassis, & uiscidis; quæ omnia accurate medico perpendenda sunt, si rectè euacuationem, alterationem, reuulsionem, deriuationem medicandis.

Galena.
Etil 1 de frop.
cu la 1.

B moriturus est. Ceterum precipue pro meo iolum instituto inferendum, hanc distinctionem attulimus. Quandoquidem ipsa uel absolute uel in relatione consideratur; Rursus autem in relatione uel ad morbi magnitudinem cacochymiam, aut ad purgationem agendam, seu non agendam. Quoniam igitur absolute eam alio in opere de cruditatibus recte dignoscendis, recteque curandis inscripto declarauimus, in eo autem, ut relata sit ad morbi magnitudinem cacochymiam libro o primo huius operis dilucidata fuit. Quocirca supersedeat, ut nunc de ea, ad purgationem molliendam relata, aut non limitata diem. Verum aduerte, quod non solum, eam ad purgationem agendam, aut non, spectantem considerabo; uerum etiam ut simul relata ad morbi magnitudinem, cacochymiam necessariam ipsius cacochymie purgationem indicentem. Nam interdu, etiam cacochymie eductio ab ipsa morbi magnitudine indicetur, atque non aliquid impedimentum, eam expurgare nequimus. Quam differentiam, ut genus subalternum, in tresdecim differentias subdiuidendo, integram eius doctrinam amplectar, que tresdecim differentie in hoc ipsius capitis in quadam Tabula patebunt. Maxime autem utilitatis tractatus hic erit: Quoniam omnia, que ad humorum purgationem spectant, ita dilucidè, & accurate Hippocratis, & Galeni auctoritatibus, rationibus, experimentis, & exemplis ad uerbum declaratis, manifestauerunt, ut in quocunque casu, qui medico repente occurrat, promptissima, in Arti medicæ danda opera, semper esse possint.

Primum significatio est, ut hi succi crudi morbi fici sint, morbi magnitudinem cacochymiam, gignentes, vt contradistinctum a maturacis succis, in morbi vigore vniuersali, tum a fanis, tunc a partim coctis in principio incrementi vniuersalis.

Secunda significatio est vbi humores quieti stabiles, ac firmi in loco angusto, vel in lato, contradiſſionis à motu necantibus succis.

Tertia significatio est, quoties humores crassi, glutinosi, ac potentia passivi immo biles tum, ex se, tum ex augusto loco, contra diluendi a tenuibus, & a crassis in loco amplo residentibus, qui educi possunt.

Primae differentiae sunt ad purgationem inepti: Ac isti tres significationes habent, qui putandi non sunt.

Tertiaz differentiz sunt partim cocti, qui in incrementi vniuersalis exordio ante quintum diem subducendi.

Quartæ differentiæ sunt motu indeterminato peccantes, turgentés diâ, illico purgandi.

Quindecim differētiæ sunt motu determinato peccantes statim expurgandi, qui morboſi exiſtūt.

Sexce differentia sunt motu determinato fluentes fani, ad partem agram ingruentes.

Sepe inter differentia tenuis sunt, licet crudi morbofi, & aquosi in hydropo purgandi, cum potentia passiva mobiles sint.

Octava differentia etiam potentia passiva mobiles sunt, ac tenues, etsi crudi, morboſique in magnis febribus lenientibus valde refrigerantibus educendi.

Nonne differentiae sunt ichores cito purgandi.

Decimae differentiae sunt craffi per se, tamen tenues, sicut deterforijs, ac incidentibus profundius, parum ac parum cibis deterforijs subducendi.

Undecimæ differentie sunt crassi glutinosi, ac immobiles, nihilominus, fixi, & viz à medicamento cassis ratione, illico purgandi, ob morbi magnitudinem indicantem, & properantem eorum succorum expulsionem.

Doodecimae differentiae sunt purulenti succi cito purgandi :

Tertia decima differentia vero, cacoehymia compositio est, ex crudis, crassis, ac infixis, simulque ex tenuibus motu determinato peccantibus, in febrium mali moris augmento, ubi purgare non licet. Sed revellere decet.

CAPVT

31. Meth. c. 6.
6. epid. com. 1.
com. 11.
31. Meth. c. 6.
De sympt. c. 1.
4. de t. de com.
m. 1. c. 7.
31. Meth. c. 6.
6. epid. com. 1.
com. 11.
1. De finit. c. 9.
de 4. de fac. c. 1.
31. Meth. c. 6.
Paulus l. 2. c. 37.
Ex Hipp. 4. de
vici. in man.
vici.
Ibidem in lo.
c.

Homines ad purgationem mandant, seu non agnoscuntur de eum differentia continet.

Agante medicamento impedita, atque simul ijs humoribus crudis petagietis, quoque ab attrahente medicamento, ac non educis ab ex pultrice, cum prius nec etiam a coctrice cocti, nec a segregatrice a bonis se iuncti sunt; non amplius coquuntur, ve luti antea coquebantur. Eaque sanè ob causam, humores illi ex necessitate non nisi recrudescunt, atque hinc non maturantur: immo Natura coquens eorum coctionem ingredients, solaque huic officio destinata, siue vila corporis dimoitione semari debet, ne a coctione retrahatur, & nos docet Galenus. *Hac est ergo causi, cur purgationes coctionibus aduersentur.* Præterea etiam hæ purgationes crispibus coctionibus, quæ crispes certe solum coctionibus peractis, fieri valent optime. Aduerte autem Hippocratem dixisse ambigui. *At si videatur, clysterem exhibebis.* Cum in summis cruditatibus, interdum enematæ, actia etiam coctionem peruertere possint: Cæterum concoctio, aliquo modo, etiam modis imperfectæ dudum alatis molira: si aliua magna fieret purgatio, tunc vtiq; sebris in longius tempus protraheretur: cum ibi sebris rursus angescat, eiusq; magnitudo vehementer euadat: Hinc etiam hi succi concocti, iterum recrudescunt, si e xistente augmento vniuersali, ob catharticum exhibitum ideo sebris denuo recrudesceret, & principium versus vniuersale retrocederet: Verum afflicti recrudescunt, cum mala rursus fiant Hipp. & Galeni mente. *Hinc febrix citra fidoreum, tum iudicationis &c.* Quandoquidem simul tam sebris, vt effectus, quam eius causa recrudescunt, hæc de re, sicuti concoctiones celestitate iudij portendunt, vt Hippoc. sempiternis monumentis medicinalibus prodidit, nec non securitate salubrem ostendunt: ita in oppositu febrix causa recrudescit, vt eruda, & inconcocta, atq; in malos abfcessus conuersa, aut acrisis hoc est, aut, vt Gal. in com. omnino iudicium nullum finitum, aut prauum, aut dolorem, aut duritiam emul, aut reciduas, aut mortem venturam denuntiat: cuius recrudescentie alia Hippocratica legitur doctrina, dum statuit purgationes spontaneas tam permutaciones, quam crises peruertere, hinc in modum. *Nulli etenim horum nisi supererunt, medicamentum exhibebis.* Nam periculo agri exponens, nihilq; iuuans, spontaneaq; tum permutaciones, tum iudicationes adimas. Ratione verò, cur nulla excretio: existente materia cruda iuuat, immo nocet, ex ijs Galeni verbis, colligito. *Qui procedunt morbi a concoctionis difficultate, & copia crudorum humorum, nullum ab excretionibus consequuntur conuincuntur.* Dixit enim multum violentas excretionem opprimere vires: *At quantales non sunt nihil iuuare.* Quæ cum etiam duplices sint, nihil proficiunt, quæ concoctionem non habent adiutam, quia scilicet bitum multi relinquuntur, nihilq; commodabit absq; coctione quicquam. Sed mox recrudescit humoris, perturbata etiam etudorum humorum alteratione a medicamentis iam partim molita, a medicamento solutio peragitante. Quam certe obrem, ex ea quidem agitatione crudi, ac mtebosi succi, ex latiss, & vacui corporis partibus in angustiores, petitioreq; partes se rapunt. Hinc obstructions, simulq; cruditates geminantur, quæ geminatio tum quidem fit ex vna vena venæ portæ dum velius in eisdem venæ ramulos angustiores, ea cruditas agitata, colliguataq; ingreditur: Quæ vel ad extremas venæ cauas, in carne residentes venas accedit: Aut vtroq; modo efficitur: Et propter obstruētis hoc modo vijs, alijs humoribus quidem tenuioribus, q; facillime per intestina egredierentur, impedimento sunt, vt asseruat Galenus, hinc putredo augetur, vna cum eius calore: Adde quod cruditates ipsæ, si a purgante medicamento agitentur, ne diu genus venosum: Verum etiam in totum corporis habitum, & carnem impelluntur. Quocirca, massa sanguinea vtiq; sana, & merata, ijs cruditatibus coinquinaretur, Vnde ex quo nō nisi prauum omnibus partibus merendis corporis nostri alimenentum inferret. Ac etiam simul calor influens spiritus sanguinis coinquinati, qui tum nutrimentum, tum viuificationi calidi cordi in isti vniuersalis, membræ illis, & complexionalis, partiumq; omnium conducit, vt lib. 1. de cer. medici nā dictum est, necesse est, quod valde imbecillis reddatur; consequenterq; calor cordis innatus imbecillis admodum factus, vt primus motor, seu primum agens corpore salubre, & insalubre omnium nostrum actionum, hinc omnis nostra actio tunc ex necessitate læditur. Spiritus enim a medicamento purgante, qualis flamma ignis a vento peragitur; medicamentiq; vi sanguis in bilis transire, ait Gal. ac etiam sanguis, & caro colliguntur, atq; ignescunt. Quo etiam fit, quod si ad ventrem, & ad intestina, vitrea, aut acida pituita petagietis descendit, tormina quidem, torsiones, ac torsiones efflere possit. Ex ea veto peragitatione spiritus caloris tum influentis, tum primogeniti cordis, animi vtiq; deliquium, & vertigines, & inquietationes, pulsusq; deperuationes, & syncopes fieri possunt, atque denique mors: Quæ etiam sine fure contingere possunt. Vt nobis quoque notum est hæc Historia, ab Hippocrate narrata, ait enim *Julius sana, & obesa ex medicamento, conceptus gratia deglutito igneo, calido, siccio, acri, & mordaci, cum ibi, nec etiam cruda essent, neque humores obnoxii, immo sanguis meruus, & sanus: hæc enim de causa sanis nocent medicamenta, vt Oribasius, & Gal. de ijs, quos purgare oportet fol. 88. B. ideo ait Hip. Vt utriusq; doloris intestinum torminibus consullabatur, ac intumens spirandi difficultas inflabat, & animi consuetudo. Cum dolore sanguinem ab acrimonia, & a calore medicamenti, aperta vena, vomitione recessit, & quiescere curiora est: agitato spiritu calidi cordi implantati, seu prius motori corporis salubris, & insalubris nostræ vires, nostrarūq; functionū, vi expirasse videretur; ac neque vomitu ex aqua frigida, dolor urgens, aut spiratio remittebat auxilio refrigerationis, hinc frigida verò aquæ amphora triginta corpori affusa sunt, quod sanè vnicuique opem ferre videbatur. Ac pulchra bilis*

Tortoris Scenarius.

C

copiosa

Nota de chyl. motu.

Obpocina re. 110.

Tentis decima rano: meobit dū recrudescit, & quando ex Hipp. & Gal. ea medicamentis indicio dato.

Quarta decima rano.

Quinta decima rano.

Sexta decima rano.

Septima decima rano.

Octava decima rano.

Decima rano.

Decima rano.

Decima rano.

Decima rano.

Decima rano.

Decima rano.

Decima rano.

Decima rano.

Decima rano.

Decima rano.

A die, qui morbi sanè magni, vt ait, *solui non possunt, si quis prius medicari aggressus fuerit*. In principio tamē si vehementer magni non fuerint morbi, medicamentum est opus, non quidem ad collectum succum fluxum educendum, verum tantum ad euacuandum, simulque reuellendum adhuc fluentem, atque fluxurum, vt in differentia quinta videbo. Quandoquidem si Hippocratis, & Galeni uero, hac lenientia à nobis exhibita nunc, nota fuissent, procul omni dubio lenientia isthæc à Autoribus etiam in morbotum inflammationum principijs præbuisset, ad fluxiones reuellendas, seu detinendas; vt omnes Medici nostro tempore hac lenientia tuto præbent.

In textu ubi reuellentes magni, sed solam magis ad deum uolunt pagam.

CAP V T IIII.

Tertia humorum differentia manifesta fit, quæ vt partim concocta medio quodam modo subpurganda est.



Coniam inter duo contra extrema per horum participationem, seu negationem, incertum inuenitur; quod illico post eorum extremorum explicationem, declarandum venit: Ea propter, his duabus extremis cacochymix patefactis differentijs, nunc mediam examinare differentiam æquum erit. Qui succi, vt educationi proportionem respondeant, sicuti subiecti sunt, etiam subpurgandi veniunt. Nam ex distinctione exacte succorum coctionis, aut summæ crudæ, vt ante iam tenuit Hippocratica doctrina,

Conuenit.

Cap. ratione istius crudi non detinens reuellenda non fuit.

statuta, omnino iam patenter notum esse reor; quod sicuti non est purgandum in summæ crudis, vt proflus immobilibus, nihil seuuntisquæ à succis alimentalibus, impedita natura prius coctioni destinata: Vnde ad segregationem eorum accedere non potest, neque postea, vt debeat medicamento imitari, eos expellere valet, quin prius eos coquerit: Sic in oppositum purgare tenemur, quoties hi succi summæ crudi, seu inconcocti non fuerint, quinimmo subcocti, vel mediocriter cocti, aut aliquantulum cocti: Quandoquidem purgatio succorum eorum coctioni adæquari debet; supposito virium robore valido permittere: Verum hoc succos, alijs dixit subpurgare conuenit, cum ibi appareant vrinæ coctionis signa, alijs vero dixit mediocriter purgandum medicamentum; si morbus magnus, peracutus omnino sanguine rednundante non fuerit, alijs vtrò in locis habet, aliquantulum purgato, vt infra videbis. Quasi distinctionem ita posuit. Quibus principio vrina, & nebulae, & crasse albas habentes nebulas, non autem nigras, nec subflauas, vt in commento ait Galenus. Quæ concoctionis nota existunt: hos annuntibus ceteris permittentibus subpurgare conuenit: ergo subcocti succi morbiuici educendi sunt sub purgatione; In oppositum verò ait de his, vt dicit Galenus in quibus summa inest cruditas pergero ita. Quod si vrina inter initia tenuis fuerint, tales non purgabis, cum ibi summæ creditatis notæ sint; ergo sequitur illustratum: ex quo patet perperam quosdam parasse duxerat inter initia in morbis acutis, & magnis non nisi turgentibus humoribus purgare posse; cum inter initia quoque humores actu stabiles, verum potentia mobiles, ac fluxiles, à succis sanis segregati, vt quadantenus cocti, nihilque turgentibus inuacuantur purgationi paratissimi, sicuti etiam de morborum inflammationibus magnis partim cacochymus exarauit; prius vena secta; ac exinde soluente medicamento dato ad succos fluentes, & fluxuros reuellendos, simulque educendos, circa initia, cum ij humores nullatenus turgentibus sint, Quod eò magis alijs Hippocraticis autoritatibus adhuc clariùs dilucidare mihi facile erit: Quandoquidem interdum ex vrina, notæ coctionis ab aliquo impedimento per accidens, vt loco proprio videbo, non apparent: Ideo ait Hippocrates. Hos si ab initio medicamentis purgare uolueris, id ante quintam diem faciendum, si venter murmurauerit, alioqui à medicamento abstinendi: Quod si murmurauerit, alique agglutiones biliosa fuerint, scilicet exhibito, moderate purgandum. Murmur enim ventris, vna cum inclinatione succorum, ad aluum, vel ad ventriculum, eui ad terminum, aut viam aluique purgationis, ab Hippocrate, vt nota alicuius coctionis materie educenda, nobis assignatur sine humorum turgentia; quia tunc quadantenus materia ea habetur tenuis, fluxilique vt cocta à Natura. Coctio enim fructibus etiam, maturandis communis in humido consistit, ac molli; sicuti cruditas in siccis, ac duro: hinc maturatio infusitate; cruditas verò in stipitate se habet: Maturatio insuper huic fluxilitati iuncta procul omni dubio, ubi inutilia ab vtilibus segregata sint, reperitur cum inclinatione ad exitum alui, quæ inclinatio à murmure dignoscitur: Quocirca pluribus rationibus (quas infra ponam) tunc nobis purgandum est: Alexander itaque, decreto Hippocratis adscribens, ait, cum per initia esset materia subiecta, vt cruda immobilis, nunc aliquo modo agitari incipiat, atque alias in alium locum descendere, interim ad os ventriculi, & intestina, interim etiam ad artienas, aut cetera, Peritum Medicum igitur animaduertente hunc humorum,

In morbis magnis, cum non simpliciter quæ concocti sunt cacochymus, sed inchoata coctione in turgentibus principijs subpurgandis.

De viciis, in morbis, & 44. Viciis morbi ab Hippocrate, de ipso subpurgare loquens.

Summa ita, hoc autem, ubi notum aliusque.

Signa cacochymix sub coctæ ex vrina.

Vic vno humoris in alio crudi sunt non sunt agnandi.

Acqui decipit facit cum purgatione.

Inter initia de humoribus potius in mobilibus pat. gignit.

Secundus locus tertia.

Tempus Hippocratis.

Anæ quinquem diem educendi hi sunt.

Secundum signa subcocti etiam ca coctionis subpurgandæ ex vrina notantur.

Alexander.

Tomus Secundus.

C 3 notum,

4. De viciis, in morbis, & 44.

Gal. 6. epidem. com. 1. com. 11. de viciis, in morbis, & 44. de viciis, in morbis, & 44. de viciis, in morbis, & 44.

Et 4. de viciis, in morbis, & 44. de viciis, in morbis, & 44. de viciis, in morbis, & 44. de viciis, in morbis, & 44.

4. De viciis, in morbis, & 44.

4. De viciis, in morbis, & 44.

Hipp. 4. de morbis, & 44. de viciis, in morbis, & 44. de viciis, in morbis, & 44. de viciis, in morbis, & 44.

Lib. 1. c. de morbis, & 44.

Veneris purgationem hypochondriam, chylis per venas hinc succorum deinde ceterorum de pennis, sed tunc mar magis coctum debeat.

Quamvis Hipp.

Idem.

Quamvis Hipp.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

morum, & obferuare diligenter oportet, & dare aliquod, quod eos subducat, antequam oberrantes noxam intulerint, in partem aliquam nobiliorum decumbentes. Dum itaque coctionis nota vel per venam, aut per uentrem, quod semper luccorum ad aluum rudentium procliuatam ostendit nisi uerterat fuerit, si spiritus ad spiritum eductus, appellatur, quoniam scilicet neque multas exiit, & cum aliqua mediocri humiditate deorsum mouetur, vel sine flatulentia, & fluctuatione cum sonitu Cracel Clydone diffusi, quia ibi purgandum minime est. Nisi admodum leuiter, cum ibi flatu valde leuem quoque vel debilem concoctionem in faciam fuisse perpetuo potendat. Verum enimvero. Diuini ueneris flatu, non primo nec eleuando die, eos humores educendos esse, cum tunc cruditas sit eorum succorum: Verum tantum, si prius aliqua coctione inchoata; ante quintum diem, ut ab initio sine purgati, dum vires validæ adfuerint, neque prius quam symptomata morbi magnitudinem cacochymam consequentia, augete, ac vehementissima fiant, tunc enim quiescendum est. Vnde pro istius rei confirmatione ait. *At si liquidum aluum habenti casus superuenierit, si tibi purgatio idonea videatur, eam non tribus primis diebus adhibebis sed a quarto.* Viterius conlcribitur. *Quar o die medicamentum purgas propinato, tribusque primis diebus purgati per infusum subliuato, atque si sic non lauerit aliquantulum purgato.* Pro cuius confirmatione Celsus, inquit, *seruanda verò illa sunt, ne ante diem tertium ducatur, ne vlla cruditate subsistat, ne in corpore infirmo &c.* Cæterum atque enim video obijciendum, cum in principio morbi nullum sanæ signum demonstratiuū coctionis sit, ergo potius sub ratione turgentie humorum, tales purgationes fieri debent, quæ secus. Nam in morbus acutus raro, & per uia medicamentum purgas utendum est. Nisi sua iustitate naturam ad excretionem simulat, cuiusmodi per paucos esse &c. Verum hic Gal. per humores instabiles, arguens quidem intelligit, quod confirmat Alexandrum, voluisse patet, hic verbum. *Quando igitur humores compendit subducendi sunt? Nimirum cum diffusi iam eos, & turgentem tandem coacti, & illico ea sequenti posuit ea item antea allata, ut tunc cum per uia effectus in mobilis, nunc aliquo modo agitari incipiat, atque alias in alium locum &c.* Pro solutione, primo aduertit: *Morbi principium cum acuti, exactè simpliciter vique ad quartum decimum diem perdurantis: tum etiam acuti simpliciter, non exactè vique ad vigesimum extendentis, quod principium non vique primam mutationem intelligit, nec latitudine vacante, verum partem eam totius morbi vniuersalis primam, quouque augmen tum incipere perdurantem, nempe, vique ad integrum tertium diem, cum hæc tria morborum auctorum principia sint.* In quo quidem principio nullum coctionis signum apparet, nisi in eius fine. Augmentum verò tertio morbi acuti immo etiam, cum latitudine, quæ accessione longitudine, & elapso toto die secundum incipit, aliquid a vehementia incipiente symptomatum; cum tunc incipiant, maiora exillire. Vnde cum antepositione maiore perdurante, maioreque vehementia apprehendatur, perpetuo tamen cum aliquibus coctionis signis conspiciatur, ait enim Galenus. *In tertium usque diem morbi principium extenditur & alibi, quod ad tertium extenditur diem inquit quæ passio verò quiescit, aut iam præsent, atque perfectum id, quod tanquam totus pars morbi principium accipitur cognoscere queat, aut iam finitum præcognoscere, mihi iam videtur demonstrare. Nam iam perfecti principii manifestum, & hominum signum est, coctio manifesta, & alio in loco habet. Nam in vniuersum oportet cognoscere, quod ubi manifestum apparet indicium coctionis, totum illud tempus inter medium est principium morbi. De croneis verò ait morbus neque intra septimum, sed neque etiam decimum quartum diem manifestum coctionis signum, si morbus natura longus extiterit: quemadmodum exempla gratia febris anaphymica. Declarat autem quid intelligat per manifestum coctionis signum, ut per id facit ipius p. rectu principii terminum postertum aut venturum præcognoscimus, aut præsentem dignoscimus, hinc odo quæ signum habere possit manifestum coctionis signum; sic autem appellat ea, quæ inter debiles sit, & perfecti coctionis inditum: veluti medicæ coctionis finis nota, inter vtramque & extremam coctionem notas. Ea propter, primo de perfecti, seu c. impleta coctionis inditum demonstrat verba fecit, *Perfecti igitur coctio est quæ quando in vrinis subsiderit obliqua, & leue, & aquale, & continuæ.* Postea debilis coctionis ex vrina notas in vrinis subsiderit. *Debilis vero coctio est, quando ex aqua vrina mediciter sub pallida facta fuerit, & quidem turbida si appaerit, & talis per manifestum, hæc quoque, & debilis coctionis est signum, & rursus etiam, ac tenuis ex eodem genere est. E. ijs autem inditum extremæ media inditum subsiderit. Sed nihil bonum iam principium esse finitum ostendit. Hac enim manifestum inditum semper experiri non solum nebulam albam, aut suspensionem aqualem continuam, atque albam: Et quidem rubens nebula, & subsidentia talis, & sine subsidentia bene colorata vrina, & crassiuscula medicoris, principium finis ostendit. Ac vero quæ cum albine præsentibus deficiat ad manifestum illud coctionis inditum, & a morbi motu, & a natura, & a melle tempore, ac regione, & a tate, & temperatura ipsius laborantis inuenietur &c. His itaque hunc in modum statuit; dico, in toto principii ipatio fuisse cruditatem, sed in quarto die, vbi iam incipit incrementum apprehenditur, ibi coctionem manifestam esse, quia ipsa coctio semper inter principii finem, ac incrementum & vordium necessarii habetur: Quæritur ubi ait Hippocraticis. *Si quid morbum circa initia moue; videntibus autem quæscere multo præstat, circa eum initia, & finem morborum remissiora sunt omnia, in vigore verò vehementiora, ibi quidem per uia etiam incrementum inuicem comprehendit, vbi symptomata morbi magnitudinem cacochymam consequent-***

A Hipp. aph. 11.
& Gal. in m.
Gal. in m.

1. De sym-
ptom. ca.
Hidem.
2. De v. m.
m. 5. 5. 4.
3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

4. De v. m.
m. 5. 5. 4.
Eodem lib. 1.
p. 60. & 61.

Lib. 1. & 2.

B

Hipp. aph. 11.
Ex Hipp. aph.
11. Gal. in m.
aph. 11.

Lib. 1. & 2. aph. 11.
Eodem lib. 1.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

Lib. 1. & 2. aph. 11.
Eodem lib. 1.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

3. Aph. 11. & 12.
& lib. de hum.
p. 60. & 61.

2 Apr 90

4. De vijf rsl. in
moet. 32.
In Hipp. lib. de
frustra, com. 2.
com. 2. 2. 2. 2.
Videcom. 2. 2.
Hipp. 4. de vier.
22. 2. 2. 2. 2.
2. 2. 2. 2. 2. 2.
2. 2. 2. 2. 2. 2.

T41.

Cap. 8. ex Hipp.
lib. de ingenio
nro. 154.

Com. 1204.2 n.

4. A p.b. 10.

 H_2O

3. Epid. c. 1.4.15.
 4. Epid. c. 1.4.16.
 5. Epid. c. 1.4.18.
 6. Epid. c. 1.4.19.
 7. Epid. c. 1.4.20.
 8. Epid. c. 1.4.21.
 9. Epid. c. 1.4.22.
 10. Epid. c. 1.4.23.
 11. Epid. c. 1.4.24.
 12. Epid. c. 1.4.25.
 13. Epid. c. 1.4.26.
 14. Epid. c. 1.4.27.
 15. Epid. c. 1.4.28.
 16. Epid. c. 1.4.29.
 17. Epid. c. 1.4.30.
 18. Epid. c. 1.4.31.
 19. Epid. c. 1.4.32.
 20. Epid. c. 1.4.33.
 21. Epid. c. 1.4.34.
 22. Epid. c. 1.4.35.
 23. Epid. c. 1.4.36.
 24. Epid. c. 1.4.37.
 25. Epid. c. 1.4.38.
 26. Epid. c. 1.4.39.
 27. Epid. c. 1.4.40.
 28. Epid. c. 1.4.41.
 29. Epid. c. 1.4.42.
 30. Epid. c. 1.4.43.
 31. Epid. c. 1.4.44.
 32. Epid. c. 1.4.45.
 33. Epid. c. 1.4.46.
 34. Epid. c. 1.4.47.
 35. Epid. c. 1.4.48.
 36. Epid. c. 1.4.49.
 37. Epid. c. 1.4.50.
 38. Epid. c. 1.4.51.
 39. Epid. c. 1.4.52.
 40. Epid. c. 1.4.53.
 41. Epid. c. 1.4.54.
 42. Epid. c. 1.4.55.
 43. Epid. c. 1.4.56.
 44. Epid. c. 1.4.57.
 45. Epid. c. 1.4.58.
 46. Epid. c. 1.4.59.
 47. Epid. c. 1.4.60.
 48. Epid. c. 1.4.61.
 49. Epid. c. 1.4.62.
 50. Epid. c. 1.4.63.
 51. Epid. c. 1.4.64.
 52. Epid. c. 1.4.65.
 53. Epid. c. 1.4.66.
 54. Epid. c. 1.4.67.
 55. Epid. c. 1.4.68.
 56. Epid. c. 1.4.69.
 57. Epid. c. 1.4.70.
 58. Epid. c. 1.4.71.
 59. Epid. c. 1.4.72.
 60. Epid. c. 1.4.73.
 61. Epid. c. 1.4.74.
 62. Epid. c. 1.4.75.
 63. Epid. c. 1.4.76.
 64. Epid. c. 1.4.77.
 65. Epid. c. 1.4.78.
 66. Epid. c. 1.4.79.
 67. Epid. c. 1.4.80.
 68. Epid. c. 1.4.81.
 69. Epid. c. 1.4.82.
 70. Epid. c. 1.4.83.
 71. Epid. c. 1.4.84.
 72. Epid. c. 1.4.85.
 73. Epid. c. 1.4.86.
 74. Epid. c. 1.4.87.
 75. Epid. c. 1.4.88.
 76. Epid. c. 1.4.89.
 77. Epid. c. 1.4.90.
 78. Epid. c. 1.4.91.
 79. Epid. c. 1.4.92.
 80. Epid. c. 1.4.93.
 81. Epid. c. 1.4.94.
 82. Epid. c. 1.4.95.
 83. Epid. c. 1.4.96.
 84. Epid. c. 1.4.97.
 85. Epid. c. 1.4.98.
 86. Epid. c. 1.4.99.
 87. Epid. c. 1.4.100.
 88. Epid. c. 1.4.101.
 89. Epid. c. 1.4.102.
 90. Epid. c. 1.4.103.
 91. Epid. c. 1.4.104.
 92. Epid. c. 1.4.105.
 93. Epid. c. 1.4.106.
 94. Epid. c. 1.4.107.
 95. Epid. c. 1.4.108.
 96. Epid. c. 1.4.109.
 97. Epid. c. 1.4.110.
 98. Epid. c. 1.4.111.
 99. Epid. c. 1.4.112.
 100. Epid. c. 1.4.113.
 101. Epid. c. 1.4.114.
 102. Epid. c. 1.4.115.
 103. Epid. c. 1.4.116.
 104. Epid. c. 1.4.117.
 105. Epid. c. 1.4.118.
 106. Epid. c. 1.4.119.
 107. Epid. c. 1.4.120.
 108. Epid. c. 1.4.121.
 109. Epid. c. 1.4.122.
 110. Epid. c. 1.4.123.
 111. Epid. c. 1.4.124.
 112. Epid. c. 1.4.125.
 113. Epid. c. 1.4.126.
 114. Epid. c. 1.4.127.
 115. Epid. c. 1.4.128.
 116. Epid. c. 1.4.129.
 117. Epid. c. 1.4.130.
 118. Epid. c. 1.4.131.
 119. Epid. c. 1.4.132.
 120. Epid. c. 1.4.133.
 121. Epid. c. 1.4.134.
 122. Epid. c. 1.4.135.
 123. Epid. c. 1.4.136.
 124. Epid. c. 1.4.137.
 125. Epid. c. 1.4.138.
 126. Epid. c. 1.4.139.
 127. Epid. c. 1.4.140.
 128. Epid. c. 1.4.141.
 129. Epid. c. 1.4.142.
 130. Epid. c. 1.4.143.
 131. Epid. c. 1.4.144.
 132. Epid. c. 1.4.145.
 133. Epid. c. 1.4.146.
 134. Epid. c. 1.4.147.
 135. Epid. c. 1.4.148.
 136. Epid. c. 1.4.149.
 137. Epid. c. 1.4.150.
 138. Epid. c. 1.4.151.
 139. Epid. c. 1.4.152.
 140. Epid. c. 1.4.153.
 141. Epid. c. 1.4.154.
 142. Epid. c. 1.4.155.
 143. Epid. c. 1.4.156.
 144. Epid. c. 1.4.157.
 145. Epid. c. 1.4.158.
 146. Epid. c. 1.4.159.
 147. Epid. c. 1.4.160.
 148. Epid. c. 1.4.161.
 149. Epid. c. 1.4.162.
 150. Epid. c. 1.4.163.
 151. Epid. c. 1.4.164.
 152. Epid. c. 1.4.165.
 153. Epid. c. 1.4.166.
 154. Epid. c. 1.4.167.
 155. Epid. c. 1.4.168.
 156. Epid. c. 1.4.169.
 157. Epid. c. 1.4.170.
 158. Epid. c. 1.4.171.
 159. Epid. c. 1.4.172.
 160. Epid. c. 1.4.173.
 161. Epid. c. 1.4.174.
 162. Epid. c. 1.4.175.
 163. Epid. c. 1.4.176.
 164. Epid. c. 1.4.177.
 165. Epid. c. 1.4.178.
 166. Epid. c. 1.4.179.
 167. Epid. c. 1.4.180.
 168. Epid. c. 1.4.181.
 169. Epid. c. 1.4.182.
 170. Epid. c. 1.4.183.
 171. Epid. c. 1.4.184.
 172. Epid. c. 1.4.185.
 173. Epid. c. 1.4.186.
 174. Epid. c. 1.4.187.
 175. Epid. c. 1.4.188.
 176. Epid. c. 1.4.189.
 177. Epid. c. 1.4.190.
 178. Epid. c. 1.4.191.
 179. Epid. c. 1.4.192.
 180. Epid. c. 1.4.193.
 181. Epid. c. 1.4.194.
 182. Epid. c. 1.4.195.
 183. Epid. c. 1.4.196.
 184. Epid. c. 1.4.197.
 185. Epid. c. 1.4.198.
 186. Epid. c. 1.4.199.
 187. Epid. c. 1.4.200.
 188. Epid. c. 1.4.201.
 189. Epid. c. 1.4.202.
 190. Epid. c. 1.4.203.
 191. Epid. c. 1.4.204.
 192. Epid. c. 1.4.205.
 193. Epid. c. 1.4.206.
 194. Epid. c. 1.4.207.
 195. Epid. c. 1.4.208.
 196. Epid. c. 1.4.209.
 197. Epid. c. 1.

2005-06 17,
2,440:32, 24

I

3. *Epilobium* *complanatum*
3.11.
3. *Epilobium* *complanatum*
3.12.
3. *Epilobium* *complanatum*
3.13.

Fundamenta
Iuribus
di dabit.
Ad primam
omnem
omnem

Hipp. locus dilu-
citur.
Hipp. quid in-
terligat per mo-
dum.
Idem. Col. a. d.

1800 Gal. 1. 60
12116, cap 9. 30
com. 4. 1 ph. 1. 30
Actinota Aorj
10-1000. 1. 1. 60
23. 30 Gal. 1. 30
tribus de 1000

In veltrenen
stagnis acuta
non est progno-
stium validior
bus foliis in

principijs, ubi
stages sunt.
In gacis mor-
bis particulari-
bus pharmaci-
colones Hippo-

non prebent
de la miera de
si possit in pri
cipio trahit.

Macchia petraea
 212 Scrubland dis-
 symmetrized ve-
 hermentosa (est.)
 Macchia ex petra-

admodum in
horum efficiat
in Hippo. h
s.
Judicium agri
peraculis me

Neel parathin
vunatish. Hup
pos. Sifunna da
bat in prapiglo
tamen hanc
exhiberi non.

Ad secundum
respondetur,
Solutio est quod
i petra sunt mo-
bilitate pariter
sed non sunt vi-

venalibus, iura
iura ignis, ac
salutis vete-
ribus nō in per-
gandum.
Hic, quomodo

pergruendum est
se statim, quod
tenuis et ma-
gnus: in acuta
foculis simpliciter
et, de magnis

Ad tertiam
conclusionem que
Alexandri fuit.

frequentia quidem mitiora sunt, cum tunc incipiant; hinc tunc etiam securè, purgare valeamus, conditionibus pofitas acriterribus. Verùm pro fecundis dubij folutione, perpendo circa Hippocratis auctoritatem. In morbis acutis raro, & per initia medicamentò utendum, nifi materia turgat, eam intelligendam effe, de vehementer magnis acutis, nempe de peracuris, qui feptem diebus numero defunnt, vel fuerint per acuti inflammatorii morbi, quorum doctrinam flaturè intelligi, his verbis. *Poffimum verò, & veciores dolores, & hinc granitates, atque inflammatìones alit, & Superiores ftepto tranfverfus dolores, morborumque colleffiones, de ijs enim air illico falva non poffunt, fi quis prius medicari aggreffus fuerit: per medicari enim Hippocratis more, ut Galenus affevertat non ad cauſamque medicamentis exhibitionem refert, fed ad corum duntaxat, que tunc purganda habent. In peracuris autem morbis inflammatorijs potiffimum circa iuria purgandum non effe, nifi materia turgat, quia ait quicunque autem ea, que inflammantur, flatim morbo non inter initia medicamentò folvere conantur, ij non ſolum ab interſu, inflammataque parte nihil ad iuvant, cum non cedat, obſequiturque, que ad iure cruda effe affectu: Hoc enim quoque, que morbo reſiſtunt, & fanas ſunt, abſumunt, colliguntque &c. ſolvi crurumque, & hinc prius medicamentò purgante, & ſani morbi acuti particulares, poſtea feſta vena: Ibi autem duo conſtitute intendi, quorum primu de deſuper fialeus in opemto effe, quid ditoribus, qui acutis ſuavis acutis miffione deſtut.*

[illegible]

haberet vbi ait. *Medicari valde acutus*, idell peracutus, *fi male natus*, quod per raro fit. 1. aph. 22. Quocirca, cum in his petacutis morbis magnis magnitudo linguæ vigeat, vñe fectioe supplicandum est, cum quia etiam in peracutis magnis secunda die symptomata feua morbis magnitudinem consequantia, aut tertio die vchemētia sunt, vñ Phyllos cecidit, qui sexto die obijt, & Erasino quinto die, & Critoni mortuo secundo die, Vxorique Dremeadei sexto die mortuae; pizterea Philisiz quinto die mortuæ, Alterique angina laboranti similiter quinto die mortuo; Ac Adolefcenī septimo die mortuo, Alioque Mulieri ægra mortuæ se primo die, Ac aliz denique Mulieri similiter, quæ septima die perijt. Sicuti quoque Virgini Larisæ iudicatæ sexto die, conrigit; dolores, nempe accessiones diebus paribus deteriores, habenti. Nec non tandem illæ Mulieri morosæ quarto die indicatæ cecidit. In peracutis ēr vñ ueritabilis nempe in ardente febre, solutium medicamentum non præbet, Hippoc. verum tantum laxa sfinum coctum ad aluum miedissimè subducendam. Ad Galeni verò autoritatem in qua statuit, in morbis acutis per inicitia tantum solutia medicamenta danda, cum Hippocrate, vbi materia turgeat, Respondo ibi, vñ iam ostensum est, morbos petacutis in secundo, seu tertio die symptomata vchemētia habentes, intelligere; quibus nequaquam mrdicamenta solutia ignea, & validiora danda veniunt, nisi materia turgeat; tunc finè primo, aut secundo die illiæ, nulla expeclata coctioe, educenda, antequam inclinationem ad aliquam partem principalem habuerit definitam; cum ipsa materia tenuissima sit, Vnde non eget coctioe, vñ crasso, ac immobilis materia eget. Vbi verò vult Hippocrates quarto die, eodā iam quadrantes materia purgandum esse, de acutis simpliciter morbis. ac magnis intendit. in quibus quidem quinto. aut sexto die symptomata vchemētia

habentur, vt xori Philini die 20. mortuq; contigit, & Mulieri in mendacium foro decumbenti die quarto decimo mortuq;. Atque Herophoni die decimo feptimo iudicio. Ad Alexandri vet-
erò autoritate, dicendum eſt reor, materiam ſubſtantiam ab Alexandro ibi recentiam, tribus
mensis quidam conſtitutum fuiſſe; Nam prout per initia eſſe: immobilis vt eruda, nunc verò aliquo
modo agitari incipit, vt coctia meretrix, eam educendam eſſe ſtatuit, priuſquam ad aliquam par-
tem principalem fluere ea inſperit, & hac ratione, noſtro peſſenti inſtituto inſeruit, nempe an-
te quartum diem, eam materiam educendam. Secundo modo vt ea materia motu peccet, accipi-
poſeſt; quod adhuc etiam bifariam eſt ſtitutum, vel enim motu inde finito ad nullam partem
firmam, immo ad varias, ac plures partes, modo ad alias, modo ad alteras, cum ſuiter, eius exi-
tu ſolum quærendo, abſque quo alioſius principalis partis offenſionem efficere exoptet. Aut
motu terminato aliqua partem ledens nam principalem, quam non principalem, dummodo
morbum magnum efficiat, vel ſaltem efficere valeat; & iſti duo modi ad hoc noſtrum inſtituto
haud inſeruntur, verum ad quæſq; & quinque differentiæ ſuccorum ad expurgationem reſoluto-
rum inſtitutionem iſti duo modi quidem ſaciat. Quarto itaque die humores iſti ſemicurati educen-
di ſunt.

disunt.

Prima ratio qua
alibi horum
quod quoniam
dum ducendi
sunt.

In prima ratio
habetur per
alibi horum
quod quoniam
dum ducendi
sunt.

Secunda ratio.

Tertia ratio.

Quarta ratio.

Idem.

Medicamenta
habetur per
alibi horum
quod quoniam
dum ducendi
sunt.

Quinta ratio.
habetur per
alibi horum
quod quoniam
dum ducendi
sunt.

Quinta ratio.

Prima ratio qua
alibi horum
quod quoniam
dum ducendi
sunt.

disiuncti, alioquin symptoma magna iam facta, longè deteriora euaderent, si in incremento solu-
tionis igneo pharmaco purgare tentauerimus: ac etiam Naturam à dimicatione, quam cū mor-
bo magno, & cruditate habet, & à victoria tetraheremus: vt ex Hippocratis decretis antea sta-
tutus poterit. Vnde in morbis magnis, & simpliciter acutis ita agendum est. Sicuti in cronicis *is-
per maturatiorem expectare oportet*, de purgantibus validis à proprietate specifica succos malos
attrahentibus intelligendo. In peracutis autem, sicuti Hippocratis lae Afonium salū, & meli-
coctum committunt corporē, ad alium mite subducendum praebebat cum ei nostra lenientia
ignora fuissent, post eos Glycos inuenta: ita nunc syr. rosifol. & cassia securē exhibentur. Nam
et si ibi bilis purganda valde esset, tamen ibi, ob ingentem calorem igneum febrilem medica-
menta ignea solutina non danda: hinc literis prodit Gal. *sicuti interdum, & alius affectus obstat,*
qui talem educendationem resistit. Insuper cocta ea materia, fluxilisque reddita, priusquam ali-
quam principalem petat partem, vt Alexander ait, educenda est: Porro iam ex ea parte, quae pre-
parata est natura ociosa non manet eò, quod subordinatim prius concoctione conerunt, & inde
segregant malos succos iam coctos, à bonis fecerunt, ac libidine expultrice vi parata se habet
ad eos malos expellendos succos. Quocirca et si natura etiam nullam inclinationem ad aliuā
purgationem sine eo murmure ab Hippoc. proposito haberet; mediocriter purgare tenemur, vt
purgatio coctioni materię proportionem respiciat. Vt videri Galenus ait. *Circa initia ergo ve-
rò illorum morborum, in quibus speramus agrotum consiliorum tentandum est maiora afferre reme-
dia, de quibus Hippocrates dixit (si quid videtur mouendum, moue.)* Sunt autem, hac maxime quidem,
*vena sectio, nonnunquam verò, & purgatio: Quorum neutrum oportet in vigoriis adhibere: conco-
ctiones morborum tunc maxime sunt: Vt igitur hac citius eueniat, melius est in principijs euacua-
re; quo minorem iam scilicet materiam, facilius natura posse concoquere.* Vnde ex quo, vt à ponde-
re eo n-aerem copiosius iam cocti, vt copiosius calorem naturalem grauante, natura exoneretur, vt
postea fortior natura facti: coctionem ceterorum humorum notari dignum ingredi valeat. Pri-
mum autem aduertit quod concoctio duplex sit, nempe inchoatiua, atque vigoratiua: materia
verò iam cocta inchoatiua coctione, quatto die educenda est: Materia verò vigoratiua coctione
cocta, in fine morbi tantum, vigore iam transacto educitur: Ideo Gal. hic tantum coctionis, quę
in vigore fit, m. minuit, vt ibi cū videre. Præterea, cum hęc medicamenta solutina, coctione
inchoatiua molita, ante quintum diem, vt naturę exoneratiua quidem sunt in causa, vt natura
coctionem aliam vigoratiuam ingrediatur; factaque ipsa coctione, facilius iudicia fieri possunt,
ab ipsa natura; quia coctiones celeritatem iudicij, & securitatem salubrem protrahunt: in hęc
existente inchoatiua coctione talia medicamenta per initia, data ab Hippocrate ad indicationē
inuantia appellantur, & à Galid est ad crisin inuastoria dicuntur, ab aliquibus verò, vt ab Auicenna
talcs purgationes ex Antyllo, Galeno, & Orisilio minorationes appellari sunt; quę vtique pro
vt circa initia adhibitis sint, admodum equē tum concoctioni vigoratiuę, tum crilibus venturis
a ciliatur. Eanque sanè ob causam hęc purgationes indicationem *subeunt*, vt Hippocrates statuit.
Ceterum adde, quod Hippocratis ait, vt antea quoque cap. i. libri primi hęc verba alia occasio-
ne posita fuerit. *Nisi enim, quod morbum facit, dimoueris, augetur: Omnia medicamenta sunt, quę præ-
sentem flatum dimouent; valentiora autem omnia immutant, licet aut, si quidem velis medicamento
transfuisse.* Ergo priusquam angelcat morbus sua magnitudine cacochyma, eam cacochymiam
morbi magnitudinem facientem euacuate deimicimus, vt magnitudini istius incrementi præ-
ueniamus, magnitudinemque ipsam præsentem eripiamus, ac immittentem maiorem venturam
prohibeamus magnitudinem, vt semper verificetur ea Artis Medicę dictio ab Hippocrate posita
morborumque vehementiam obtundat. Tandem in principijs putgandum est, cum tunc ex Hip-
pocratis, & Galeni sententia, mutationes morborum, qui sunt magni, & simpliciter acuti, in melius
sunt, priusquam hi morbi augeantur, vt clarius dicam loco proprio: Verum enimvero, vt tutius
in quarto die purgationis, præparantia alterando exhibenda sunt, vt nos his verbis Hippoc. docet.
*At verò ante medicamentum purgantis portionem, si quis febre vexetur: mane quidem aquam nullam
agnoscam exhibito ad cito præparandos humores.* Nec hanc differentiam uocorum, quę reuera
ab alijs differt Hippocratis exemplis, illustrare difficile mihi erit, cum habeatur cum febris ter-
tiana deueniat, si quidem impurgatus esse tibi videatur, quarto die medicamentum purgans exhibito:
intermedijs autem deibus cibis alium subducuntibus, vt cū priusque cremor melle admixto, mellifica-
to, & alia similia, quorum alibi dixi, vt videbo. Pergendo autem ait. *Si autem quartana præbeuerit,*
si quidem impurgatus fuerit primū quidem caput purgandum, & tribus, aut quatuor interuallis,
diebus sub ipsam accessiōnem medicamentum purgans exhibendum rursus, aliquo interuallo interiecto,
aliud medicamentum deorsum purgans dandum. Morbus enim iste cronicus est: hinc nō quarto die
deorsum purgat, immo prius cruditates primę regionis crudatam vomitione educit, postea pa-
tatos quadantenus humores alterantibus datis, deorsum purgat. Alibi verò. *Diutius senex in-
febris putridis ex putra breuque putrescente ortis cum corpore tumidiore reddito, cum e carnes
intus erunt, nullo balneo, post breuē sectionem admodum iuuante aliuam purgationem in proponit
ad morbi magnitudinem cacochymiam præsentem eripendam, simulque pro febre quartana v
tuta inhienda: si itaque in his febribus, vbi totum corpus in tumorem quendam conuersum
reperitur,*

A

2. Aph. 2. & 3.

Com. 1. aph. 2.

4. De vict. lib. 1.

4. De euen. lib. 1.

B

Com. 1. aph. 2.

1. Epid. com. 2.

12. 45.

C

2. De vict. lib. 1.

2. De euen. lib. 1.

Lib. 1. f. 4. d. 11.

2. De euen. lib. 1.

2. De euen. lib. 1.

2. De euen. lib. 1.

2. De euen. lib. 1.

Lib. 1. de str. p. 4.

De str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

p. 4. de str. in hom.

CAPVT V.

Quarta cacochymia differentia perpenditur. Vbi humorum propriè turgentium natura examinatur. In quibusque corporibus hi succi statim valde purgandi, & in quibus tantum subpurgandi, & in quibus nullatenus educendi sint dilucidatur.

Coniect.



Rimo cacochymia nihil purganda, secundo ipsa omnino euacuanda, tertio vero ea medio quodam modo deicienda, iam explanata, Quarto ideo iure merito eos declarare succos teneo, qui propriè turgent, & qui illico frequentius valido solutio educendi sunt; prout vero, impedimenti ratione, solutio pharmaco vehementer irritandi non sunt. Quos humores Hippocratatem constituisse, pro comperto habetur, his verbis, *enocolla medicari, atque mouere, non cruda,*

neque in principis, modo non turgente plurima verò non turgent: quod etiam Hippoc. alijs verbis idem statueret voluit, *concocta medicamentis purgantibus agitata, non cruda, neque in principis nisi impetu suo ad excretionem ferantur, plerumque verò minime ad exitum festinant.* Alio verò in loco ait. *Medicari in valde acutis, si materia turget, eadem die: tardare enim in talibus malum est.* Natura autem horum humorum, vt integrè nobis nota fiat, tribus rationibus mihi perpendenda est; in vniuersali vt contradiſtincta ab aliorum hæuſque allatorum succorum natura: Vltierius natura specifica quo ad nomen insignita sit per analogiam animalium turgentium. Atque tandem natura specifica formalis, ac essentialis eorum. Quandoquidem ij ceterè humores a crudis immobilibus omnino, tum actu, tum loco, tum etiam potentia passiuæ contradiſtincti sunt; nam hi crudi, vt firmi, stabiles, nihilque fluxiles; penitusque immobiles, ab ijs motu actuali, ac potentiali quoque peccantibus contradiſtinguuntur. A secundis etiam, qui actu stabiles sunt diffidunt quia isti actu moventur: hi à natura, & ab arte moventur præterea alterantibus cocti, isti verò crudi omnino quo ad nihil à natura, & ab alterantibus cocti sunt: sic etiam à tertijs dudum statutus contradiſtincti sunt. Sanguis verò probus medius vtique est inter hos omnes quatuor humores mobilificos: Quo ad nomen vero turgentis humoris, ait Galenus. *Diffusum est, & me prius, quod verbum (turgere) Hippocrates transiit ab animalibus, qua ad coctum properant, cum naturali quadam conuersione moueantur ad seminis excretionem, ostensum est enim in libris de semine, quod semina etiam in coctum semen exerunt.* Quando igitur vult in toto corpore similis huius fuerit natura im petus ad excretionem superfluitatum; vel si non toto corpore, saltem in partibus principalibus: tale, quod consuevit Hipp. per verbum (turgere) significare, & statim per medicamentum euacuationem faciendam indicat prius quam vel virtus vitata fuerit, vel febriſ caliditas accessit, vel ad aliquod modum principale decubuerint i, qui per corpus vagantur humores. Alio verò in loco inquit. *Quemadmodum enim animalia, semel libidine incensa abstinere non possunt titillata quodammodo, & impulsæ, & stimula ab eiusmodi affectibus impotentia, sic sapienter humores dum motu feruntur conestatione, & depare vna in alteram fluunt, morbi statim initio hominem angunt concitantes, & titillantes, nec quiescere fluunt.* Tales ergo vacuare oportet, hoc est, qui moventur, & quoque uisum ferantur per corpus, & fluunt. Et alibi ait. *Qua ad coctum rationem translatam verbum hoc autem est ad eas, qua properant, & celeriter moventur egritudines, & præcipue, cum laborantis sensus ab inordinata humorum, & spirituum agitatione quodammodo irritatur.* Mem in his tantum quilibet rationabiliter pharmaco in principis, morborum valde acutorum, nempe petacutorum; vt ait Hippocrates tueretur, cum adiuuantem habeat ad facilius accipendum superabundantium humorum motum. Quod quidè per raro humores alias in aliam, atque aliam partem trans ferri, & fluere, sapius nanq; fit, vt quiescant; Cum autem horum humorum essentiam nobis tradere voluerit; Hæc Galenus. *Nisi sua sponte, concitata id expectat, hoc est, nisi motus ad excretionem nos adueniat, qui non dum firmam aliquam inclinationem, ac stationem, ad vnam partem habeat, & lib. Galeno attributo, quem Otibafij effudit; dicunt; de ijs quoque purgare oportet 88. Habetur conestari oportet, & turgere humores dicuntur, cum motu vehementer agitantur: ac ab vno loco ad aliud confluentes inter principia morbi hominem vexant, doloreſque, ac titillationes afferendo ægrum quiescere non permittunt. Hos ergo humores vacuare conuenit in motu, agitatione, & fluxu positis.* Ex quibus vtique omnibus huc vtique statuit, colligere, Humores turgentis esse tenues quidem conestatos, petagiatos, atque simul peruagantes, ac fientes succos vel per totum vniuersum corpus, vel per partes principales omnes simul, quales sunt cot, cerebrum, ac hepatis, cum suis partibus, ijs principalibus inferiètibz, lubordinatis, nec non conterminiis, vel per aliquam aliam partem; quatenus isti humores turgentis adeo motu indeterminato peccant, vt nondum sitam aliquam inclinationem definitam, ac stationem ad vnam partem tantum, vel ad plures partes obtineant, quinimmo interam ad alias, modo ve-

rò ad

Hipp. Hipp. sen
torum confu
manti Gal. 4 de
Succo. c. 7. si
de totius morbi
temp. c. 1. & 7.
de crudi. c. 1. &
de coctis. c. 1. &
de com. m. c. 1.
c. 1. de vit. in
d. mor. c. 1. 88.
de ven. 18. & 1.
aph. 2. c. 14. &
c. 1. aph. 2.
Turgentium hu
morum natura
per se.
Turgentis hi hu
mores prius
differentia (co
chymia) opponi
tur.
Ac etiam Secunda
diff. cacochymia
diff. a max. con
stata. c. 1. 88.
Sic etiam à ter
tia differentia
dico. hinc ob
uoluntatem.
Turgentis hu
moris natura
diff. a qua deſum
pta.

H. morbus vni
uersum effen
dit est vbi
que vno inde
remouendo per
causam.
Humoris turgi
entis natura
c. 1. 88.
Humores turgi
entis quid sunt
per Hipp. &
Galen. huius
naturæ c. 1. 88.

B
1. Aph. 2. c. 14.
de humor. p. 60.
c. 1. aph. 2.

C
Com. 4. aph. 2.
idem vide in c.
epid. mor. 2. aph.
9. & in c. 1. pro
phet. com. 2. com.
17. 18. Hippoc.
12. alibi in 18.
Vide Gal. idem
quoque dicere
com. 2. aph. 2.
& 24. & c. aph. 2.
1. de m. c. 1. 88.
c. 1. aph. 2.
Com. 2. aph. 2.

1. de m. c. 1. 88.
idem vide in c.
epid. com. 2. aph.
9. & c. 11. & quis
purgat oportet
18. H.
c. 1. aph. 2.

D
Tex. 8. c. 1. 88.
aph. 2.
1. de com. med.
1. loc. c. 1.

Obiectio ad
opponitur.

Aliqui ostendunt
potius hunc
modum de
morbis per
se esse videntes
per se quod
fallit est.

Cuiusdam edo-
cti fieri nat-
uram hunc
qui alius in
ipso morbo a-
catu magno ha-
bent.

Turbas hunc
in morbo, in
latente, & hunc
facile remanere
facile videtur
edoceri.

Primo vel secun-
do die.

Hipp. Gal. Ocri-
on.

Arteria.

Illum purgandi
veniam ratione
autem quod in
hunc ad eos
cuiusdam de
tunc per se
magis hunc
magis hunc
magis hunc.

Arteria hunc
in ea Galat.

Arteria.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

Turbas hunc
in ea Galat.

minuat Galenum statueret, ut seipsum declaravit patentes, cum exatit, qui non dum firmam aliquam inclinationem, ac stationem ad unam partem habet, & alibi ait, qui per corpus vagatur humores, ac etiam inquit, servantur per corpus, & sunt. Neque eos humores in liene turgentibus, ut in termino a quo eleuantur in humores, itabiles esse asserere potens, cum in liene ipso vagantur, ac dimoveantur, eorum exitum flagitando. Tales enim succi turgent. Nam quum humores redundantes moventur, & quousque per corpus deferuntur nondum corporis parte aliqua firmati, tunc ad eorum expulsiorem naturam incitantur, ut Gal. statuit ac isti turgent: sic in aliqua parte principali dicendi est: Quam certe obtem, perperam dicitur aliqui in pleuritide descendere Hippocratem purgare, cum ibi materia turgat: Quandoquidem isti valde decipiuntur, cum ibi neutiquam materia turgat, eo, quia tunc humores illi eam plenitudinem facientes, non solum firmam inclinationem, firmamque motum, ac determinationem possident, sed etiam firmam stationem. Vnde nugentem est, hoc asserere, ut aduertit quoque Trineuclius, tunc enim, ut humores fluentes, ac fluxuosos ad eum locum affectum (vena prius tamen scia, ut se cuius id fiat, ut Galenus admonet) euacuamus, ac reuelliunt omnes succi fluentes, & dentes aliquam partem, gigantemque morbi magnitudinem cacoehymam lethalem, vel praesentem, vel imminenter, tam morbifici, quam sani, educti sunt, ut ipsi duobus capitulis sequentibus videbo, De auxiliio. Verum enim vero eo, quod humores illi morbi si non initio hominum arguit constantes, & irritabiles, nec quiescere solent. Tale ergo vacuare oportet, statimque per medicamentum euacuationem faciendam indicat Hippoc. humorem, qui sunt in morbo, & laione, & fluxu, & ad eum exitum festinantes eodem die ipso Oribasius lib. Galeno ascripto de iis, quos purgare oportet 88. H. ait, in acutis vero morbis si statim inter initia primo die, vel non ulterius secundo purgatione uti velimus turgente materia. Ergo primo die eos vacuare cogimur, aut secundo die, si primo non vocati simus, & ait Gal. Vtrum in acutis quum initio statim, vel eire apertum dicimur, non ultra secundum purgatione sit videntur. Vnde illico sunt purgandi, cum ex parte auxilij, cum ex parte malorum curandorum: Ex parte namque auxilij hercle eo, quia tunc humorum motum adiuvantem habemus, vel medica mento longe facilius extrahantur succi illi, cum ad exitum parati sunt, quin immo ad suam euacuationem properantes intropiciunt, tum etiam quoniam eodem tempore Natura ipsa valde ad irritata ad iussum humorum excretionem agendum vique paratissima tunc habetur: Ex parte autem magnitudinis morbi cacoehyma lethalis incipientis, seu imminenter mortifici ventura, iactura heret, illico turgente materia non educta, cum ea magnitudo incurabilis fiet, quoties, vel corporis virtus collabatur, iunimaturque, vel febris angustat calor, vel vagi, & errantes per corpus humores in partem quampiam principem decumbant. Hinc dixit Itaque censeat Hippoc. proximum medicamentum vacuandum esse, priusquam haec omnia, aut aliqua fiant. Hinc ait Hipp. Purgandum est in valde acutis, si incipit materia, eodem ipso die, differe enim in talibus malum. Cui sententia Actius ascribere voluit, cum exatit, & valde acutis, eodem ipso die, quod tales loci docendi sunt: turgentis enim materiae praesentis preparatio fieri nequit: ait cum Aetius ille. Purgatione uti vel non turgente materia, huius modi preparationi locus non est, nisi haec coctione quis forte ualuit fuerit occasio, nam aquam nullam exhibendi in qua hyssopum origanum, aut tragonum, vel thymum, vel polegnum, vel quippiam aliud humores attenuans incoctum. Ceterum ait Hipp. In morbis acutis raro, & per initia medicamentum purgante utendum est. Idque diligenter cum praedicatione facere oportet, & alio in loco, de mulieribus praegnantibus a quarto usque ad septimum mensem, recte purgandis, ait eandem, reclususque agendum esse. De solutiis asserendo ignis validis, ac in valde acutis, seu peracutis morbis, ut alio in loco explanauit: ac ut abunde capite praecedente demonstretur, cum in peracutis suppleendum sit vena sectione, & lacte assuino copiose dato, pro alio solueda Hippocritas morbo, ut cap. proprio dicam. In morbis itaque vehementer magnis, valdeque acutis, immo peracutis, circa initia raro purgare oportet. In magnis vero simpliciter, ac simpliciter acutis frequenter in principiis purgandum erit, cum ratione, & differentia, immo cap. praecedenti allata, tum etiam dum in eis turgat materia, tum etiam alijs rationibus, quas proponam in sequentibus capitulis, alias humorum purgationum differentias declarandis. Raro autem in vehementer magnis, & valde acutis purgare oportet in principiis: Cum duntaxat dum humores turgent circa initia in his morbis purgandum veniat, Hippocritas decreto testis hoc decreto etiam turgentem impropre humores, tum morbifici, tum sani motu determinato peccantes aliquam partem in eo magis morbi magnitudine lethali vel infelici lardentes educti, reuelliuntur gratia reduciendi sunt. In morbis tamen simpliciter magnis, tum acutis simpliciter, tum ex decidentia, tum in cruciis, ut in pleuritide, doloribus vehementissimis, in angina in fugillatis, in nasi fractura, in percussis, ut videbo propius locis. Ratio enim est, quod non ut turgent materia indicat sui euacuationem, immo quatenus tunc vel magnitudinem morbi cacoehymam per se lethalem, vel infelicem, seu rediosum efficit, vel efficit imminenter potest: ab ipsa magnitudine illius materiae eductio per se semio tollende indicatur.

Quod

A

De cacoehyma
lib. 2. p.
Com. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

4. Aph. 1.

De cacoehyma
morbo 11.
De acutis
in mor. acutis

Lib. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
1. aph. 1.

B

Com. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Hipp. 1. aph. 1.

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

C

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

D

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

E

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

F

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

G

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

H

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

I

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

K

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

L

1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.
Com. 1. aph. 1.

4. De vi& me in
m. p. 11. & 12.
4. Aph. 10.
4. De m&da &
64.

A Quod quidem in vehementissimis morbis non est observandum, nec in valde magnis pariter agendum est: nec in valde acutis nisi turgat. At verò in his morbis, non nisi per raro materia turgat ait Hippocrates: ergo quoque peccatò in ijs morbis circa initia purgare conuenit: Etanq; sanè ob rem interdum non purgandum est, licet materia turgat, cum turgentia corpora ad purgationem alui parata non sint, immo inepta sunt: cum dicat *Interdum nec ipsa laborantis natura medicamentum admittit*, nempe quando natura corporis turgens ad purgationem agendam, inepta est, vel naturaliter, seu accidentaliter: Quocirca vti illius rei integram habemus doctrinam, modo vtilitatem, & iacturam purgationis turgentium succotum perpendere tenor: De erimenta namque omnia huius purgationis, cum nec à vijs, nec à succis ad euacuationem ià exatè preparatis emergant, quippe tantum à corporibus turgentibus ad aluinam purgationem ineptis exoriantur: Ex quo, quæ nam corpora ad aluinam purgationem inepta sint, etià disquiram. Quandoquidem, tametsi illico solutiuo pharmaco eos turgentes purgare succos deuinectur; cum ibi preparatio sit æquè totum horum medicamentum, cum via, per quam facilius educere humores valeamus; nihilominus cum etiam corporis turgidi preparatio requiratur ad aluinam molliendam purgationem; Ideo interdum etiam præsentibus his succis turgentibus, solutiuo pharmaco sanè valde non est purgandum; immo tantum leui leniente remedio aluus lenienda venit, ob corporis indispotionem, solam subpurgationem permittentem: Quandoque vero adeo corpus ad aluinam agendam subdutionem ineptum inuenitur, vt nullam omnino alui eductionem admittat, leniente ore assumpto; immo duntaxat enematis ope aluus subducenda est; vel enemationibus rectè vti possumus. Cum autem hæc doctrina, Hippocrates, & Galeni decretis huc vsque à nullo scriptore vndique promulgata fuerit: Proinde in morem agrotantium vtilitatis studium, huius doctrinæ ex planatu difficilis dilucidationem penitus ingreditur, vna, & vtilitatem, & damnum, quæ à medicamento solutiuo attingi possunt, enarrabo. Cum res ipsa ita difficile sit, vt cum magna religione, & circumspectione facere oporteat, vt Hippocrates ait, & Galenus inquit. *Vnde mihi videtur Hippocrates rectè illud addidisse: Idque diligenti cum præmeditatione, & consideratione accurata facere oportet.* Et alio in loco habetur. *Cum neque affligentes humores plerumque concitari sunt à principio: neque si hoc adfit, agrotus aptus sit purgationi, vel se preparandi tempus donec nobis non præstet.* Et alio in loco ait Gal. Maiorem igitur ex infestorum humorum vacuatione vtilitatem consequi oportet, quod ex medicamentis purgantibus igneis corpus necessariò accipit, ab ijs enim calit, exsiccatur, simulque inflammatur, & colliquefit. Non igitur propter calorem illum febrilem purgatio nobis insinuitur (hanc enim feimus quantum in se est nocit) sed humorem, qui febris causa fuit nomine. Ideoque vtilitatem cum proposuerit, necnon damnum declarauerit, quod ex ijs medicamentis corpus recipere potest illico perpendo prius emolumentum narrando, ait. *Maiorem autem vtilitatem esse contingit, si & citra molestiam, & totus humor nocuus, & infestus vacuetur.* Subiude verò tres conditiones statuit, quibus eam vtilitatem consequi valeamus quod, *vt fiat, videndum primum est, an quæ ignorat ad eiusmodi purgationem aptus, idoneusq; existat.* Alia verò conditio est. *Deinde et agrotans humores quæ pot fieri maxime fluxiles esse oportet, hoc est leniatis esse, minimeq; lenoris participes.* Deniq; tertiam itatuit conditionē. *Apertos deniq; reseratosq; esse conuenit meatus, per quos purgatio fieri debeat, atq; omni obstructione liberatos.* Quæ tres conditiones requiruntur, ad præceptum id Hipp. vbi ait. *Corpora quæcumq; quis purgare volet, fluxa, & lubrica faciat oportet.* Examinat aut ibidem Gal. primam conditionē per oppositū, corpora constituendo, purgationi inepta. Quatuor n. modis talia esse posse deprimie. *Nam qui cruditatis ex multis, aut lentis, aut crasis edulis abundant, quibus ite flatibus sunt distenta hypochondria, aut vniue,* *nam modū calida, & ignea, aut*

1. Aph. 84.
Ibidem.
De re quædam per
se oportet 88
6.
Coma. aph. 14.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

3. Aph. 9 & Gal.
lenus 6. apud c.
1. com. 12. & 1.
apho. 34. & 7.
aph. 66.
8. Aph. 4.
4. De vit. m&da
m. p. 11. & 12.
Pud. p. 126.

Ibidem.
4. De vitæ in
m. p. 11. & 12.
Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Peccatò autē ea
materia turget
in morbis vbi
est febris magna.
ergo de peccatò
hij purgandum
est.
Alia ratio cur
cū diligen in pur
gationibus
ad hoc facere
n oportet. Nisi
materia turgens
quandoque con
spurgationis
aptam est.
Ergo hic de vti
litate, & iactura
purgationis ho
rum locum
turgentibus ag
endum est. quæ
materia ad pur
gationem a
gendum vel ido
neum vel inept
sint.

Vtilitas ad dam
num medicamē
ti ponderatur à
Galeno.
Nocuum autem
medicamēti fo
iustum in febri.

Vtilitas medica
mentum.
Tres conditio
nes, vt ex vili
tate habeatur.
Prima conditio.
Secunda conditio.
Tertia conditio.

Prima conditio
ne caret cor
pus ad pur
gationem ineptum.
Corpus ad pur
gationem ineptum
non est.

Corpus in fine est
Galenus & quævis
modis talia esse
possunt.
Ex Hipp. quæ
dam sunt corpora
inaptum.

Prima locum.
Et secundum locum.

Gal. tamen est.
1. aut lentis
purgationi ido
neum esse, m. p.
11. & 12. iactura
libri iam
notatum est.
Galenus.

Dolores capitis
quo horrores
ad purgationē
inepti reddunt.
Galenus.

Totum Secundum.

D Venerea.

venerea, frictio, astimatio, frigus, vigilia, ira, amor, ac timor. Cum in dolore capitis igitur, aliquo modo, ex his modis exortio, morbi magnitudo cacochymia non sit virgens per se, hinc etiam nec expurgationem cacochymia indicans per se est, proinde ibi purgare solutio in medicamento non licet. Verum etsi talis magnitudo adesset ob cacochymiam cumulum antea genitum, igneis solutus, et scammionem, seu elleboro, Græcorum vero vürpato, nunquam alium solvere auderem; Quandoquidem tunc sanguis, & spiritus, sua natura actu calidissimus, ac præternaturaliter vltimus exalfectus, & peragitarus, ac igneus factus est. Vnde si exhiberemus igneum purgans, procul omni dubio febrem atdentem, fortassique mortem inferremus: ergo corpora hæc ad aluiam purgationem validioribus solutiis molendam inepta inveniuntur. Decolores item, nempe exangues, seu sanguine deficientes decolores nuncupat. Proprie enim decolores sanguine carentes vocant Medici, eosque, qui propter aliam affectionem corpus non secundum naturam affectum habent: mali coloris appellant. Verum dubium oritur, quia post raucos, & lieniosos ponit exangues, quæ, ut ait Galenus sanguinis inopiam habent, etsi non aperit, manifestellæ fuerint decolores: & alibi inquit Hippocrates, minime purgandi decolores, raucedinosi, lieniosi, sanguine defeciti, & ergo decolores, sanguine defeciti, seu sanguine carentes nequaquam sunt. Verum enimvero decolores sanguine re vera deficientes, seu carentes sunt, sicut etiam exangues inveniuntur; atamen ab exanguebus differunt, cum exangues non aperit, manifestellæ decolores sint: immo aliquantulum rubeo colore tincti, ut sunt hi quibus sanguis multo profusio exierit. Decolores igitur ipsi purgandi non veniunt, cum ibi natura robur minime adsit; quippe virtutis naturæ imbecillitas magna adest, solutioi validi pharmaci exhibitionem inhibet: Quocirca neque in cachexia, nec hydropo, tali medicamento vii decet, nisi vitium robur adfuerit; hinc tales ægros per episcasium curamus parvis euacuationibus, & multis potius. Hi ergo decolores calidiori expositulanti tum excretionibus, tum vim facultate calidi potui, & cibis, qui talem obtineant facultatem, non autem purgatione, seu medicatione purgari nãque, & medicamento purgante uti, idem significant. Cæterum in Raucos drinde subiungit. Nempe & horum humiditatem, & frigiditatem ob delapsam ad guttur rheuma sanare convenit, exsecratis scilicet topicorum auxiliorum resu tum capite, non cæteris, quæ afflicta sunt, membris. Non autem raucis aluiua convenit purgatio; sed hæc maxima vergit dubium: Nam Galenus ad rheumaticos preferuandos, ne in magnum morbum aliquem incidant, reuulsione gratia, inquit curationis initium illis à misso oriatur sanguine, pag si excrementa prauam etiam qualitatem habuerint, tunc adhibeatur purgatio, tamen si pro his curandis scopus sit non euacuatio, sed corporis totius roboratio: Nã ostensum est, infirmam naturam partem promptè granari, & si quod propellitur, prauum sit sanguis, siue alius quibus succus ad propinquum primæ, veniat partem necesse est. Ergo ne cacochymia, quæ in toto residet corpore, in cerebrum primò ascendat, subinde ad alenas excipiendis excrementis idoneo, tum ob substantiam laxitatem, tum quia omnium partium minime robustas habeant, na uales virtutes, descendat, postque ne in pulmonem labatur, qui sicutum recipienda promptissimum intuspicitur; proinde ipsa cacochymia educenda venit. Pro solutione autem dico, rheumaticos vocatos affectus provenire vel toto videlicet corpore infermo, quæ tunc est mali habens species: à quo toto corpore ita cacochymia obnoxio, rheuma fit: vel toto corpore non ita laeso, ab aliquatamen parte mali succi copia ad cerebrum transmissa, alio modo rheuma gignitur. Si autem à prima constitutione emerget, cacochymia purgatio cõueniens: si verò à secunda constitutione ocatur, euacuatio solutio igneo medicamento baud com petis: maxime cum ibi Hippocrates rheumaticos fieri intendat à sanguine calidiori, ac mordaci ferius corporis, nullum prauum in corpore habentem pariente, ad cerebrum euapocante, quibus rheumaticis vena sectione re-

generari, ac depurari, simulque reuulsua auxilium, non autem igneis pharmaci purgantibus, quia istæ maiorem sanguinis effluere euapocantem, maioremque ideo in cerebrum inferrent, idcirco tales caucos ad aluiam purgationem his solutiis ineptos esse, patenter notum esse reor: Præerea & lieniosos purgatione baudquam egerant. Verum hic facia prius distinctione, id intelligendum est: quoniam lieniosos nò dum succos melancholicos, seu atrabiles, fluxiles, seu præparatos, in lienisq; collectos habentes, immo crudos, statique copioso annexos, purgandi minime sunt. Quæ qui crudis atribus exsistunt, aut lentis, aut erassis edulis abundant, quibus item flantibus sunt dentali hypochondria, sunt ad purgationes inepti. Lieniosos verò hos succos à natura iam coctos, ad arteque adæquatos, simulque vias apertas, atq; virium robur possidentibus, cacochymia eductio congruissimuma semper inspicitur. Eandem sane ob causam Galenus in com. explanat. Quod non resiste diffum arbitror, cum lieniosis, si alij quibusdam purgandi sunt quia nigra existunt. Sed, Post lieniosos meminit eorum, qui sanguinis inopiam habent, et si nò aperit, manifestellæ fuerint decolores. Quibus exanguebus, licet etiam morbi magnitudo cacochymia, vel quoad copiam, vel quoad alio modo esset, nihilominus ex purgatio nocua foret, ois virium imbecillitatem propter sanguinis defectum obortam: Nam si tunc purgare tentaremus, procul omni dubio ea, quæ morbo resistent, & sana sunt ab igneo solutioi colliquerent. At debili reddio corpore, morbus superior evadit. Qui ubi corpus superaret, curationem non admittet. Cæterum dicinde mentionem Hippocrates de spiritiosis facit, sic et spiritibus, & fusciosis: obscurè ita loquens, ut non constet, utrumne singuli horum seorsim intelligendi veniant; an hi tres una comprehendendi; neque adhuc in singulis horum seorsim intellectus perspicuus est sermo. Nempe spiritiosos sapius eos

denotat.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

A *diuturnitas vocant, qui cum inspirant aere indigent: interdum autem & inflatos: quorum verique multas habet causas, quas omnes se percurrunt, prolixior, quam par sit, sermo est futurus. Ego quos spirituosos, & quae de causa intelligat Hippocrates ineptos purgationi esse, dilucidare tentabo. Quoad primum, spirituosos, non quidem secundo modo à Galeno statuto, immo prima acceptione, ab Hippocrate assumuntur, tum quia Diuinus Senex penultimo loco inflatos posuit à spirituosos distinctos, tum etiam eo quod spirituosos à spirandi difficultate, appellauit, quibus auidè, & crebè spirantes vocandam spiritum expirantes, quam inspirantes: Cum anhelitus verò difficultas praesertim in orthopnea eueniat, ubi summa cruditas adest, ac virum ingens imbecillitas, simulque euident suffocationis periculum, his ergo de causis nullatenus tunc purgandum venit. Galeus autem ambigè perpendo, ait sic & sicce sufficientem affectione tua sunt, neque fistulosi. Neque etiam impraefertim certiores fieri possumus, an de febricitantibus fistulosus sermo sit, an de non febricitantibus fistulosus, an de verisque: Quod si vnum horum, quae in aphorismis reuoluentur, meminimus, quod vniuersale est tollerare: Quidam autem in aphorismis. Si non febricitans inappetentia fuerit, oris ventriculi morfos, tenebriosa verigo, & oris autem, id per superiora purgatione indigere significat; si autem oris amaritas, fistulosus sunt. Tufus autem cum nihil sit aliud, quam vehemensissima quaedam efflatio, pulmōnis se ipsum*

ab excrementis expurgare tentantis, quo plurimū simul, eeleriterque foras actus spiritus, acti a-
halet, propellatque fmo impetu qua vias suas obstruunt: eoque primo ad gressu pellicere quod offendit non
uoluit, bis, terque, se inycere in id non gravatur, tametsi interduz etiam. Tussis propter fmo-
tū exulcerationem fit, nempe ob arteriz aspera exulcerationem, quoniam humores, qui in
arterijs contumaciter herent, & qui difficulte tussī reijciuntur, tussim siccam vtique pariunt,
vnde magis expeditis sneruationibus, ut potē in quibus maior etiam est spiritus impetus, quam
in tussī. Porro tussis sicca etiam fit, quociens in pulmone, seu in pectore inherebant humo-
res crassi, & glutinosi, ac ita crudi, vt nihil eorum tussī excreantur: Tussis enim talis vis in
pectore, ac pulmone est, qualis actio expultrix facultatis in ventriculo. Quz sanē bifariam
accidere potest, vt vehementer tussiendo pauca leuē nihil quī expuat; alijenim ob tenemē videtur
tur; siquidem tenuis humor quem subleuat effit, inter tussendum ad spiritū diuissus refuit. Lenius
verō, aut amandū crassius difficulte effertur; nisi enim spiritus, qui tussiendo effertur & nullus, &
vehemens fuerit, nihil secum educet. Hinc sicca tussis progignitur. Si ergo primo ordine tuf-
fis sicca accideret, ob falsam pituitam glutinosam, & crassam, asperam arteriam vicerantem
a capite calido genitam, postea in tracheam delabentem, concurrente etiam toto corpore a
lidiore frigore periti, & pectoris refrigerio, nunquam hic ignis coarctabitur zotes curare ad-
diderit.

Spizianosi nem
pe aditatus
exat purgandi
m. a. l. m. l. m.

Sono collettivi
non fatti per
grandi.

Taffis quid sit.
Galenus.

Celina.

Galerus.
Tuffis loca.

Galeros.
Galeros.

Sires tuffis ex
purgatio. nō. a
venis solutus
medicamentis
molienda.
Quæ sunt tuffi
dignis est.

Sirculofliggi
foluaria purg
di non fume.

Flaqueo bilioso
un pharmacien
purgandi mo-
dum.
An flammæ e-
venant in inter-
ceptione affe-
ctus flammæ a-
purgandi mo-
dum. *De fluxu et Ha-*
Mam duplex fi-
tudo in illis
gradibus; in ex-
citare et idcirco
de magis venarum
interceptio
afficitur; ac ve-
que flammæ
interceptio tota
ita valens
pharmacis ab-
est et idcirco
afficitur purgandi

Multa ab H
postra Gall
explorata su
devastata.

Lib. prinet. 11.
de de nat. hom.
274. de de locis
in hom. 412. ex
Tosio.

• De viet.ru, in
m. 2.1.1.1.

4. 405.17.

Lib. 3. de Symp.
caus. 4.
9. Meth. med. c.
8.
Lib. 4. c. de Tuf
fi.
Lib. 3. de Symp.
caus. 4.

4. De hoe. affect.
a. De symptomen.

A. De Vries, *Wageningen*
(1964-65).

Lib. de flacio

Lib. de prisc
med. p. 26.

a. Die wirt. nat. j.
1998: 104.

4. De veldregio
maart 1815.

A nanque ijs symptomatibus subpurgaciones blandæ lenientibus agendæ, ægrorum emolumento, congruæ sunt. Verum oraculi Hippocratis symptomatum dilucidationem ingrediar, aut enim Regre purgandi qui nigra vomitione refundunt. Nigra autem excrementa, vel melancholica, vel atrabilaria, aut fucci nigri sunt, ut alibi fusè dicam: Quælibet autem horum per vomitionem suum exitum propere, seu per partem competentem, nunquam motus ille naturæ rectè operantis deorsum reterendus est: Possit inquit velle inter moti animo deficiunt, aut cibos aduersantur. Virium enim robore ambo deficiunt, seu alimenti retinendi penuria: siue animosæ simulq; vitalis facultatis cordis defectu: ideo hi purgandi nequaquam veniunt. Desistant se desuper cum febre vehementi, aut à sanguine calidiori, aut à materia fimum cruda, viribusq; admodum inobcillibus, hi plenè quidem purgandi non sunt. Melancholici tamen, & capite offensi, necessariò validas, & largas aluias eductiones querunt, ut capite sequenti ostendamus. Quique dolore vexati parum dormiunt, seu ad pubem non nihil dolent. hi, cum ob vigilias, vires valde imbecillas contineant, amplas alui purgationes ferre nequeunt. Qui appetitum ferocem, & obliquè deflexum habent, seu clausis oculis, &c. Quoniam tales à calidiori copiosiorique sunt sanguine, morbi magnitudinem sanguineam excitant, proinde venæ sectio indicant agenda, non autem alui purgatio. Substantiæ sunt. Illi autem toto

Cur nigra vomit
non sint pur
gandi.
Cur qui febril
moti animo de
ficiant: & qui i
bos non retineat
ob sint purgan
di.

Quibus deficiit
alui purgatio
non non fit.

Vigilantes ob
dolores capitis
purgandi non
sunt.

Cur appetit fer
rorem & obliqu
è habentes no
sunt purgandi.

Substantiæ non
sunt purgandi.

Veniunt & fel
icitantes no
sunt ignis solu
tione purgandi.

Quibus ferocis
passus habet
ignis soluti
one multo no
cuiuslibet sed
tum vomitola
rebus copiosæ

Corpora ad ali
ud purgant
reperit que fa
no sunt.

Cur corpus ea
de fani mira
me purganda
sunt ignis solu
tione.

Præcipue empo
si nigri non
sunt purganda.

Nec etiam humi
dum continet
humidum.

Nec subfici
corpora.

Cur balbi & b
si non sint pur
gandi.

Hippoc. 4. aph.
Galenus in co
mentis.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

Lib. 2. de studi
morum recte ca
sualis.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

4. De vicinis
in a. c. 10. 3.

Secundus Hip
pocritus.

Oculus hi p-
lous.

Galenus locum
candem dicit
conditioibus
lois constitutas.

Obiectio.
Solutio.
In quo alius flo-
re fit b. ante
purgandum se in
quo nihil pur-
gandum.
Locus Galeni
fereus de hac
se iet affinitas.

Pinguis nimis
vehementer sola
non non fuit
purgandi.
Pinguis qui ad
fuit.

Quoniam ex-
tremis corpora
maxima pinguis
valde non fuit
purganda.

Nimis graciles
ad purgationem
inopis.

Sanguis ignis
solutus non fuit
purgandi.
Sanguis de
viciis purgan-
di non fuit.

Imbecillitas pur-
gandi maxime
fuit.

Admiratio pro-
prietates non fuit
purgandi.

inuenio in febre mali moris cum alui fluore coliquatio, purgationes desinasse, constrictas.
*Purgationes multos offendebant, quorum qui sic habebant, cito multi periebant, multis malum produce-
batur.* Sed Gal. alibi duas alias corporis ad aluinas purgationes inepti conditiones recenset, hoc
est oris ventriculi imbecillitatem, & cardialgia præcessa, & etiam reinitata, obortum: quocirca
prius quam purgare nitamur, os ventriculi fomentationibus roborare deuenimus. Vterius quo-
ries alui fluor symptomatikus ortus sit non à Natura vincente, immo à natura irritata, vel à fe-
bris incendio, aut ab humorum prauitate, seu acrimonia, siue putredine, in febris cacoethis vni-
uersali incremento, materia valde cruda præfente, nihil purgandum est, etsi fluor imminutus se-
set. & quamvis non sit pro multitudinis succorum peccantium ratione: Verum hæc sola eductio suffi-
cit. Multos itaque vidi sapienti, qui ita affecti erant, quosdam interisse, nonnullos ad extremum periculum
fuisse perducos, cum Medici eos euacuare tentassent, antequam os ventriculi corroborassent. Sed neque
si fuerit febris cum profusio ventris, alia est opus euacuatione. Quod ex Hippocratis loco postre-
mo citato Galenus inuenit. Neque obijcere poteris iniquis Hippocratis ait. Quo natura vergit,
eo educere oportet, per viam competentem. Nam Autor de Natura vincente, in morbi declaratione
ibi intelligit. Galenus vero de natura irritata verba facit: in febris augmento, & de motu sym-
ptomatiko, non autem critico, vt Hippo. intelligit. Causæ autem cur fluere alui hoc modo, pur-
gare non oportet, iam cap. 2. huius libri statuta sunt. Quia hæc iactura ibidem connumerata se-
querentur. Cæterum tandem in quodam loco hæc inspicuntur, ad idem asseruerandum, Nimis
vero pinguis, nimis quæ græues ad purgandum incongrui, multo abundantes sanguine, & frequenter
deficientes sanguine, & vix curabiles, & cito vomentes pro qualibet occasione, & pueri & senes, &
mulieres fortiter menstruosæ, & puram valde corpus habentes; & qui bene cæuerint in diæta, &
quibus valde restringitur ventris secundum naturam; Sed & etiam in dysenteria; & qui leuiter appre-
henduntur cælica passione, de solutius omnino igneis, & validioribus loquendo. Quoniam quo-
niam locus hæc postremus (vt à Gadaldino adnotatur) ex Aetio desumptus, erroribus tamen sca-
ens, proinde modis, quibus verum fit, vbi hæc sunt; Cathartica præbenda non fore; & ac si ius rei
causas dilucidare tentabo. Quandoquidem Nimis pingues purgante validiores, & igneo, expur-
gandi neutrquam sunt. Pinguis vero corpora, & obesa corpora, idem esse asserere valco: Obesi
autem cum pingues sint, à gracilibus, non vt à gracilibus quidem contradistinguntur, immo vt
à macrisque siccis: Nam graciles reuera, & carne pleni contrarij sunt. Galeni sententia: sed carne
pleni, humidis natura, ac molles, non pingues esse possunt, in eo quod pinguedo carni ferè pezo
minetur, vt pinguis cœuenit, carnosus ergo viri, non pingues esse valent; isti vero plethoricis sūt,
plurimo sanguine decorati, rubro colore, venisque latis præditi: Obesi vero non modo humidi,
ac molles natura, verum etiam albo colore sunt: venisque angustis, & potius cacoehymi pituito
si, frigido, ac humido temperamento comprehenduntur: & quo obefiores sunt, eo etiam pituito
ma iactura, accedent, vt illi Mulieri obesa sanæ contigit, quæ proliis gratia,
pharmacum accepit. Quarto vbi parua sanguinis multitudo adest, ibi etiam vires validæ absūt;
ideo hi obesi corporibus dato validiori pharmaco, mirum non est, si in lipothymiam, & in
syncope corpora hæc incident; vt illi Mulieri euenit; quæ quinquies emorta est, vixit tamen. De-
inde vero ait, nimis quæ græues ad purgandum incongrui; cur autem hi purgandi non sunt: quia an-
tea iam declarauimus de subficcis, alloquendo, Nam vt ait Gal. validiorum esse naturæ scioris
patet. Ideo eorum hic non meminero. Postea autem inquit multo abundantes sanguine, cum ta-
lia expurganda sint, qualia peccant: Verum vbi sanguis capia peccat, ibi vena secanda venit, non
autem cacoehyma eductio conueniens est. Subinde vero habet & frequenter deficientes vel san-
guine, vel spiritibus; Quoniam hi viribus quoque validis deficient; idcirco hos purgare non li-
cet. Postmodum vero exarat & vix curabiles, vix enim curabiles intelligendi sunt, meo quidē
iudicio, illi, qui ita viribus totius corporis imbecillibus cōspiciuntur: vt nō oīsi leuiora lenientia
his exhibere valeamus, non autem validiora purgantia. Cuius rei, cum meminerit Hippo. ait. Sed
in validioribus natura validioribus medicamentis vtendum; debilibus vero non valentia medicamen-
ta danda; Neque medicamentum transfusa aduā est, sed singulis secundum suam naturam exhibendū;
ita in debilibus quidem, debilia natura medicamenta danda. Cæterum exinde scribit, & cito vomen-
tes, pro qualibet occasione. His namque medicamenta cathartica dare minime debemus; cum ni-
hil per alium purgare talia pharmaca nequeant, vnde frustratoria essent. Adde quoque, quod ci-

A
3 Epid. Sect. 3. v.
3. 5. 3. 5. 3.
Ad Glauca.
16.
Ibidem.

Ibidem.

2. Aph. 31.
B

De dynamidi
fol. 10. F.

In exordio libri
3 de dynamidi
fol. 19.

C
la lib. Hippo. de
animo cum 1.
contra 2d. F.
36. 3.

Gal. 3. de loc. af-
fectu 7. 7. 7.

Vi dictum est.
3. de magni-
tudinis sing.
D
3. Epid. 31. 4.

Ibidem.

De amelia
rom. 3. contra.
3. 5. 3. 5. 3.
Hipp. 3. 3. 3. 3.
Ad Glauca.
16. 3. 3. 3. 3.

De hoc in textu
est 410 in textu.

A eo vomentibus, hæc solutiva ore assumpta, admodum ventriculum facultate retentrici labefactum, imbecillitatem efficiunt, proinde ijs purgantia allata non sunt exhibenda. At vero nec pueri his pharmacis expurgandi veniunt, cum quia hi propè genituram se habent, ac non dum in suo robore naturali firmati sunt; tum eo, quòd pueri caloris innati subtilitatem valde halituosam, euaporabilemque, continent: Quocirca talibus medicamentis, à virium robore haud permittis, adhibitis, aut pueri obirent, aut in syncope, seu liposichiam inciderent: sanguinemque excerneret possent: vel saltem ita enervati manerent, quòd suo vitæ decursu toto, ipsa iactura, non essent in suo naturali virium robore. Senex vero nec etiam vehementer purgandi veniunt, cum in plerisque ij virium robore, validas alui expurgationes permittente, deficiant. Nec pariter mulieres fortiter menstruas, & purum valde corpus habentes, his cathartici, vacuandæ sunt; cū à mulieribus expurgationibus, adeo totum corpus aequè tum à plethoria, tum à cacoehymia mulieres purificetur, ut non modo cacoehymia nulla educatione, verum nec etiam plethoriae villa detractatione corpus raleat. Sed illico perpendo conferbit, & qui bene caverint in data minime strenuè purgandi, etiam si morbi magnitudine cacoehymia corriperetur, cum ibi nec prauitate, neque copia cacoehymia valde peccare valeat, quoniam hi à quocunque errore bene caverint in diastasi circa omnes res non naturales. Verum statim subiungit, & quibus valde restringitur venter secundum naturam ampla aluina vacuatio non compete, quia maxime mutationes eorum, quæ circa naturam nostram habitatione, contingunt, maxime morbos committunt, ut iam alijs rationibus dictum etiam est obne si quidem nimirum naturæ inimicum. Paulatim vero quod fit natum, & facienda est mutatio, ergo non maxima mutationes, ab alio natura stricto, ad ingentem alui euacuationem progredi debemus; quippe tantum paulatim assuetudines, male removendæ sunt. Cum hæc iam in naturam acquisitam transfiguratae sint. Cum à præstantissimi medicis aduentitia natura consuetudo fuerit vocata. Deinde autem postleritati tradit, sed & etiam in dysenteria pharmacia valida acriora, mordacioraque, & Ignea, nullatenus danda sunt; quæ alia scamoneon, & elleborus, rapia, & emidiij granum, ricina, seu ehera appellatur, sunt, quibus Hippocrates uti consuevit, Quandoquidem isthæ non solum dysenteriam, hoc est, intestinum dysfunctionem, siue mucosam, seu peliculatam vel veranque augebunt, ac vero etiam intestina vlcetendo, tertiam dysenterie speciem generabunt; Vltra quòd etiam sanguinem biliosum efficiendo, etiam causam dysenteriz longè efficacioram reddere poterunt. Sed & qui leniter apprehenduntur Celicæ passione, his purgantibus, expurgandi non sunt; cum ibi chylo, & consequenter etiam sanguine aimentali deficient ægri; quare tunc dignitas virium magis urget, quam morbi magnitudo cacoehymia per se cacoehymia educationem indicans, etiam si cacoehymia turgere, per aluonemque eius exiti quæreret. His autem sic iactis fundamentis, manifestum est, talia solutiva in febre magna, seu in alio morbo acuto, & magno incògrua esse; quia tunc, si medicamento purgante igneo, in febre, aut aliquo alio morbo magno, & acuto vteremur, procul omni dubio à medicamento eo exhibito, certum damnum consequeremur, nullamque utilitatem; ergo iure merito dixit Hippocrates: Idque diligenti cum præmeditatione, & consideratione accurata facere oportet, ut inquit etiam Gal. in com. Nam siue diligenter præmeditationem, siue agrotantis præparationem, sine relictis, quod eius fieri potest induij expectationem, siue ex ijs aliqua, siue etiam omnia intelligat suam cervè religionem, & cautionem in talibus purgationibus aperte indicat. Verum dubitationis locus eade, cum videatur ad purgationes corpora hæc incepta talis purgationis impedita adesse non posse, vbi præsentibus humores turgentes, errabundi, tenues ad sunt, motu agitatione, latione, & fluxu peccantes, ibi enim nec inhi, nec immobiles sunt, ibique neque tumor inflammatorius, neque præcordia tensa, ac inflata, aut alia familia adesse possunt, talem purgationem prohibèria. Verum enim verò utranque cum in corpore humano simul, loco tamen diverso adesse valeant, nempe, & corpus ad purgationes ineptum, & succi turgentes morbi magnitudinem cacoehymiam imminuentem gignentes ut ex his Galeni verbis colligere poteris. Quare non sine ratione dixit Hippoc. in morbis acutis, & raro, & per initia usum fore purgatorij medicamenti partim quia initio nocentes humores sepe non concluduntur: partim eisdem id fiat nempe tametsi turgente, æger tamen ad purgationem ineptus habetur. Quocirca tunc licet humores præparati essent, non tamen agrotantis corpus præparatum erit: Hinc tres præparationes statuit Galenus antea allatas, ad medicamenti purgantis utilitatem omnimodam consequendam; hoc est corporis ægroti, & humoris, & viæ præparatio, ut citra molestiam, & totius humoris nocium, & intestini vacuam, quæ in istarum præparationes ita vicissim distinxit sunt, ut vna sine alia adesse valeat: sed humoris præparatio turgentis cum habeatur, si aliquid desit, ut ad alium inelinet fiat cetera cetera præparatio a que melle visus diei, prius ab Hip. statuta, postea à Gal. & ab Onibatio commemorata, ut etiam aliquo valido laxante extrinseco ventrem laxando, vias aperire valebimus eodem tempore aquæ melle datæ. Cæterum perpendo, ut ante cap. 2. iam obiter dixi, quòd noeuementa medicamentorum solutivorum esse per se tantum, ut ignea medicamenta talia sint: quæ calfaciunt, exsiccant, infiammant, colligunt, ac denique deurrunt. Cæteræ verò iacturæ sunt ratione im præparationis, aut corporum, aut humorum, aut viæ; quæ noeuementa iam statuta fuerunt cap. 2. istius libri. Istæ autem noeuementa, non

21. Meth. c. 14.
1. Aph. 14. vide
1. de medicis
centia.

Gala de vicat.
in m. 2. 1.
Laba. istius spe
ria c. 6.

1. Aph. 14.

Ybi d. & 2. aph.
50.
Gal. com. 3. in
Hyp. lib. quæ in
Medic. videri
debet.

1. Aph. 14.

Cum 2. aph. 14.
& 4. aph. 10. &
2. de comp. med.
5. lib. c. 3. & de
1. quæ purga
re oportet 22. 1.

Cum 2. aph. 14.
in fin.

Cum 2. aph. 14.

1. de mor. 466.
Cum 2. aph. 74.
De ijs quæ pos
sunt cap. 2. in
lib. Gal. 11. 1.

Nec pueris to
lunt purgan
da sunt.

Nec senes valde
purgandi sunt.
Nec mulieres
valde menstru
e; & nec castæ
posunt corpus
habentes purgi
da.

Diastasi venter
non solum purg
da, sed etiam
strictum tenet
etiam in mor
bis, si ma
gnitudo caco
ehymia adesse
suscipit causam
ut vehementer
non sunt pur
ganda.

Dysenterici vel
de non sunt pur
gandi.

Nec purgandi
sunt quæ sunt
cellum præcordi
laboriosum.

Ergo esse dicit
Hipp. ad relictis
sunt, & accutis
speculationis fa
cere oportet.
Dehinc in me
gent matris in
corpore, ip
a purgationem
turgens esse pos
si.

Solutio in cor
pore ad purga
tionem septu. in
morbo nuptia
morbi nuptia
dum cacoehy
miam imminu
tem gignentes
adesse.

Tres præparatio
nes ægri humor
um præparati
one edocendi
sunt & viæ; &
corpus quo ad
vires solida præ
paratio; in cor
pore purgatio
re solutivum
distractio agen
da.

Cetera tria quæ
adquædo faci
da edocendi ibi
Hipp. Gal. & On
ibatio statuta.
Purgatio non
tunc.

ta, non

A speciem constitunt, de quibus, ut dixi, ipse mune est differendi propositum. Cathartica verò hæc medicamenta iam purgandi habentia à purgatione cathartica dicta per eundem locum educationis, aphorismo præcedenti narratū, hoc est, per fecesum, cuius profectio purgationis Hipp. in initio, inquit, *Qui iam febre continente detenti diebus paribus me die amicum purgans sanperant, si sanè supra modum nunquam purgati sunt. Qui verò diebus imparibus vehementer medicamentum sumperant, purgati sunt, multatque etiam supra modum purgati perierunt, rationem verò vbi supra tradidit. Sic sanè diebus imparibus dolor contingit. Quin etiam quod quidem humor magis contrahitur. Ergo principaliter Hippocrates de materia turgenti infra educenda, quæto aphor. doctrinam, sempiternis monumentis tradere intendit hinc primò in aphorismo, eam constituit in veto gerentibus, in quibus utique ait, *cautiùs, religiosiusque agendum, cum turgens ea materia hæte infra diaphragmatic frequentius cemetur. Postremaratio sit, quòd 4. aph. 5. de purg. aluina alloquatur ætate non agenda, neque in corporibus, ad talem purgationem ineptis, ante ex Hippocrate positis. Non tamen excluditur, quòd materia ipsa quoque supra diaphragma turgere non valeat, euacuandaque non sit, per vomitionem. Prima ratio sit de iumpta ab eo verbo turgere; Secunda ab alio verbo medicare. Tertia ex locutionibus, ac doctrina Hippocratis in eo quarto aphorismorum tradita. Quarta, & vltima ex Galeni explanatione. Nam Hippocrates primò ac materiam turgentem in prægnantibus, à quarto ad fecesum medicandum esse: illico verò ait. *In medicationibus talia educere è corpore, qualia, & sponere prodentia, vtile.* Turgens enim materia, suum exitum sponte querit, ac natura etiam parata est, eam expellet; ergo ait per eam viam, ad quam natura inclinat rectè agere, ea materia turgente præfente, ut per eadem medicare teneamus: Si itaque turgens materia per infernam partem tantummodo expurganda esset, procul omni dubio, eo in loco declarasset signa indicantia, quando id faciendum sit. Quod non nisi aph. 10. efficit, postquam aph. 17. promulganter signa indicantia, quando materia turgens vomitione educenda sit, ergo sequitur institutum. Insupet per medicari, ne dum quidem medicamento puegant deiectionis, purgandum esse: Verum etiam vomitorio id agendum esse, explanatur, ut ex Hippocrate Galenus desumpsit. Vltimùs Hipp. id, quòd primo, & secundo aphorismo dixerat libri quarti; quia in eo libro, ut ait Galenus, *de sola purgatione eundem habuit sermonem, quoniam de ea hoc maxime libri loco disputationem instituerat, nempe de purgatione præfeterim, quæ purgante materia præfente fieri debet.* Hinc istius purgationis duo membra constituit, nempe vomitionis agenda aph. 17. atque deiectionis molin de aph. 10. Tandem Galin. con-
quirit, ut supra dudum iam dixi. *At verò cathartica appellata pharmaca euacuationis diversam, speciem constitunt, pro ut vel cholagoga, vel melagoga, aut phlegm. igoga sine, de quibus, ut dixi ipsi mune est differendi propositum.* Verum addit *Non tamen maius quicquam docet, quàm quod de omnibus vacuationibus ipse iam dixit.* Ergo ne dum de humoribus turgentibus, & non turgentibus, per fecesum educendū doctrinam statueret intendit Hippocrates: Verum etiam de ijs per quancunque partem, purgant medicamento, extabendis, per quam natura ipsam, tum euacuare inclinat, tuncque actu euacuat: Quod sanè quoque alijs verbis dilucidavit, inquit. *Atque præfiteri fortasse de omnibus vacuationibus, quas Medici circa agrotantium corpora occupari moluntur, alijs disputationem repetere: Caterùm, cum humores per plures nostri corporis partes expurgentur, nec non quoniam in omnibus partibus, quibus insunt, suum exitum querentes, turgere quoque valent: igitur non modò ad alium, & ad vomitum vergentes, turgere possunt; Verum etiam sicuti exitum per alias partes festinantes esse valent, in iisdem alijs quoque partibus turgere possunt:* Hinc non alium de Gal. inibi ait. *Sunt ergo vacuationes interdum medicamentis tum vomitorijs, tum deiectionis totum corpus purgantibus. Nunquam verò medicamentum ex parte quapiam vacuandi vim habet, qualia, quæ per palatum, & nares capitis educunt, excrementa: sunt etiam de genere expurgantium superflua, quæ per tussim thoracem, & pulmonem expurgant, & quæ per urinam eliminant totius sanguinis serosum excrementum. Clyster quoque fuerit de hoc generis: & quicquid demique totum corpus amabilius non vacuat: quomodo: ut in phlegbotomia vacuare creditur, tum generaliter omnis sanguinis ablatio, quoniam modo facta: eiusmodi quoque est vacuatio, tum quæ per venterem, & hemorroides fit. Ergo patet institutum, quod etiam hac ratione confirmatur: in eo, quòd si cutis pustulorum humoris tenuiores, calidi, acres, & mordaces, putridi suam excretionem possolantes, turgent, eò magis humores tenuiores, calidi, acres, & mordaces motu indectummaro fluentes, per vagantes, suam euacuationem flagrantantes turgere quoque queunt. Antecedens enim à Gal. statuitur, hoc modò. *Item verò, & tuberculorum spiritus notum habuimus, quod videlicet in aculam fastigiata, & veluti turgentia calidiorum in cornu gemina sunt, contra si se habentia frigidiorum. Ipsa verò turgere ex pruritu, atque dolore dignoscere licet: moderatè enim calida pruritus solum excitant: sed vehementius calefacientia flatum mordent, atque contrahunt.* Verum dubitatum dignitatem est; doctrinam scilicet ab Hippocrate omnium harum euacuationum; tum totius corporis, tum omnium partium statutam, non turgentium humorum taurum quidem esse, ac aliorum quoque succorum; ratione quorum alias etiam euacuationes, quæ per accidens sunt, constituit Galenus; illico postquam omnes eas alias euacuationes connumeravit; inquit. *Tam etiam, quæ per exercitia, & frictions, & motum omnem, & quæ repore sit, & balneis calidis, præferunt si vel nitrosæ,****

Que Hipp. in
initio subtra-
nat.

Tertia ex Hip.
decreta.

Quarta ratio.

Quandoque mare
ita de supra si-
penti in iunctu-
femur, per
vomitionem de
corde, quæ
rationes.
Materiam ven-
gerent illico
educendam per
vomitionem quo-
que supra dia-
phragma in car-
ni ostendunt.
Prima ratio.

Secunda ratio.

Tertia ratio.

Quarta ratio.

Humores non
modò ad alium,
& ad vomitum
verum etiam ad
alias partes
turgere possunt.
Vacuationes in
his corpore
quælibet facit
humores.
Vacuationes per
venterem.

Caput pugna
firmamentis
medicamentis in
ca
pina delect.
Hipp.

Per tussim pe-
ctus, & pulmo
expurgantur.

Per venterem
generis ven-
trem purgant.

Vacuatio in
tra corpus ad
quælibet facit
humores, quæ
singul
tra sunt.

Vacuatio ex-
pugnat omnia
humores, ita-
ne venetibus
est aph. 17.

Humores pec-
toris educunt
turgentes ali-
quid.

Ex Galeno.
Dubium.

Euacuatio
per accidentia
purgat, quæ
sunt.

Solus.

Enactioes il
le per accidens
mollis humi
ribus conueni
bus, tunc cau
nibus excludit
in mollioribus
m. excludit
mollis humi
ribus conueni
bus, tunc cau
nibus excludit
in mollioribus
m. excludit

nitrosa, vel sulphurea, vel bituminosa fuerint, & denique ex accidenti in diu aquabiliter enseat, quorum antea iam meminimus. Cui respondendo, dico Hippocratem in eo lib. generalem doctrinam omnium euacuationum, & omnium vique humorum constituisse intellexisse. Vnde haec euacuationes, per accidens quoque factae, humoribus turgentibus competunt, ac id sane, me quidem iudice, tribus modis vti venire potest: Quandoquidem tribus prioribus mensibus mulierum vtero generantur, ac etiam duobus postremis mensibus, quibus quinquae menses materia turgens in toto corpore. Mulieres medicandae minime sunt Hippocratis decreto, tunc illi turgentibus humores corrigendi sunt, ijs euacuationibus ex accidenti ministratis. Præterea interdum aliqui non permittunt, quod sibi ipsi præbeamus pharmacum, ut ait Gallicus materia turgens, tuncque illi diu frictionibus, & balneis reuocandi sunt, ut ipsidem euacuationibus, per accidens molliendis, succi illi turgentis euacuentur: Denique hæc omnia, aut saltem aliqua executioni mandanda, in vicijs ratione seruanda, circa res non naturales in omnibus, quibus est materia turgens, ac vbi medicamenta purgantia præbemus. Verum perpende succos turgentis eorum euacuationem per se non indicare, immo sola magnitudo morbi cacochyma ventura, ac imminens generanda ex his turgentibus humoribus, tak in succorum educationem ut vrgens per se indicat. Gignetur enim hæc magnitudo, si cito hi succi non educerentur, dum in aliquam partem principalem ingruerent.

A
L. 1. c. 1. & hoc
lib. 1.

4 Aph. 3.
4 De vena. 16.
c. 1. & alibi vt
libro ipso a. c. 3
ita dicit.

CAPVT VI.

Quinta humorum differentia diluitur: qui improprie turgentis, ac præter naturales existunt, statim vehementer purgandi.

Cicero.

Turgentis non
purgetur qui ad
humorem huius.



Vmoribus autem vniuersaliter, seu propter motu indeterminato finentibus, ac turgentibus perpenfis, modo ideo alios particulariter, & improprie motu determinato turgentis partem facere succos teneat: Cum autem isti vel morbo, vel sano in nostro corpore inspiciantur. Proinde prius morbosos, vt nobis notiores humoribus, subinde vero sanos dilucidabo. Nam omnes quidem humores, tum morbosos, tum sanos, in nostro corpore motu definito peccantes, ac dum sua fluxione,

ira inclinata, ac determinata ad aliquam, tam principalem, quam non principalem partem, cum morbi magnitudine cacochyma, aut præsentem, aut imminens etiam lædentes. Verum etiam firmam sedem in ea parte eorum stabilitate incipere habentes, simulque afficere incipientes, ad humorum proprie turgentium huc vsque iam dilucidatorum Hippocraticam doctrinam redigendos esse, iam ostensum est. Quatenus isti turgentes (et si improprie tantum) appellari possunt, ac in eo, quod etiam istu primo ipso die, vel saltem non ultra secundum, vel tertium diem (pro nostro posse) quo suo motu peccare inciperint, educendi sunt, priusquam sua fluxione, maiorem morbi magnitudinem, per se vrgentem, ac per se lethalem vel infelicem, vel saltem, vt morbis chronicis accidit, coratū difficillimum, gignant. Fluxio enim, seu motus humorum, aliquam partem lædens dum fit, illico per motum, fluxionem contrariam euasione, per partem loci affectu longinquam, demenda perpetuo venit, præsertim eodem tempore, dum incipit. Nam materia, iam fluxa digerenda, discutienda, ac per vicinam partem euacuanda est. Eandem sanè ob causam, cum humores sua terminata fluxione aliquam partem, morbo magno afficere incipiunt, per motum fluxioni contrarium, educendi statim sunt: Quam quidem purgationem Galenus ita recenset, ex partim sibi indicari manifestum est. Nam anersio in contrarium, qua ab Hipp. lib. de humoribus in principio antipasis dicitur, non à substantia, sed à eo andi membri positi inuentio præstat, rationem reddens, cum in linguae vtro curando aliua purgatio ab eo facta fuerit: in ptiaprisino verò vomitionibus purgatio. Vtrum enim verò, sicuti quatuor modis humores, fluxione peccantes, morbi magnitudinem cacochymam gignere valent: quatuor etiam modis, fluxione oppositis ijs hi humores euacuandi sunt. Nam vel sursum, aut deorsum, vel à profundo, seu centro ad alium, seu ad superficiem hi humores fluere possunt vel ad aliquam partem internam, aut externam loco motu fluere alio modo valent. Ita per opposita quatuor terminibus quidem, ijs quatuor fluxionibus contrariis deiciendi erunt. Quoniam habetur. De purgatione in hoc libro distat: desiderant enim egri hanc non modo, ut quod noxiū superueniat, quo turgentur, educat, sed etiam, ut quod iam ad diuersum trahat, tum valet: Atque ob eam rem Hipp. in reliquis omnibus operibus, tum in eo, quod de vlcibus prodidit, morbi etiam magnitudinem ad purgationis indicationem cōsiderat. Purgatio, inquit, per alium plurimum vlcibus prodest: præterea vlcibus, qua in capite accipit: item qua in ventre, & artibus ad hæc us, in quibus ossi caries impendit. Præterea qua sunt, et creduntur, & herpetibus, & reliquis, qua vlcera diuturna reddunt etiam quacumque, diligenda sunt per alium purganda sunt. His verbis clare docet vlcibus omnibus, & vlcibus, quoties præuati dicit, purgationem esse utilem. Et in fine capituli ait: Ac si perpetuum est, quod ab eo didicimus incipientem fluxionem ad contrariam trahendam esse, & quod in principio hæc è longinquo postea ab ipsis vlcibus partibus sit molienda, & c. Alias hæc natiū, quod ad huc fluxum, vel aliam, vel partem educendam

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

Aliæ in nostro corpore cauitates. *At solida rotunda, neque trahunt, neque affluentem humorem recipiunt, naturaliter loquendo, ac calfactæ, vel dolore laborantes, tunc attrahunt, tunc recipiunt, magisque retinent.* Vnde difficiliter humor in his contento, hæc liberè curatione euadunt. Cæterum membri calor accidentalis, cuius ratione attrahit, quoquequo modo fit: cum multis, ac multis quidem modis calor præter naturam effici possit. Omnes tamen, ad quinque genera reduci possunt: Tot enim hæc genera poluit Gal. ubi ait. *Apparet autem, & in alijs corporibus omnibus, quæ se ipsi plus incalcfaciunt, vel ex motu quodam acrius caliditate, vel ex putredine, vel ex vicina parte alterius corporis calidioris, vel ex spiratione, vel ex alimento, ac calefactione, vel ex accimento. Ex motu quidem, veluti in ijs, quæ quomodo exercentur, siccantur, & in lapidibus inuicem collisys, & liquis, & flamma ventilita; Ex putredine autem, tum reliquorum corporum, tum præsertim feminum, & Hercores. Idem quidem nonnumquam videre contingit in columbarum ægestum excrementis, ex putredine ignem accensum.* Nec esse quæsiuit, qui ambigat, quæ ealidorum corporum vicinia alia conualescentiæ, modo ad memoriam reuocet, & balneæ, & solem affluunt, & omnem flammam, ac vniuersas extra calfacientes. Ex conspilatione autem fuliginis, quæ affidens cõstito exbalantur corpore, faciliè introcluduntur: At vero his introclusis, calor quidem igneus fit, quo patet incalcfaci. Alimento in vero natura calidum nobis calorem inferre posse patet. Verum dolor membri vni

Menstrua flava
per 11 dies
ab initio peri
odice quinq;
moderate pro
funda caliditate
sui sufficit.

Dolorem meum
bevi vinum amabile
de fluxu meo cō-
sistat.
Dolor à quibus
cunctis eruat.
Ob quos vultis
se bonorum do-
lor possit.

Propter ingru-
entem scintillam
nantes antabae.

Alia causa della
crisi può
essere la
mancanza di
nutrienti
essenziali
per la
salute
della
popolazione.

Ventilofus ita
minus purgatio
nū vi Gal. de a-
ria uide c. 4. & c.
7. & 13. meth. c.
1. et Hipp. de mor-
bis 133. et
Fos. de a. de na.
hum. 3. 18. & 26.
& 27. quia cili
medicamentis ad
ventilofus ex-
creta sunt atri-
a.

De secundis fin
momentis gestit
incipiendo facili
Hic, de mar. h.
278.
In hoc genere
concordia uolunt
natura vel uol
mentis, nec pos
sibile.

Lib. de rebus
proh. et.

6. Epid. 4.2.2.
7. De symp. 1.
8. c. 6.

[illegible]

2. Deo. 37. 2.
de vic. r. 1.
m. 3. 1. 17.
4. De vic. r. 1.
m. 3. 1. 17.
4. De vic. r. 1.
m. 3. 1. 17.
Com. 1. p. 1.
37.
4. De vic. r. 1.
m. 3. 1. 17.
3. De vic. r. 1.
m. 3. 1. 17.

Lib. de am
looy.Lib. de nat.
par. 6. 2. 1.

7. Apl. 14.
Gala, de al
for. 4. 5. de
mora. 1. de
mora. 20.

1 p. Meth. c.
de cut. lat.
1877

Dē vēriculo rhyalus ad oēs corporis partes in sanguine factio, vt alimentū fertur, ita quidē rhyfus ad ipsū ventericulum per easdem venas oēs retrocedit nec paucā interdū excrementa per easdē venas effluunt ex toto corpore exierunt, per ventericulum, ut p. remanēt purgationis sicuti in suis quoq. p. penamero per ligoria media sanguis optimus ad ventericulum nutriendi eius gratia fertur. Tandē Mēbra propter sui locationē naturalē attrahunt. Vt sunt receptacula talis excrementi attracti, vt chyliis fellea, bilis flauam trahit; lico vērō iūcti, seu spēm sanguinis attrahit pro depurandā sanguificatione simulq. sanguine. Pituita vērō, quia proprio re: p. aculo caret, naturaliter nō attrahitur ab illo mēbro nisi praternaturaliter ad capite calido, ac deinde in pulmōe tuit, partimq. manet in ventericuli fundo; quadantenusq. in mēstotereo, & p. acrore, liene, ac hepate, nec non in ea cauitate, quae inter ventericulum, ac leptum transferuntur iacet, transfinitur, non autē attrahitur. Et hae funt ea, quae ad primum fluxionis genus pertinent. Sub secundo autē genere plures differentiae reperiuntur: Quandoquidem succus prauus in genere venoso, ac toto corpore inexistēs, a natura rectē operante corporis vniuersalis potissimum cordi implantatur, profectō affūdē, ad partem imbecilliorē, defectā, sen zgram, vel rariōrē, laxiōrē, vacuiōrē, ac molliōrē transfinitur. Vel parte aliqua potēnciori, ac validiōri aliquo excremento laesa, aut in se

Tommy Secunda.

E 2 ip(a,

Obiecta.

Solentis fuer-
damentum pri-
mum.Fundamentum
secundum.Tertium funda-
mentum.

Solutio.

tum ob morbi magnitudinem, tum gratia recte curandi topici medicamenti, talia corpo-
ra purganda sunt, porissimum vero reuellendi studio. Neque quis mihi obieciat, inquit,
Galenus ait. Quomodo totum corpus preparare ad curationem afflicti cum circa quamcumque partem
consistitum oporteat. Et enim vena scilicet vitur, & purgatione, & clysteribus, ac inedia, vbi totum
corpus apparuerit, aut multitudine humorum repletum, aut eorumdem malitia variatum: Si vero ne-
atrum horum adfit, statim ad curationem per localia remedia peruenimus. Nam ob priorem ratio-
nem, quae principalis est; vbi enim imminet morbi magnitudo cacochymia, ibi perpetuo purga-
tio ventris fieri ex pedit, nihil sanguine peccante, nihilque cacochymia peccante, ut Gal. ait, illi-
co dum dolor hominem prebenderit, vel pars aliqua fracta fuerit, vel os ex loco pulsus sit, vel alius
quispiam articulus contractus, redullusque sit. Idem quoque in easi ab alio, & in plaga; sanguinem
mittit nullatenus sanguine peccante, idem intelligendum venit etiam de purgatione; & si neu-
tquam humores peccant. Quot enim humores vna cum sanguine educuntur, ut Gal. sangui-
nis missione, tot etiam purgatione ventris expurgantur, & Hipp. lib. de viceribus 899. ait. Inferi-
orem alium purgare conuenit, tum etiam vnicuique capitis, & ventris, & articularum, & quae deli-
gationem possunt. Vnde dico corpus sanum, vel ut nunc, vel ut simpliciter est; corpora ideo sa-
na, ut nunc, et si non ut simpliciter sana sint, ut excrementa aliquo modo, de quo modo intelli-
git Gal. vbi ait. Si corpus humoribus, malitia peccantium repletum non fuerit, ad topica re-
media accedere valeamus. Vnde intelligit quod ne dum actu sit sanum, verum nec etiam in po-
tentia proxima sit ad agrotandum. Mihi autem satis est, hominem ante plagam, ante casum,
ab alto, ante puncturam actu sanum fuisse, ut nunc. Tandem corpore puro existente, nullo do-
lore ex illo possumus illico topica adhibere; at vero in corpore, humoribus puris, ac sanis de-
colorato; dolore superueniente magno; eos humores puros ad particulam attrahente, nisi humo-
res eos puros, ad fluxionem paratos euacuerimus; in parte dolenti inflammatio, ac phlegmone
vtrique fieret, agrotantis viris graui periculo. Vnde et Galeni auctoritas simpliciter intelligenda
est; quae ad dolentem vero vehementer particulam relata, non est vera.

A

6. De com. mod.
3. 300. c. 1.6. De vici. m.
in morbi. acut. 2.
19.

4. Med. c. 6.

6. Epid. com. 1.
c. 18.
6. Epid. com. 2.
c. 11. & com.
2. aph. 17.

B

6. De comp. me-
dic. loc. 4.6. De com. mod.
3. d. 4.

CAP V T VIII.

Septima humorum differentia exploratur: quae reperitur, vbi humores actu
non mouentur, attamen cum potentia passiuia fluxiles sint,
ideo purgandi veniunt.

C

Conferet.



Mnibus autem cacochymia declaratis differentiis tum nihil actu, nec potentia,
fluxilibus, tum actu fluxionibus. Nunc ideo illam enucleare differentiam par-
est, in qua succi, et si actu non moueantur; attamen potentia moueri valent. Vn-
de purgandi sunt: At vero quoniam hi humores in duplici inueniuntur genere
vel cretini potentia passiuia mobiles quatenus concocti existit, vel ut erudi-
nino sunt, attamen cum tenues sint, fluxiles introspicuntur, unde facile educun-
tur: Cum itaque horum succorum ptimum genus in suas diuisas differentias cap. 3. & 4. expla-
nauimus. Proinde nunc aliud secundum genus enucleare deinceps. Ceterum quia genus id tres
continet differentias, cum hi succi aquosi, & biliosi, & ichorosi reperiantur; ideo eas tres se-
orsum distinctas differentias tribus capitulis dilucidare conabor. Primo namque serolos ut no-
bis notiores, postea biliosos, denique ichorosos patefaciam succos; qui omnes procul omni du-
bio absque vlla eorum preparatione statim purgandi veniunt, cum a morbi magnitudine cacochy-
mia praesente, vel incipiente, aut imminente haec horum humorum per se purgatio molienda
inducatur: Nam licet Galenus dixerit. Qui vero parte corporis quapiam firmata, in passiva sunt,
eos nec medicari, nec villo alio auxilio mouere oportet priusquam colli fuerint in morbi declinatione:
Attamen cum id de crudis vndique intenda succis, quos cap. 2. declarauimus, qui nedom actu,
at vero quoque potentia immobilis sunt, ac solutino pharmaco rebelles: non autem eos com-
prehendit, a me nunc enucleandos; qui ceu tenues facile pharmaco solueluo educuntur, in morbi
magni exordio, ut ait Galenus ac potissimum serosi, seu aquosi appellati educuntur, tum quia
exonerata ab eo puncte natura succi copiosi calorem naturalem grauante, eo magis ceterosque
humorum coctionem, & expulsionem ingredi valent, ut iam cap. 4. in 4. ratione ostensum est, tum
eo quia mutationes magnorum morborum, tum acutorum, tum chronicorum in melius sunt, an-
tequam morbi iam abgeant: ut eodem cap. 5. rationem iam diximus. Hipp. vero vltra melanco-
liam, quae sanguinis lutum, ac fex conspicitur, etiam aquam, ex potu nimio in corpore ortam,
liene attrahere afferunt. Vnde aqua sedem liene in quoque esse statuit: cuius aqua in liene
residentis Hippocrates ita meminit. In ventriculum, & vesicam repurgatio fieri solet. Haec autem
nisi fluida fuerint, & foras periolentur aquae de liene ad inferiores partes fertur, &c. Deinde inquit.
Idibus enim grauis est, & ex quo pauci euadunt. Aqua interius ex liene, &c. Hanc aquam vero ad

Obiectis op-
portet.

Lieneque bilis
rebus de vtero,
aff. a 74. & 171.
lieneque humo-
res Hipp. lib.
de hum. p. 1.
de a. v. 1. & 11.
de hum. p. 1.
de a. v. 1. & 11.
de hum. p. 1.
de a. v. 1. & 11.
de hum. p. 1.
de a. v. 1. & 11.

D

6. Aph. 1. & 2.
de viciat. 10. m.
1. 1. & 2. aph.
27. & 2. aph.
10. 11. & 12.
6. Epid. c. 1. com. 1.

Gal. com. 2. aph.
27. & 2. aph.
com. 2. & 11. 3.
2. de viciat. 10. m.
1. 1. & 2. aph.
27. & 2. aph.
10. 11. & 12.
6. Epid. c. 1. com. 1.

6. De morbi p.
505. & 506.De intern. a. 16.
569.

p. 11. c. 1.

A principio sine ulla preparatione euacuat. Itane ita habentem per exordia curato. Veratrum supra exhibito, infra verò enoro, hyppophaes succo, aut grano cnidio, & lacte asinino ad heminas octo melle affuso. De aqua verò intercutere, licet non islo ex aqua pluviali stataria copiosissime epoca, ætatis tempore ex longo via itenere exorta sempiternis monumentis medicinalibus profuit. Hinc cum sic habuerit, enorum quidem sexto die, hyppophaes verò succum octavo, & granum cnidium decimo. Hic autem tria, notatu digna exploratum habes. Primo circa exordia ea aqua celeriter educenda proutquam ea aqua hepar viciat, ad aliam novam aquam gignendam. Ideo purgat ter, ac per secessum, cum dixerit alibi. *Aqua inter entem laboranti, qua in venit est ad alium erumpente, soluitur morbus.* Ideoque per rectam naturæ operationem a sexto ad decimum diem, ter deorsum purgat. Secundo autem perpende, hydropem morbum quidem magnum penitus, penitrolque, cacochymum chronicum esse. Vnde in eo etiam vigesimo die exordia habentur, sicuti in acutis simpliciter vsque ad quartum diem initia existunt. Verum aqua ista ne dum purgantibus medicamentis educenda. Verum etiam cum fucus fluxilis sit, ventris perforatione, ac pudendorum, ac femorum incisione vacuatur; Sed Oribasius etiam hanc veritatem affirmat. *Siquidem inter initia morbi, tenues, & aquosus humores euacuabis. Vbi crassius, ac tenaces fuerint, quales suapte natura sunt pituita, & nigra bilis, concoctionem expellabis.* Et alio in loco habetur. *Es crudus quidem, ac tenues a principio morborum euacuare oportet. Expectare verò oportet concoctionem in crassius, & glutinosius humoribus, sicuti est phlegma, & cholera nigra.* Quocirca ex ijs autoritatibus ne dum aquosi, verum etiam biliosi flauis in principio educendi sunt licet biliosi lenientibus tantum euacuandi sint nõ autem solutiuis, vt in differentia octaua videbo, cum bilis minera valde acutorum, ac vehementer magnorum morborum sit: in pituita verò, ac melancholia, & atra bile coctio expectanda, semper est; nisi dum in ventriculo fuerint, tunc enim educendi ita erudi sunt, vt in differentia 11. videbis. Verum isti iussus magis crudi etiam appellatur, quod grano cnidio sua natura igneo, & aeri purgatur, vt etiam ex Hippocrate dudum vidisti. In pulmone verò iacentes, ac in fæcijs ij tenues, & aquosi euacuari nequeunt nisi difficile ait Gal. Vnde perpetuo notam sequi, *sine in pulmone humores isti remaneant, sine euacuentur.* Cum probe euacuari nequeant a pulmone, neque per tussim, nec medicamento, nisi difficulter.

Primum: diuina
in dignum.Secundum: mor-
bendum.Tertium: cor-
poris digni.
Quibus.Humores i pul-
mone relictos
est vniuersi
fieri equi me-
dicamento ac-
quos.

CAPVT IX.

C Octaua cacochymiz differentia perpenditur: quæ reperitur quoties humores biliosi sint, sua potentia passiuæ mobiles, sine præparatione euacuabiles.



Nedum aquosus quidem humores, verum etiam bilem flauam, sua tenuitate, & fluxilitate circa morborum exordia, nulla coctione expectata purgandos esse, iam satis demonstratum fuit, præcedenti capite: Cum itaque de aquosis iam vctam sententiam patefecerimus: Ideo superest, quod de biliosis, flauis doctrinam aperiamus. Quandoquidem Hippocrates, in morbis valde acutis, vehementerque in ignis, ait quod neutiquam valida solutiua cholagoga conueniunt, vt est leamoneon, vt cap. 4. & 6. vberissime offensum est. Sed in ardente febre, per vomitum bilem educit, & insulis per aluum, eam subducit: auxilio lactis asinini, quia ait. *Verum si ad hac non soluitur lacte asinino collo purgabis.* Cum medicamenta purgantia penitus actia, & calida sint, vt ait Galenus in commento: contentus erat Hippocrates lacte eo ventre leniente, eum ei lenientia tempore nostro in usu adhibita occulta fuissent. Vnde lacte eo, quoque refrigerabat, ac humectabat, atque bilis acrimonia, amaritudinem, ac tenuitatem obundeabat. Idem quoque Hippocrates fecit in pulmone tuberculo, inflammatione cum pure; cum dixit. *Lacte asinino collo aliquantulum purgato.* Neque medicamentum purgans in febre ardente cacochæ præbet, quæ in pulmone his inflammationis transire potest: *Aluum verò curanda, & si quidem, quæ in ea contentur non subleuat, subleuanda, & per insula quam frigidissima, vel quoniam, vel tertio quoque die refrigeranda.* Sicuti etiam in tertiana peracuta, & mali moris in quarto die facta agendum est, vt cap. 4. in seipso ex. m. p. lo in notatu: Medicamenta enim ignea non danda, ob vehementissimam febrem. Nā si in hydropse quoque sine febre, ad acrimoniam, & calorem medicamentorum solutiuentium cotrigendum lacte asinino ad heminas octo melle affuso vltus fuerit, vt capite præc. diam vidisti, vbi affectus frigidus erat: ergo longe eo magis vbi calor igneus vehementissimus, & medicamentis ijs igneis nos caute tenemus: Ideoque in lateris dolore vehementer in igno, valdeq; acuto, vt alibi iam statuerit, tantum enzimatis contentus fuit: Cum exararit. *Ventrem verò subducite, ac refrigerante clystere eluere oportet: hoc enim omni morbo conuenientissimum est.* De valde autem acuta, ac vehementer magna febre tertiana etiam ait. *Aestas hæc contingunt febres vehementes, & sitis detinet, quidam bilem vomitione reiciunt, quibusdam etiam per inferiora secedit. Quibus quodcumque*

Coracæ,
Galcanæ.Hipp. in morbis
valde acutis, ve-
hementibus, ma-
gnam refrigeran-
tiam, & humec-
tationem solum
corpus, & bilis
vacuanda, ut ad
bilis acrimonia
victoria amari-
tudinem ac veni-
tatem, & lenita-
tem obtineat. In
fæcijs
est illi vlti-
moque mian-
te præbet.In hydropse ad
medicamentis
acrimoniam, & li-
gorem con-
suetudinis ad
reducendam
vlti-
moque mian-
te præbet.Idem.
Rodem II. 570.Cours presen.
461. p. 159.De intern. affe.
p. 168.Li. Gal. de mor-
bis de ijs, quæ
purgare oportet
28. F.Galienus.
De dynam.
diu. cap. 4. 10. D.De dynam.
diu. 1. 3. F.
De epid. rom. 1.
tem. 17. ac 1. 46
vlti. ac 1. 216.
et 217.De vlt. m. in
m. acutis in fi-
ne.De vlt. m. in
m. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
& 1. 1. 1. 1. 1. 1.
& 1. 1. 1. 1. 1. 1.
De vlt. m. in
m. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
T. 3.De intern. affe.
511. & 512.
De efflu. p. 40.
511.De morbis
466.De intern. affe.
511. & 512.De vlt. m. in
m. acutis.
& Aph. 10.
De vlt. m. in
m. acutis.
511. & 512.

C A P V T X.

Nona cacochymiz differentia declaratur.



Vpereff autem quod fucos ichorosos explanemus, vt c.8. propofuimus. Cum etenim omnis humor noſtræ ſanguineæ maſſæ ſuum ichorem, quem ſerū quoque, atque ſaniem vocant, poſſideat, qui vtiq; eius pars tenuior mobilior, fluxiliorque habetur: Qui ſanè ichores excrementa deteriora perpetuò exiſtunt. Ideò, vt ait Galenus ex Hippocratis decreto, corpora noſtra ſemper ab ijs ichoribus prauis liberari debent: Quoniam nō ſolum nihil nutrire valent, vt acres, & omnino prauī: Verum etiam praua ſymptomata efficiunt. Tametiſi ſanguinis ichor eate-
 B rorum omnium ichorum miſtiſſimus ſit. Pituitæ autem naturalisque dulcis ichor parum infeſtus ſe habet: timiditatem nanque parit: ac torporem, ob eius frigiditatem: ſi verò pituitæ falſæ, aut acidæ fuerit, tunc ſanè, & vigiliam, & animi perturbacionem, ſeu motū cum terrore, ob eius malignitatem, efficiere valet, ait Galenus: Ichor verò vitreæ pituitæ, quā Paſagoras crudum ſuo-
 cum appellauit: pauorem ſolum, torporem, ac frigus efficiere poteſt: Flauiæ autem bilis ichor valde infeſtus, ac prauus eſt: At veto longè infeſtiſſimus ætæ bilis ichor eſt, pro vt illi acres, mordaces, ac erodētes ſint. Iſti verò acerrimi, ac erodeutiſſimi: Vnde licet ambo vigilias, ac animi per-
 turbarionem, ac motum cum terrore, vt maligni, efficiant, & mæſtitiā, ac timorem: Neenon-
 delirium, & phrenicidem, & furorē: Nihilominus vehementiora ſymptomata ætæ bilis ichor producit, quā flauiæ bilis ichor facit. Pende autem quod, etſi ad eutim poſſiſſimum tenuis
 C peruenerit poſſint humores, & eroſionem ellicere valent. Præterea, ac tumores efficiere poſſunt, ijs enim à partibus exſecatis, attractis, doloꝛes acutos excitant, à quibus poſtea vehemēter at-
 trahuntur humores, vt cap.6. iam dictum eſt. Attamen Galenus, v. antea dixi, ex Hippocratis decreto, eos conſiderauit in relatione ad affectiones magnas, quas in capite gignunt, cum ij le-
 uenientium, quibus utebatur Hippocrates, vt cap.9. iam dixi: ſecurius quidem lenientia hoc quo
 noſtro uſurpata, pro ijs ichoribus educendis inueniuntur adminiſtranda. Verū ſi eopioſi fue-
 rint ichores præſertim acres, mordaces, ſimulque vlceroſi, non correſpondēque à pituita naturali, vel
 à vitrea, vt ab eorum freno, tunc ſanè epicerauſticis, à Galeno appellatis, vbi de lacte egit, con-
 temperandi in craſſandique ſunt, & obtundendi. Nam Hippocrates vbi interdum verò ex cruri-
 bus vlcera erumpunt, & hæc quidem ſaneſcunt, alia verò exoriuntur, color niger eſt, entis tenuis, &c.
 Dato etiam ad purgationem per inferiora lactis aſinui cocti beminas octo melle aſſuſo. Lac bubulum,
 ſi tempus ſerat, quadrageſima diebus mane quoque lactis bubuli beminas duas bibat, tertia aqua miſſa
 parte etiam inter poſitis diebus ammiſta. Ibi enim ad tenues, acres, mordacesque, ac vlceroſos ſu-
 cos attrahibiles educendos, contemperandos, nec non pro refrigerando, ac humectando toto cor-
 pore, ac hepar, ne amplius regnaret hunc humorem vlceroſum immo probum ſanguinem, eam
 eurationem inſtituit. Vetiſſimam Gal. alijs in locis Hippoc. adnotauit. Cæterum eandem eura-
 tionem obſeruare cenemus in humoribus rectè curandis, quorum cum Hippocrates meminerit,
 ait. Et quibus quidem acuti, acres, & ſeruginofi humores inflant, qui nam ſurores, & vlcera thoracis
 lancinationes, animique abiectio inde oriuntur, neque prius hæc quieſcant, quā ematiati, deſecti, &
 alijs permixti ſuerint, tametiſi multis, varijsque modis concoqui permittari, tenuari, & in humorum
 naturam craſſeſcere poſſunt. Idē in illis & indicationes, & temporum numeri magnū pondus ha-
 bere mihi videntur, ait Diuius ſenex. Verum pende per vomitum mordaces ſuccos, auxilio
 aque miſſæ abſtergentis educi poſſe: vt ait Hippocrates, etſi quandoque validiori medicamen-
 to etiam euacuari poſſint illi ſucci.

Cenemus
 humorum acuti-
 2. De com. med.
 5. lib. 7. & 8. de
 dec. Hippoc.

1. De diff. feb. a.
 10. & 2. de nat. 1.
 fac. cap. 9. & 6.
 epid. com. 2. c. 26.
 14. & 15. de de-
 cret. Hippoc. 5.
 1. De nat. fac. 9.
 & locis citatis
 2. De vic. in lib.
 10. de com. 44.
 6. Epid. cap. 3.
 com. 14.

Thidem.
 4. De uen. ſan. 6. 4.
 6. Epid. 3. c. 26.
 14. & 15. epid.
 com. 2. c. 26. 74.
 1. Idem locis.
 1. Idem locis.
 4. epid. com. 3.
 com. 15.
 4. De uen. ſan. 6.
 4. & 5. de nat. bi-
 le. 1. & 2. de com.
 ſu. ſu. med. 1.
 4. 4. 4. 4. 4. 4.
 4. De vic. in lib.
 10. de com. 44. 74.
 6. Epid. cap. 3. 14.

3. De ſim. med.
 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 2. De uen. ſan. 6.
 4. 4. 4. 4. 4. 4.

4. De uen. ſan. 6.
 4. 4. 4. 4. 4. 4.
 4. De uen. ſan. 6.
 4. 4. 4. 4. 4. 4.
 4. De uen. ſan. 6.
 4. 4. 4. 4. 4. 4.

2. De vic. in lib.
 10. de com. 44.
 6. Epid. cap. 3. 14.

C A P V T X I.

Decima humorum differentia pateſcit, quæ potentia paſſiua mobilis eſt, auxilio detergentium præſidiarum miſtiſſimè educenda.



In moribus tenuibus in valde, ac vehemēter magnis morbis, exiſtentiſſimis: alium ſubducenibus remedijs, purgandis tractatione iam expedita: Super eſt ergo opus aliorum humorum, qui pituitoſi aſunt, per cruditatis modum à ventriculi viciata chyliſicatione, exorti: in primis quidem veris, meſentereo, pæcreo, & circa hepar, & circa lienem ſubiacentibus partibus exiſtentes, doctrinam aperimus. Quoniam eorum humorum ſanè, qui frigidi, humidi, craſſi, ac lentī habentur, circa initia nedum intentione vti que cadit moderatiſſimè calefaciendi, ſiccandi, tenuandi, ac inel-
 dendi,

Cenemus.

4. De uen. ſan. 6.
 4. 4. 4. 4. 4. 4.
 4. De uen. ſan. 6.
 4. 4. 4. 4. 4. 4.

Galienus.

admittunt, sed in se retinent, quoad ex ipsis aliquid per locum vacatur, nempe quousque topica id est loca ad euacuandum prius tamen universi corporis curatione praemissa. Quae sane euacuatio per digestionem, ac vaporacionem cutaneam per meatus insensibiles & c. eorum Grace Diaporesin vocant, fieri debet. Medicamentis calidioribus blandis, ac discutientibus, digerentibus, ac per halitum euacuandis, diaphoreticis appellatis a Galeno, pro quo recte executioni mandandum, quatuor capita conscripsit: de emplastris Diaphoreticis: primo ex sua lenitate, postea Andromachi diaphoretica: Tertio Asclepiadis Diaphoretica: tandem Asclepiadis discutientia posuit: Sunt etiam alia plura medicamenta opima utique, ad educendos eos corruptos succos: Verum de ipsis dicam alio opere ubi de crudis et acris rebus curandis verba faciam. Cum verum institutum, hic sit, de purgatione totius corporis aluina praesertim, ac vomitiua purgatione administranda succorum, qui iam corrupti vel omnino sint, ut de ipsis iam dudum dictum est: vel semicorrupti sint: vel in via ad corruptionem, ut in febribus putridis: de primis iam dictum est ex Gal. quod eos euacuare potissimum oportet per aluum, ac vomitum: tamen si quoque per alias postea educant vias, ad quas natura sua facilitate expulserit inclinet, & pro ut humor corruptus in parte affecta prorsus familiarem habeat aliquam viam: Cum exararit in febre continetur. Ergo de corporibus, quae sic efficiuntur expellenda, quae putrescent per urinas, & aluum, & sudorem sunt, quod si ad ea venierit aliquando sua sponte impetum capiant, etiam per vomitiones. Quocirca ad expurgandum putridum hunc humorem admodum loci obnoxii eo putrido succo dignotio confert: si namque in hepatis gibba parte in venulis humor putrescit: per vinum educi possit: si in ictericis parte caua, per aluum ex purgandi sunt, cum per eam viam, cum per vicinioris sympathiam contineat pars ea purganda. Si vero humor ille putridus in sinu venarum fuerit, per vinum viam egrediendi habet. Quoties vero in universo corpore, per sudorem facile egressum obtinet. Nihilominus succos praeuos, putridosque habentibus commune quidem auxilium est, si semper alui deestio, maximeque in febribus putridis, in principio perasta. Quandoque vero etiam euomito. Ceterum amabo mihi deat isthaec omnia penitus, et acris studio retinere. Prae res illi enim est corruptio eius, quae in uno quoque humido propria, & secundum naturam caliditatis, ab altera caliditate, hac autem est quae ambientis. Unde putredinis causa materiali humiditas exciementia quidem est, causa vero efficiens calor & externus, cum Aristotelis, cum Galeni sententia: hinc ait Galenus ipse. Promptissime enim putrescunt quaecunque calida, & humida, nisi diffusi similes, ac refrigerari conigeris. Proinde iuxta meritum inquit Aristoteles. Sanguis, & quae sanguinea sunt facile putrent, ut ea, quae calida, & humida temperata sunt. Tribus autem modis putrefactionem effici per est, tum quod phlegmone omnis per inflammationis, tum effusionisque modum fit, hinc etiam hoc modo putredo exoritur: Tumque incalescit, & perspirant prohibita, putrescent dum fuligines introclusae ignescunt, Unde putredo fit: Neque enim ea sola, quae incalescit, & perspirant in prohibita putrescunt, verum celerrime ea maximeque ceterum putrescunt, & alia multa, quae putredini sunt opportuna. Ut sunt ea, quae sine prohibita transpiratione, a calido extraneo utente valde evaporare faciente, ignescunt, dum eorum humiditas suavis, & exhalabilis, euaporatur, manente combusto, ut in cinere est videre, ut alibi iam dixi Aristoteles mente. Verum hic, ceteri de his omnibus tribus generibus putredinis educendae intelligatur, ut cacochymia omnis horum trium generum morbi cacochymia magnitudinem efficiens, ac indicata, ex purganda sit, attamen potissimum de secundo, ac postea de primo genere agitur: In quibus putredo, & corruptio humorum cum febre facta semper adest: Quorum Galenus meminit hoc modo: quae inter inguinas, & alas sunt, & putrescunt in ipsis, ut febribus assiduis congerit: & similes putredini, quae in inflammationibus fit, & abscessibus, & alijs phymatis ubi fit putredo in porofita tibus, vel in artibus, ac denuo aut. Possum vero & sine phlegmone in ipsis vasis humoris aliqui putrescere: respiciens vero hanc putredinem ad febrem intermittentem comparatur, inquit idque est in una particula, animalis in finibus ipsorum valorum impellitur, in oculis enim venarum insit: sicut putrescere incipiunt, ac extra ipsa oscula putrescere desinunt, dum in cinerulentum succum vertuntur, ac vel fuliginosus, ac fumidus exhalatur. Postea vero eam putredinem ad febrem continuam relatum accipiendo, exarar, aut etiam in totis valorum capacitatibus, quae inter bubones, id est inguinas, & alas sunt comprehensae. Vt utique vero putredo in calore igneo ac praeternaturali pungente, simulque erodente consistit, cum talis calor febrium putridarum effluat: siquidem primo cordi inhaeret, deinde toti corpori diffunditur: Verum quomodo in utroque duorum istorum putredinis generum, calor is fuliginosus, ac fumidus ad cor perueniat, dilucidat Galenus Diffidens febres ex bubone ab his, quae ex putredine humorum consistunt, quae fit aut in aliquo viscere, aut in eam, ac maxime iussu, subinde vero quoniam modo calor is a bubone ad cor deveniat, docet quoniam ubi febris ex bubone consistit, pars continua semper calefit, & calor quidem visque ad ipsum cor diffunditur: Ceterum putrida fuligo visque ad ipsum minimè peruenit, sed ibi manet circumscripta in bubonis loco, per rationem solum continuatum partium ad cor perueniente calore. Quomodo autem a bubone cordi calor fuliginis communicatur sine communicatione fuliginum, seu humoris, hoc exemplo explanat. Quo potissimum modo etiam per alium, ac per exercitacionem ex partibus primo calefactis, distributo ad ipsum principium vitale, nempe ad cor, fit. Et tandem modum, quo putredo

Ad expurgandum
fuerunt huius
diagnosim vel
de potius est.
Quando per viam
nam educenda
materia sit.
Quando per al-
uum.
Quando per su-
dorem.

Artificis.
Quando quid
sit.

Colorem.
Tribus modis
putredo fit.

Lib. de febris, de
febris & c.
Potissimum nunc
de putredine duo
bus generibus
dixi agitur.

Primo febris
ex inguine totius
ing. & c. & a-
la est.
Quando febris
intermittens
ubi sit.

Febres putridae
non efficiuntur
calore igneo per
modum naturae
propterea, eandem
causam interve-
niendo primo de-
bent tota corpo-
ri.

Quomodo calor
in febris cordi
inest ex putredine
in bubone.

A
1. De loc. affect.
c. 4.
11. Meth. c. 20.
11. pp. lib. 2. de
medic. c. 27.
2. De febr. mod.
c. 4. & 5.
per gen. c. 1. & 2.
14. & 15. & 16.

11. Meth. c. 20.
1. Aph. 17. & 4.
17. & 18. & 19.
17. & 18. & 19.
17. & 18. & 19.
11. Meth. c. 20.

B
11. Meth. mod.
11. Meth. c. 20.
11. Meth. c. 20.
11. Meth. c. 20.
11. Meth. c. 20.
11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.
11. Meth. c. 20.
11. Meth. c. 20.
11. Meth. c. 20.
11. Meth. c. 20.
11. Meth. c. 20.

C
11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

11. Meth. c. 20.

Tres diffren-
tia compos.

bi principio humores ij nihil eduſi ſint, nec venæ ſeſione, nec alui purgatione. Tertia autem A
diffrentia cõtingit ſæpius, etiam ſi in morbi magni exordio, his narratis præſidijs viſi fuerimus.
Verum à prima diffrentia morbi magnitudo cacochyma morbi curabilitas, cacochymia eduſione
molienda. A ſecunda vero diffrentia, magnitudo omnino morbiſera incurabilis; A tertia vero
diffrentia, magnitudo, curabilis difficile, & ambigua oritur. Aliæ autem tres diffrentiæ ex hu-
moribus putrefcentibus, à naturali ſtatu parum diſidentibus, conſurgunt eo, quia vel hi ſucci à
coſtrictæ vntate vincenre reguntur, vel ab ea viſta gubernari nequeunt, vel ambigunt, ac difficile
coquuntur. Quarta enim diffrentia oboicit, ſi pravi humores prius eduſi fuerint, mox ſere be-
nigni manſerint, quod per ſæpe eveniunt. Quinta diffrentia vero inſpicitur quoties aliquod
præſiſſimum ſymptoma, vel error externus admodum grauis contigerit, coſtrictæ viam proſi-
gans. Sexta vero diffrentia euenit, vbi vires naturaliter imbecillæ ſint, vnde licet ſucci putrefcen-
tes à naturali ſtatu non valde diſſent, attramen cum virtus coſtrixit vel imbecilla, anceps, ac diffi-
cile coquat, ex quo etiam hi ſucci rurfus generantur. A quarta vero cacochymia morbi magnitudo
cacochymia quidem facile curabilis emergit. A quinta vero diffrentia magnitudo incurabilis.
A ſexta autem diffrentia magnitudo fit diſſiculter curabilis, curatione epicraſtica. Sed aliæ tres
pariter diffrentiæ ex ſuccis putridis medio quodam modo inter toto præter naturam genere exi-
ſtentes, & à ſtatu naturali parum recedentes ſuccos; quia ſeptima diffrentia habetur, dū hi ſuc-
ci à virtute coſtricti ſuperante reguntur. Octava autem erit, quoties hi humores, à facultate coſtri-
ci prius proſtrata, non coquantur. Nona vero ſcietur, vbi hi ſucci, à vi coſtricti medio quodam
modo ſe habente, inter ſaculratem vincentem, & viſiam. A ſeptima autem diffrentia morbi ma-
gnitudo cacochymia curabilis exurgit. Ab octava autem incurabilis oritur magnitudo morbi. A
nona vero ambigua conſpicitur morbi magnitudo cacochymia. Quocirca humorum in venis, ac
teriſſique putrefcentium, hæ quindecim principales apparent diffrentiæ; ex quibus alie non prin-
cipales innumere ſcietur diffrentiæ. At vero duo notatu hic digna eſſe iuuenio, nimirum quod
cacochymiam, à magnitudine indicaram, euacuari, in affectionibus, quæ ex humoribus ſunt ſi per-
ſiſtula ſoli ſibi inferniat, auidæſter enacuas, hæ tamen conditione licet pro vt affectus ſuadebit magnâ
eduſionem agenda, ſed tamen etiam virtuti permittenti attentus, ſi vero pars morbi magnitu-
dine cacochymia leſa, non ſibi ſoli tantum, ſed alijs membris inferuiat, vt ventriculus, & hepar
ſunt, quæ duo officina ſunt alimentis cuiuſcuſque corporis partis nutriendæ; quæ à valida purga-
tione imbecillia redderentur, iacſua cuiuſlibet partis alendæ. Proinde blandè hæ viſcera purgâ-
da ſunt. Præterea aduerte poſt euacuationem vel ſeſta vena, vel ventris euacuatione molitum pri-
ſana eremor præbendus. Sed quoniam in prima putredinis, à Galeno poſita diffrentia, ſucci dum
putridi penitus eduſi ſunt, manent ſemiputridi, qui cutâdi ſunt, quomodo igitur id fieri debeat
nos docet Gal. ſic cum in viuentem corpore putredo concepitur, quod tum alterare, refrigerare, & be-
zoartibus ſiccantibus exſiccando, ſimulq; incidentibus, deterſoribus, & perſeuerantibus obſtructiones
adimendo poſſeſi, tum concuere calidi innati coquentem ſaculratem robuſtam reddendo, et al-
imentis optimi ſucci, faciliſ digeſſionis, & minimi excrementi, tum loci affecti roboratione, ſim-
ulq; eius caloris excitatione, tum utile reddere deparando aluinis ſubduſionibus leuioribus,
vel alijs putridorum coſcoctum, & adequatorum excretionibus congruis quicquid putrefcentium,
veluſi ſemiputrefcent, ſemialbumq; eſſi, vtiq; ſaculratem eius, quæ naturaliter concoquit, excreans, ſor-
mansq; quæ putrefcentia ſunt ſanabis. Ad eos autem ſuccos curandos etiam ea, quæ totum corpus
rareſciant ſunt, & febris ardentiffima, & colliſionis nota planè euidens, frigidam humini dare an-
dallæſt debebis: conſtat namq; talem ſenem non eſſe. Quo ſi etiam bona corporis habitudine ſi ſum ſtatu
eſſi calidus, & ſiccus, etiam ſi in frigidam actū uatationem hinc dimittas, handquaquam ledetur. Po-
ſſea in febre medioeri, & viribus non valdis, noſis tamen coſitionis apparentibus. At ſi medioeri
eſſi febris, & vires non valdæ ſed cum notis colliſionis, ſi, qui id ſe habent, balneum aque dulcis tepidū
prodeſt. & vini potio; tum vero ex uſſionibus, quæ rareſciant, idq; multo magis cum ambiens eſſi fri-
gidus. Neq; enim aut frigidam in balneo lotionem, aut frigidam potionem in cuiuſmodi calis ſtatu, & e.
Quam ſane ob rem dixerat corruptio humorum contemperamentum exigit. Ideo pro ſuccorū ſemip-
putridorum contemperaamento hæc omnia ſtatuit. Hipp. etiam in febre vehementer acuta, & ar-
denti cum dolore thoracis inflammatorio. Per initia cum ſie habueris iſ curandus eſt Betis aqua fri-
gida imbutis, et corpori adhibitis, corpus quidem refrigeratum, & cuncti præcipue dolore, aut liuæ aqua
frigida inuſſa. & aſperſa, & e. Verum balnea hæc ab Hippocrate adminiſtrata in morbi initio
fuerunt ad corpus rareſactum denſandum ſi vero pro refrigerando, ſen rareſaciendo, balnea,
ſeu vſſionibus aſſumantur, tunc ſolum in declinatione, corpore quæ toto expurgato, contempeunt;
vbi nos admonet, ea etiam vbi magnitudo febris obſtat ſicuti in continentiis, nec vino eſſi vrendum,
nec lauacro, uet ſi, quæ habitum rareſciant, uſſionibus, ſed aqua frigida, ſicuti prius diximus,
poſa in his febris eſſi aptiſſima, niſi tamen aliquid eorum quæ prædiſſa ſunt, hanc quoque prohi-
beat.

Quarta diffren-
tia compoſita.
Quinta diffren-
tia compoſita.
Sexta diffren-
tia.

Septima diffren-
tia.
Octava diffren-
tia.
Nona diffren-
tia.

Venerunt & p-
terea non putre-
ſcentia quide-
que diſſerunt.
Filius non an-
dum
Vbi valde & vbi
habet purgen-
dam an petitis
humoribus.
a. De vnt ut in
ma xjo. & vbi
de ſ. ſe ſim, me-
ſe ead
Vnt diffren-
tia ſucci ſem-
putridi curatio.
Humorum ab-
ſentis.
Adequatio ab
Ant.
Coſſio à Nam-
re.
Depoſitio.

Totus corporis
transpiratio
ſuſcepta, et
balneo aut ſi
cui admodum ſi
ſed ſi agreda.
In febre arden-
tiſſima frigida
non potio, non
amplius ad po-
tationem.
In febre medio-
eri frigida ſtatu
ſi non concu-
erit, ſed rare-
ſciantia.

Galienus.

7. Meth. c. 11.

C
et. Meth. c. 9.

ibidem.

ibidem.

ibidem.

D

Con. 6. q. 47.

De inuſſa eſſi.
114.

21. Meth. c. 10.
& 11. Meth. c. 9.

A *beat.* Hæc autem pro Cacochymia putrida morbi magnitudinem gignente educenda, seu tollenda, satis dixisse volo.

CAPVT XIV.

Numquid in acuti, & magni morbi incremento vniuersali leue leniens exhibere debeat.



Petrem maximum quidem dubium mihi fuisse; An in acutorum vniuersali incremento morborum, pro minorandis putridis humoribus, exhibere conueniat lenius leue refrigerans. Quandoquidem ex vna parte video: Medicos Primates hic Venetijs optimo cum agrotantium euentu, tali tempore, vbi symptomata sæuia, vehementiaq; sunt, in morbis acutis, ac magnis, sferuntq; in febre cacothæ, agrotantibus leniens leuissimū ex draem. 3. aut 4. flor. cal. nou. extrahē addita 3 i. pulpæ tamarindorū cum sem. citri serup. i. præbet, & tēpore declinationis accessiois, vt eius opus remissionis tēpore, priusq; noua superueniat accessio, efficit, & talē alimentum quoq; dare voluit: Ac ita dicunt ad primas vias ab excrementis liberandas: Ac ita tūc, & leniēte veniunt, cū materia in ebullitione inter inguinas, & alas, iū in agnis venis putrefcēs motu suo, ad vniuersū corporis habitū, ac ambiū accedere p cutē inclinauerit, in papularū. seu exanthematum efflorescentiū forma scædens. Tamet si rōnabiliter dici possit in casu tali humores, q; ad venis magnis mouētur, ac ad cutē puenierint, si rursus retrocesserint, ac introcesserint ad venas magnas, tūc procul omni dubio recrudescerēt, ac impedimento essent motus naturæ indicatorij criticij, qui talis sæpē, est, quatenus a profundo, ad altū, & a parribus nobilioribus ad cutē de fectū, ac inguiliore sit: Vnde quoq; enigmata acria tūc ad mouenda nō videntur, ibi. n. tanē lanatiū clysmi cōgrui apparēt.

Ex alia vero parte, plures rōnes in oppositum vidisti c. 7. istius libri; Vt q; et Gal. in augmento vniuersali præter cæteras rationes allatas, ait, quia vis animalis maxima ex parte eo tempore vigoris seu augmenti prope vigorem defaigata est, cū foris essent vitalis, & naturalis.

Medici Veneti in morbo cum acutorum augmento leuia lenientia præbent.

Nonnulli tamen vultu lenientia, quæ efficit profectum.

Re. reddere & iterum malum fieri in Hippo. de fr. 1. & 2. & 3. & 4. & 5. & 6. & 7. & 8. & 9. & 10. & 11. & 12. & 13. & 14. & 15. & 16. & 17. & 18. & 19. & 20. & 21. & 22. & 23. & 24. & 25. & 26. & 27. & 28. & 29. & 30. & 31. & 32. & 33. & 34. & 35. & 36. & 37. & 38. & 39. & 40. & 41. & 42. & 43. & 44. & 45. & 46. & 47. & 48. & 49. & 50. & 51. & 52. & 53. & 54. & 55. & 56. & 57. & 58. & 59. & 60. & 61. & 62. & 63. & 64. & 65. & 66. & 67. & 68. & 69. & 70. & 71. & 72. & 73. & 74. & 75. & 76. & 77. & 78. & 79. & 80. & 81. & 82. & 83. & 84. & 85. & 86. & 87. & 88. & 89. & 90. & 91. & 92. & 93. & 94. & 95. & 96. & 97. & 98. & 99. & 100.

In morbis acutis & magnis ac per humoris biliosi, seu atri agniti, sanguis ichonides rōne dicit, ac, efficit, & per se so cū est ceteris biliosis.

Secundum sententiam Hippocratis in feb. putrida cū in agnis venis putrefcēs motu suo, ad vniuersū corporis habitū, ac ambiū accedere p cutē inclinauerit, in papularū. seu exanthematum efflorescentiū forma scædens. Tamet si rōnabiliter dici possit in casu tali humores, q; ad venis magnis mouētur, ac ad cutē puenierint, si rursus retrocesserint, ac introcesserint ad venas magnas, tūc procul omni dubio recrudescerēt, ac impedimento essent motus naturæ indicatorij criticij, qui talis sæpē, est, quatenus a profundo, ad altū, & a parribus nobilioribus ad cutē de fectū, ac inguiliore sit: Vnde quoq; enigmata acria tūc ad mouenda nō videntur, ibi. n. tanē lanatiū clysmi cōgrui apparēt.

Ex alia vero parte, plures rōnes in oppositum vidisti c. 7. istius libri; Vt q; et Gal. in augmento vniuersali præter cæteras rationes allatas, ait, quia vis animalis maxima ex parte eo tempore vigoris seu augmenti prope vigorem defaigata est, cū foris essent vitalis, & naturalis.

Cin. hanc in feb. putrida cū in agnis venis putrefcēs motu suo, ad vniuersū corporis habitū, ac ambiū accedere p cutē inclinauerit, in papularū. seu exanthematum efflorescentiū forma scædens. Tamet si rōnabiliter dici possit in casu tali humores, q; ad venis magnis mouētur, ac ad cutē puenierint, si rursus retrocesserint, ac introcesserint ad venas magnas, tūc procul omni dubio recrudescerēt, ac impedimento essent motus naturæ indicatorij criticij, qui talis sæpē, est, quatenus a profundo, ad altū, & a parribus nobilioribus ad cutē de fectū, ac inguiliore sit: Vnde quoq; enigmata acria tūc ad mouenda nō videntur, ibi. n. tanē lanatiū clysmi cōgrui apparēt.

Ex alia vero parte, plures rōnes in oppositum vidisti c. 7. istius libri; Vt q; et Gal. in augmento vniuersali præter cæteras rationes allatas, ait, quia vis animalis maxima ex parte eo tempore vigoris seu augmenti prope vigorem defaigata est, cū foris essent vitalis, & naturalis.

CAPVT XV.

Dubium a'latum dilucidatur ac soluitur, ex Hippocrate.



Pro istius aut ardui quæ maximè dubij solutione. Primo aduocato, in febre acuta, ac magna putrida, maliq; moris q; non modo humor biliosus acuitatis rōne, vt prædominans est, verum et vbi sanguis ichonides excrementosus est, ac, mordax, ac effrenis, præuat, ac tenem humiditatem mordacē, & erodentē continens, qui in valculis sanguinarijs existens cum terrore perturbatos, vigiles, delirantes, phreneticos, & furiosos ægros, iæm q; timidos efficit. Insuper perpende, q; in tali febre putredinali, humor penitus putrefactus, ac in cinerem conuersus, si in corpore copiosus ex pluribus accessioibus genitus fuerit collectus, nonā putredinē, seu nouū calorem putredinalem, ac febrilē, & ingentē producere valet, quatenus causa efficiens est putrefactiua alterius humoris putreficibilis, vt ex ijs Gal. verbis elicio. Sed si non antea natura quodammodò excreat veluti cinerem vehementer asiatorum humorū hic permanens in corpore, & calefactus putrem quædam recipit affectionem, idq; quates ei accidit feruendo exeat febrem, a qua rursus exiūte sudore pariter eum co, quod feruit attrahit bilis euacuat: tum rursus alia reliqua feruente, rursus alterā excitant febrē. Per atram bilē. n. putridum sanguinem vñā eum bile, & putrida putrefactum, ac in atrā bilem, non aut in pus cinerulentum conuersū quæ tandem omnino putrefacta veluti pus sit intendit. Putridi. n. humores in cinerem vertuntur, ait Gal. quæ cinis est in partibus vero inflammatis pus est in ipsis aut sedimentum urinae, & ait et, non modò per sudorem eā euacuari, vt iam dixi: cum per insensibiles habitus et euacuatur, inquit. Atq; hic vigor excessiuus, vbi fuliginosum excrementum.

Dexpiratione, & contractione arteriarū natura expellit: quod verò est veluti eueritū non perinde, quia rāsum est pōt excreare, sed per insignes quosdā meatus educit: cum et dixerit feruentibus ex putredine humoribus a caliditate extenuatis, eorundem substantia, cum febres consistunt, atq; declinant in ambientem aerem dissipari, superfluitas aut vel exigua admodū remanet, vel nulla in arteriis quidem humoribus pæua, in feruoribus aut nulla. In quacūq; igitur febre mali moris, vbi in massa humoralī est putredine, necesse est q; putridi humores, cū in cinerē conuersi, gignantur qui sanē quoq; acres, & mordaces, & vñā naturæ summa providentia ad ventriculum, transmittuntur, plūsq; diebus imparibus, ex Hippocratica doctrina: cum habeantur hæc verba Humor. n. in ægrotantibus corpore magis imparibus diebus conuertitur, vñā cum corpus ad ventrē humiditātē putrefactā transfuit. Per ventrē aut ventriculi rōtionē, & intestina intelligit. Hinc imparibus diebus magis incerta natura est, maiore quantitate illius humiditatis, iam motæ, ad ventriculum transmittere: Idcoq; diebus imparibus Antic cathartica ex hūbdo, & gress interfectebat: Cur aut ad ventriculū maior quantitas putrefacti humoris, a natura transmittitur, quidem est, cū ventriculus omnī euacuationem vniuersalium corporis nostri terminis, & cloaca fit propē vmbilicū, quē in corporis medio loco statuat, & a quo, ad oēs partes alimētū fert: hinc et facillimē oēs ventriculū, seu ventriculus lædit: Ad rā. n. parē cinis transmissa nature providetia, vt subinde facillimē, cū a termino euacuationis, educi valeat, nisi a natura ipsa, salte ab arte: Qd aut ventriculus, & prima ille quidē via terminis omnī euacuationē fit, iā patet, tū fit euacuatio vomitib, molib, tū et deiectionib, ac idco a natura illa humiditas corrupta, ad eā

12. Meth. c. 19.

4. De viciis in
m. m. a. c. c. 8. a.
de morbis ad.
4. De viciis in
m. m. a. c. c. 8. a.
L. h. a. i. a. d. 1. c. 1.
179.
L. b. Simpli-
c. 4.

Lib. c. 67.
L. b. de Simplici
buc. c. 12.

3. De Simp. med.
fina. 12. 11. &
24.

Idem ait Ma-
thaeolum.

3. De Simp. med.
fina. 12. 11. &
24.

3. De viciis in
m. m. a. c. c. 8. a.
3. a. & de viciis
221. 11. m. a. c. c. 8. a.
7.
4. Meth. c. 4.

3. a. Meth. c. 19.
4. De viciis in
m. m. a. c. c. 8. a.
179.

4. De viciis in
m. m. a. c. c. 8. a.
179.

4. De viciis in
m. m. a. c. c. 8. a.
179.

A tium, pabea in quantitate exhibitum etiam alterantium euadet, in corpore diu merando. Tandem sanguinis ichoroidis, tum vaporum omnium, fumorum, & fuliginum reuulsio in hac caput tuendum Ideo Gal. Monumentis medicinalibus has literas consignauit *ostendit fluxilitas ijs quidem, quae per sedem excreni habent, mulla, & cibis ijs, qui ventrem molliunt, pharmacisque modice proritare possunt, quae enim acriori vi sunt, vitare oportet. Quae de strina, ut inuenio, Hipp. est: qui et inquit. Quae ventri expurgando exhibiturus sis, ea cum mulla propinabis. Nā quid aut castia cas cunctas conditiones, sua insita natura obteget, si ad autorum sententiam, qui huius medicamentis virtutes exararunt, confugiamus, id inuenire possumus: Auicennas etenim, de ipsa hac verba reliquit, est lenis aima ventris, & educit cholera ad usum, & phlegma, & soluit sine nocumto, & absq; mordicatione ad co, quid ipsa est conueniens praegnantibus, & soluit cas. Melues idē scripsit elemēt, & innoxie ad ventriculo bile, & pituita purgat, sine nocumto, & excessu, & aet. n. mordicatione. Idēq; Mattheolus est lenitua, nec eius virtus vltra stomachū transit. Quocirca a tantū stomachū purgat. Idem quoq; Serapio de castia, q̄ vocauit Eiaxamber, scripsit tum, ex sua mente, tum ex Rasis sententia, cum itaq; fine euidenti mordicatione, sineq; recessu, & absq; vilo nocumto, ita ventriculi regionem elementer leniendo mundificet, vt ipsa sit de tarde, & achiliter solutio- nē facientibus, propter quod miscenda cū ea sunt quada ex rebz acuitatē habentibus, sicuti achae, & hyssopus. Hinc procul omni dubio nullascens alias cruditates in vena cana existētes, seu in parti- bus solidis, aut in specie carnosā, agitare, aut mouere valet, & eō minūs id efficere pōt, quod ē sēper in febribus propofitis, tēpore augmenti vehementis vniuersalis 31. pulpez ramarindorū, aut Mirabol. citrinorum admiscendū: quorum virtus adstringens adhuc ē tardior, et leuiores cas- siae vim leniciam reddit; castiaq; exhibita, in minima quantitate praestitum, cū rone magis alte- ratiua fiat, q̄ leniciua; & licet Auicē. dixerit, Mundificat, & conseruā sterilitis, & dolori hepatis, tamē de iccicoris cauō tantum intelligitur, cui annectitur chylis felca, quae de ventriculi regio- ne est. Vim autem temperatiuam habet calidorū, & mordacium in acūis qualitatibus tem- peratissima cum sit, ad calidum vergens, & humida in primo gradu, et asae substantia, & oleosa; hinc in ignem prociētia veluti oleum exardet, talis. n. natura epicaerastica habetur; refrigeratq; castia comparatiuē, non aut positiuē, nec per se, hinc clarificatiua sanguinis, sed aima acuitatis eius, & cholera rubra, febribus inde ortis conseruā sanguinē hac ratione puriori reddit, ac eius sanguinis, & bilis flaua acrimonia frangit, resoluūt thoracis, et pulmonis, & aspera arteria phlegmones, easq; partes lenit, hāimq; sedat, & interperiemq; renū calidā tantū mitigat. Hinc a capite et repellit acres vapores, fumos, & fuligines, q̄ fortassis quoq; vnc. 3. Syrupi violati sol. cū 31. pulpez tamar. dissolutē cū aqua borrag. effusce possunt, vt expertum sum pluris: Verū. n. verō negandum nō ē, castia leniē- tē & syr. viol. solutiū vim aliu subducendi possidere, eo quodā, etsi minimā acrimoniā, mor- dacitatem sibi in sitam, cū omnia, aliu subducencia talia sint, non nisi quatenus facultatē expul- trices irritant, siue subacria, seu submordacia, vel subnitrofa, aut subfalsa fuerint, vt aperitissimē nos docuit Gal. Brastice namq; decoctum, & lenis ob acrimoniā, ius vetō Galli veteris ob nitro- sitatem; siuecū aut ostreaceae ob falfedine, alium mouere possunt, ait Gal. libidē: Quocirca Hipp. & Gal. mel talem vim continere ob acredine, melli connexam, asseuerarunt. Nā ait Gal. quod acere & flatusque exilit in melli est substantia: celsa aut aqua mella tum flatu caret, tum flatu nacta: di- stribuitur: ut q. melius, quā per intestina descendat, & alium moneat, vt eruda aqua nulla facere pōt, vt ē 12. meth. c. 3. dixit. Hinc si mellificatorem, hidromeliū, & apomeli, & sacharum eiusdē virtu- tis apomeli exilitens a Gal. posita ventrem subduxerit; hoc vtiq; tātum, ob acredinem eorum, et si dulcia principaliter sint. Ergo ē in castia dulci negare non possumus quandam subacrimo- niā adesse, quā ventrem subducere valet iūttamen ita mitis ea acrimoniā reperitur, vt nullā vim humorū crudorū agitatiuam (sicuti ē mel, & sacharum) habeat: Vnde et iō castia in proposito aff. ctu exhiberi pōt. Nā etsi parū subacris sit qualitate: attamen substantia sua epicaerastica, & humida habetur. Idēq; ait Gal. mullam mīcē proritare posse: ideo mīcē quoq; aliu subducere, & alia mulla similia ex Hip. mētre, vt diudum ē diximus. Speculor aut, cum Gal. ex Hipp. sententia a de la. c. 3. dixerit laxare carnē, & molliē tūtu reddere, quod aliud ē, quā solvere, quā colligata, & coacta suere: hanc medicamenta purgantia, vel solutiua, seu lenientia, laxatiua ventris quoq; ap- pellantur ergo medicamenta ventri subducencia laxatiua in molliendo ventre, & humefiādo, agunt; non aut acrimonia, seu mordacitate, vel falfedine, aut mordacitate expultrice facultatē proritando. Ac id asseuerare valeo, quia Hip. ait lacte asinino cocto ad ventrē solutū in causae- re vrebatur: & Gal. in com. iac. ad ep̄nīmū humiditātē aliu subducere. Ergo falfum est oia, alium subducencia esse debere vel acria, seu mordacia, vel nitrofa, seu falsa. Cui quidem respon- det, imō id verissimum, nō aut falfum esse: nam laxare non ē molliē, sed est carnē mollem reddere secundum suum statum naturalem, id euacuādo; hoc vtiq; tātum, ob acredinem eorum, per frī- ctiones euacuatiuas id attingere possumus. At veto si lac ventrem subducere valet sua humidita- te, id dispositū tantum, ac per accidens facit: prout alium humefare pōt: Idēq; anequi copio- sē lac, ad hoc efficiendū propinabat vsq; ad 16. heminas. Hinc nunquam lac solūm praebant, quinimo vna cum lacte ipso mel, aut sal, vel vtrunq; commixturam exhibebant, vt proritando, vē- tē subducere, vt seq. c. videbis: Vnde humiditas disponit: proritā vero pñit aliu subducendū.*

*Cardialgia qui
bus primo die
seu quarto cre-
dit.*

*1. De morb. vul.
scd. 1. agro 1. 1.
2. Delirium quib.
negis ab Hippo-
cratis primo
die contingit qd
purgantibus 1.
3. De m. vul. scd.
1. agro 1. 1. 1. 1.
4. Quibus scdulo
die 1. non sculo
crepit.*

*Aut quinto die
Vel sexto die.*

*Aut septimo die
crepit.
Aut octavo.
Aut nono.
Vel ante quan-
tum decima vi
die quanto deci-
mo.
Sed per se febris
aut quibus cepit
primo die.
In 1. de m. vul.
scd. 1. 1. 1. 1.*

*Vel octavo die.
Aut quinto die.
Vel sexto die.
Seu septimo.*

*Aut octavo.
Vel nono.
Aut undecimo.
Aut ante quan-
tum decimo.
Vel octavo die
nono.*

magnis annectitur, oris quidem ventriculi dolor, seu morbus est; quem Hippocrates obma-
ximam consensum, quem cum corde habet, cordis dolorem appellavit: & quem cardiacum
seu cardiacum affectum omnes Medici vocant. Quod sane die primo aggritudine apparuit in
Philini vore; in Muliere, quae in mendacium foro agrotabat, & in Nicodemo: Die vero quan-
to in Epicratis vore. Aliud vero symptoma, quod septissime morbis acutis, & magnis medi-
delirium sanè habetur, quae paraphrenitis dicitur a calidioribus, & mordacibus humoribus
cerebrum ledentibus prodium Galeni sententia ex Hippocratis mentis promulgata. Quod qui-
dem primo die aggritudine caput in Pythione; in Muliere ea morosa, in Philetico, atque in U-
lealeis vore. Secundo vero die caput, in Erasino, agro octavo libri primi de morbo vulg. & Philis-
ta, agro quarta libri tertij de morbo vulg. scd. 1. 1. 1. 1. nec non in Adolescentulo, qui in mendacium fo-
rum decumbat. Tercio autem die in expeit in Philiso, in Jileno, & Muliere trimessi scitu vtero ge-
renti, & in Cherione, in tertio agro libri tertij de morbo vulg. scd. 1. 1. 1. 1. in horto decumbenti &
in agro decima libri tertij de morbo vulg. scd. 1. 1. 1. 1. nec non, in agro undecima sequenti, & in Nicodemo
Abdera; atque in Lausie vixim. Et vero quince die inivum habuit, in Dromedari vxo-
re, in Hermocrateque. Sexto autem die Herophonti agro 3. libri 1. de morbo vulg. scd. 1. 1. 1. 1. &
agro duodec. lib. 1. de morbo vulg. scd. 1. 1. 1. 1. & agro quarta decima Melidice nomine Cyzici Mu-
lierc non agro 1. libri tertij de morbo vulg. scd. 1. 1. 1. 1. atque Anaxioni Pleuritico, ac tandem Cynice Mu-
lierc contingere cepit. Sicuti die septimo afficere incipit Epicratis vorem, & aggritudine duodecima
lib. 3. de morbo vulg. scd. 1. 1. 1. 1. Veluti octavo die mentem perturbare ingressum fuit Philini vxo-
ris, & Mulieris agro 1. lib. 3. de morbo vulg. scd. 1. 1. 1. 1. & agro tertij sequentis 1. 7. Nono autem die
ludere cepit Euryanactis filiam: Ante quartum decimum diem mens turbata esse incipit Apol-
onio Abdera, & Adolescentulo Melidice agro 1. lib. 3. de morbo vulg. scd. 1. 1. 1. 1. Die vero quatuor-
decimo Abderae Virgo desinare cepit. Quartum autem symptoma delirio oppositum, quod ab
Hippocrate vocatur, & a Galieno coma somnifera, & cataphora nuncupatur, & ab Arabibus
suber, seu subecia appellatur, quae sanè propensio inevitabilis ad somnum est ut Galienus, atque
sanè ex frigidioribus, & pituitosioribus humoribus prodit, in cerebrum fluentibus; siue primo
die aggritudine incipiat, ut Oecetari vori contigit, & agro primo lib. 3. de morbo vulg. scd. 1. 1. 1. 1.
qui supra Diarum idè decumbat, & quo symptoma die tenebantur agri in 3. de morbo vulg.
scd. 1. 1. 1. 1. Vel tertio die appere, ut Dromedari vori accidit. Sicuti sexto die Melidice euenit,
& septimo die Mulieri in littore decumbenti agro 1. lib. 3. de morbo vulg. scd. 1. 1. 1. 1. nec non Her-
mocrati superuenit: Et octavo die Mulieri in mendacium foro agrotanti agro 1. lib. 3. de morbo
vulg. scd. 1. 1. 1. 1. Nec non nono die Pythioni. Atque undecimo die Mulieri, quae apud aquam
frigida in Thalo agrotabat: Et Apolonio Abdera ante quartum decimum diem. Ac tandem
quarto die agro in De aleis horto decumbenti contigit. Quae sanè symptoma ab humo-
ribus fluentibus promanant: Sicuti a crudis, & iniis febribus prodit: Vnde ibi effectuum ceterarum
causarum adiungit, contrariusque curationis indicationes addit. In febris namque augmento, seu statu
existente, ob humorum cruditiem, & quibus alias causas quiescere tenemus: symptomatum
vero causa propter humorum fluxionem, illico eos euacuare humores cogimur: Verum cum sepe
humores illi fluentes, etiam simul turgentibus sint, quatenus una cum symptomatibus eorum
querentes sint, ac vires prostrantur: Ideo sepe quoque eos euacuare leuiter, aut saltem nec crude
humores agitentur, eos ualide reuellere, seu demare deuincimur. Quamobrem tunc humores
seorsum contrarij compositi simul, in eodem corpore egrotante certissime inueniuntur. Vnde
tunc omni ingenio, ac praestant vescantibus hi lucci reuelli sunt.

C A P V T X I X.

Ex quatuor recensitis symptomatibus, in duobus tantum Medici aliqui
phaenigmis, vtuntur: Alij autem Medici in omnibus quatuor vesi-
cantia adhibent, & cur hoc discrimen sit,
ostenditur.



Medicorum autem nostro suo, nonnulli pro cacochymis morborum reuellen-
dis, ac demandis magnitudinibus, in praenarrata patientibus symptomatica, co-
mentibus succis praestant, tum frigidas, ac humidis quidem sua uirtute, tum cal-
idas, & siccas, a motu humorum tantum antipastica retractione indicata; in
medicamentis acris, reuulsiva, ac de iurata cutis admovent, quae phaenigmis, &
uiscantia vocant: Alij uero non a motu solum talia praesidia molenda indi-
ci rectè arbitrantur. Verù, & a frigiditate, ac humiditate, uel utriusque humoris fluxione, uel actuali
partis,

habetur, quam ratione habita sine eo experimento processu sensato, cum in eo experimento nihil mortuum vidisset. Ceteroq; ratio, Gal. nota fuit, post experimentum ex laesione à fortuna desumptum, in corporibus equalidis, aut pichocolis in media contra Diarrhoeos. Unde rationabiliter, in ijs, ait & in summo vigore etiam, nec non ante accessionem eos esse ascendos: A fortuna autem, ex iuvamento viperarum, vipersa quidem vt medicamentum ad Hippocratem tollendam inuentum fuit: Deinde ratione illius rei, à natura viperarum ex haustu, postea ad experimentum à consensu factum transiit fecit, donec experimentum inductionis acquireret Galenus sic in reliquis rebus medicinalibus certitudo inuenta fuit: primò processu experimento sensato singularium, vt sensibiliom; Cum Hippocrates asserat nullum ex his, qua sola ratione concluduntur fructum percipere licet, Verum, quæ operis in experimento ratione simul demonstrarentur habere: Vnde statim Hippocrates. Nec verò agris, quæ etiam extra vulgum sunt, quibus calamitosa vis morbi non satis violenta esse videtur, nisi & medici imperitia se illi consociaret. Sed de his quidem hæc sufficienter deservisse iudicium quod nupè hoc Jollan, quæ ratione colliguntur fidere oportet, nec etiam his, quæ sola operis demonstratione. Periculi enim plena, & ad errorem præcepti est assertio, quæ sit cum nugacitate. Quare & universa, quæ sunt explorata, & comperta esse debent, & circa eadem singularem non sentit, exteri, si quis faciem, & incipiam habuimus, quæ medicinam votamus sibi invicere vides, & Animum hanc ad observandum docere desit, & Quocirca à iuvamento, aut laesione habita, in agris delirio laborantibus, & cardialgia ab experimento, seu à fortuna desumpto, dolore superueniente thorum, aut brachiorum, iuvante, seu ladente, seminum per accidens efficiente, vel vigilas, humorique ex pendentem consequente, vel recedente, ac peragitante, vel febrem augente, vel remittente. Namque si dolor iuvante excitandus quidem erit phænigmis flammula huius, vel Scilla, aut vtrique, aut thapsia, seu ranunculo, aut alio, vel calamitosa admoventes, aut si mulieris chantharidibus, & c. Sin è contra dolor talis laesit, vtrique curandus semper erit. Ergo quædam, agros ab Hippocrate descriptos, quibus dolores supercrescunt perpendamus, nempe Herophontem, Clazomeniæ, Epicratem, & alios agros.

CAPVTVLXXXI

Dolorem phænigmis inducendum esse, reuulsivum, ac derivativum, in paraphrenitide, & cardialgia, ex Hippocratica doctrina, experientis, rationibus, ac exemplis certa facta, demonstratur.

De rebus his recte ad rationem dicitur Hippocrati. Et Herophontem talis casus in ea, vt de laboribus crucium reuulsivis, curavit. Non ea quæ ad ventum poterit. Primum delirio fulorem fuit. Secundum dormiens. Tertium somnolentia in vena coctura signo ex parientis. Et vena bene coctura sic.



Hippocrates enim ait: Delirium Herophontem sexto die contingere, et pisse: septimo despicbar, sub nocturno ad mentem rediit, obdormiuit. Ollano febricitabat, lien residebat, omnia intelligebat. Et hic notat digressissima hæc sunt, quæ perpendo, ita inquit. Dolui ei inquam primum, seu cordium lienem, deinde in vtriusque tibiæ dolore, demigraverunt, noctem facilem habuit. Urina erant melioris coloris, & residuoque, in his paucis. Tertia namque ex his doloribus reuulsivis, molumenta confecta fuerunt, nimirum intelligebat sine delirio noctem facilem habuit, non autem ex dolore, (vt aliqui putant) vigilas fuit, immo somnus, reuulsis humoribus à capite, ad crura, ac in vena. Signa quidem concoctionis humorum instantium apparere ceperunt, non autem peragratio, neque recedescencia, vt aliqui falso existimant. Vnde Galenus in commento ait, ad vtriusque tibiæ dolores: Atque hæc symptomata in causa fuerunt, quam ob rem commode nocte haberet etiam minax primam coloris melioris, quæ paucum haberet, & album sedimentum, quippe tantum ijs doloribus reuulsivis adeo cordis calido iuvato, exonerato, molumenta habuit, vt sicuti Hippocrates ait. Die sequenti, qui novus erat validior iam facta natura cum sudore est indicata tamen relicti humoribus morbificis non exierit, ex quibus recidivus fieri solent, ait Hippocrates. Die quinto rediit, simulque silentium febris acuta furditas huius. Tertiū residivam tertio die residuo licet, immo inebat furditas. Ac vetò quoniam iterum errata dolabant: Ideo etiam denuo nocte sudavit hinc etiam rursus indicat: usque ad diem septimum decimum. Neque in recidiva deliravit, causa enim huius rei quidem, vt ait Galenus, fuit. Tanti scilicet erat discedisse, quæ molestia erant ad partes imas, vena concessio. Quare reliquias quasdam habebat prorsum humorum, quæ recidivam quarto decimo die excitabant, à qua omnino est die septimo decimo indicata. Oportet ergo rationem fundare supra hoc experimentum sensatum, ac supra alia experimenta illi experimento similia, & a quibus, de quibus infra dicam: quæ ratio quidem tota opposita alij rationi aliorum Medicorum sine vilo experimento sensato desumptæ habetur. Quæ ratione profectio ita exhausta, ab incute opera, quam huic Arti medicæ dare capis, statim in quacum.

De subdugum
pica c. 28. lib.
p. 20. lib. 2. ad
Galen. c. 20. de
v. sing. mod.
fac. c. 2.
lib. 2. p. 20. p. 21.

Lib. 2. p. 20. p. 21.
Anthonio lib.
112.

C
1. Videl. c. 28. p. 20.

D
1. Videl. c. 28. p. 20.
Lect. ante de
v. sing. lib. 2. p. 20.
lib. 2. p. 20. p. 21.

A quacunque occasione delirium febri cacoethi iunctum curandi, ad expectimentum, & consulto quæsitum accedi, vesicæ bus dolore cruribus inducto; explorando, an emolumenta, quæ Herophonti ceciderunt, alijs omnibus ægis mens contingerent, necne: & hoc vetique feci introspectiens eam controvertiam, tum inter scriptores, tum inter præstantes æqualiter, pro utraque opinione tuenda rat. ouis veluti Achilles possidentes. Vnde ex quo, vt veritatis istius controethis integritatem indagarem, hoc experimento ita me gessi, vt iuramento solenni asseuerare valeo, id. m. quod Herophonti euenit, omnibus quoque meis ægotantibus euenisse, beneficio doloris inducti, modò allato, si sit. m. incipiente delirio moliti fuerint phlegmi, non autem in delirio vigoroso, vel in eius augmento: Fluxiones namque illico reuulsione sistendz; non autem fluxione iam facta, tunc enim euacuazione illius partis egemus, non autem reuulsione. Quam sanè ob rem perpetuo eo dolore crurum perpenso tum vt symptomate lædente, tum vt symptomate salubri, & iuuante, certissimè magis, magisque longè scilicet iuuat, quam læsit, sicuti ex Hippocrate explorante habetur, ea enim symptomatica remedia vique salubria certa fuisse, iuuantia, vt etiam Galenus in commento inquit postea transferunt ad veranque tibiæ dolores. *Atque hæc symptomatica in causa fuerunt: quam ob rem commodè nosse haberes: Etiam minxit urinam coloris melioris, qua paucum habebat, & album sedimentum. Max die sequenti qui novus erat, cum sudore est indicatus. Tanti scilicet erat discusse, que molestia erat, ad partes imas, urinamque concoctio. Eamque sanè ob causam error, ceterè patet illorum asserentium dolorem tibiæ vesicantibus excitatum, si febrem augete, humoresque peragitare, seu tectudæ facere, ac vigilias concitare: Cum totum appareat in contrarium, sensata notitia certa ita infinitis experimentis, febrem eo dolore remitti, humores crudos quadantenus concoqui; neutiquam peragitari; somnumque denique conciliari; hinc etiam ægos vrique curari: vt berce perfectum vniuersalis rationalis experimentum inductione certissimum iam iam exploratum penitus habuerim: Neque defunct alia, ab Hippocrate tradita experimenta, id ipsum comprobantia. Quandoquidem Clazomenius. Die quarto de nocte desipit, Quinto cum labore omnia ingrauescant &c. Septimo decimo iterum tenus urinæ facit secundum veranque autem tumor cum dolore, nulli erant summi, delirabat. Ceterum, quoniam tunc etiam postea erra illi dolebat, Eamque sanè ob dolorem reuulsimum, Vigesimo die febre liberatus est, & indicatus, non sed alias prorsus mente constitit: & ait Galenus, si ad iuncta habuisset urinæ crassas, vigesimo die omnino redisset ad sanitatem, quod dies decimus septimus sit vigesimo indicatus, hinc ante quadagesimum diem, quia urinæ reddidit crassas, Tubercula aurium residerunt. Quadagesimo die oculus dexter illi dolebat, obfusior erat visus ad statum suum redy. Vltimus Epieratis vix puerpera, quarto die febre acuta cardinalgia, ac vigiliæ laborabat: Urinam tenues subnigra: sexta die, qua illam febris corripuerat sub nocte delirauit. Septima omnia sunt exacerbat, vigilias, delirauit, sitibunda, deiectiones omnes biliose siccæ. Octauo die riguit, plus quiescit. Nono eadem erant. At vtro cò, quod decimo erra magno dolore affuebantur. Proinde facta humorum reuulsione non delirauit, ac etiam eo dolore extitente dormiuit plus venter restitit. Ceterum sedato crurum dolore eo reuulsivo, Decimo, & sexto ingrauescant omnia cetera, nocte magna cum molestia non dormiuit delirauit. Cum autem decimo, & octauo sitibunda, lingua torrida somnum non exegit, nullaque delirauerit: Verum, quoniam iterum subinde crura illi dolebat, quo reuulsorio auxilio quid, magisque iterum, facta sit, vomuit biliosa, pauca, nigra. Quocirca perpetuo pro comperto habere post crurum dolorem reuulsiuum a corde, & ad caput, instantem febrem remitti, humorum concoctionem subsequi, somnumque effici: deliriumque sedari, sicuti etiam alibi ait. Qui insania corripiuntur, ipsi dolor ad pedes soluit: sedato vero dolore reuulsivo ipso, delirium augetur, febres magis incalcescit, humores prauiores redduntur, vigilique fiunt. Quarta autem historia apud Hippocratem habetur, Cleonætidis febre, doloreque sinistri lateris laborantis; cui circa diem vigesimum quantum extremas manus dolor superuenit, à quo sanè dolor deciuatius natura, validiorque facta vomuit biliosa, plura, & paulo post virulenta: hinc etiam, ac non aliunde euncta remissa sunt. Adde, quod æger qui in Deaelis decumbebat horto, femur licni subiectum doluit, præcordia dextra mollisens emendebantur, nocte non dormiuit, delirauit aliensitulum. In hoc autem ægro cum dolor in vnico crute esset, reueller quidam non potuit fluxionem à dextris præcordijs, ad cor, & ad caput faciam: immo quòd in aliene dolente, & insensito fæmore pariter dolente abscessum fieri videbatur, vt Galenus adnotauit, tamen eo beneficio reuulsivo, æger ille quadagesimo die sanitati restitutus est, ac dyarthra, simulque vniuersali sudore iudicatus est: cum post femoris dolorem sexto die reerementa nigra, pinguis, spumosa, viscosa, virulenta, excreta fuisse, natura cordis iam facta valudior: Vnde subinde de quiescente menti meius constabat. Ac etiam qui genua, & tibia dolebat quindodecimo die. Præterea Addere Virgo, qua in vestibulo templi ægotabat, febris capis acuta, & ardens. Cum*

Tempus vesicantia insignitum in delirio nempe in paraphrase situde.

Non symptomatica si febribus, per accidens, vt reuulsione attrahit ita à noniostib. parib, ad ignobilissima.

Idem probatur ex Clazomeni historia.

Idipsum ex Eod. causa videtur in historia decembris.

Idem ex istiusmodi historia habetur. Cõtempnitione digram.

Id est ex Diacris historia habetur. Cõtempnitione digram.

Idem historia item copiosius.

antea

s. Epidem. lib. 3. c. 40.

s. Epidem. lib. 3. c. 40.

la com.

De indic. morbi p. 70. l. 1. c. 1.

s. Epidem. lib. 3. c. 40.

s. Epidem. lib. 3. c. 40.

In com. contap.

s. Epidem. lib. 3. c. 40.

antea iam delirauerat, Vigesimo illi pedes dolebant, surditas, & delirium eam deferuerunt, A
 qua reuulsione facta, segregatim cum sanguinem inutilem ab utili iam separatis, expul-
 trix subinde fuit causa, ut aliquantum à naribus profluxerit: Vnde sudamit febre fuit libe-
 rata. Quertio, & vigesimo repetiti, redit surditas & pedes assidue dolebant, mente excludi:
 Vigesimo septimo multum sudant febre caruit, surditas eam reliquit, restabat pedum dolor,
 cetera ideoque fuit exacti liberata ratione doloris reuulsui: Porro Hecropyto Abdera.
 Vigesimo multum ex naribus sanguis profluxit, mentisque consilium magis, surdis quidem, sed
 non perinde fuit: sed febris fuerunt remissa, Ere ad diem sexagesimum narum quidem subissi-
 tis profluvium: licet ante quoque aderat paulatim erumpens, sed, eo quia dextera co-
 xendix admodum dolebat: Ideo febresque increuerunt. Haud multo post partes inferiores om-
 nes dolebant. Vnde sanè profluvium ex naribus sanguinis, reuulsione à dolore molita,
 sedatam fuit, quod profluvium cum iudicatorium esset, potius dolor ille incongruus
 fuit, quam secus, hinc febres grauior facta fuit: Proinde fiebat ut vel febres maiores es-
 sent, maiorque surditas: vel he quidem remitterentur, aliter autemque: Verum quoniam
 partes inferiores, ad coxendices sita vehementius dolerent. Idcirco etiam iam circa diem
 octogesimum cuncta remissa sunt, nihil tamen destitit. Etenim vrina boni coloris, & copio-
 siores, cum subsidentibus exierunt, delirique imminuta sunt. Centesimo est absolutè iudicatus.
 Quatuor hic autem contemplet, nempe, quod ille dolor, iudicatorio profluvio contra-
 rius fuit, & ut dolor coxendicis, non ita salubris est, ut dolor femoris, ac tibiurum,
 seu pedum est; tum eo, quod non longè distat à corde, & à cerebro, ut femora, tibiae,
 ac pedes; tum etiam quia in dolore ischiadico, non ita quiescunt, neque dormiunt æ-
 gri, ut in femoribus, tibiurum, ac pedum dolore; ex quo non ita cruda coquantur. Ni-
 hilominus potius iuuat, quam læsit. Omnes autem hi ægri dolore reuulsio sanati fue-
 runt: qui dolor, ut salubris est, semper utique supponit euacuationem aliquam in mor-
 bi principio iam factam fuisse: alioquin à maxima prauorum humorum copia omnino
 naturam suffocant, eo dolore reuulsio, saluari ægri nequeunt. Insuper dolor modera-
 tus esse debet. Tercio is dolor moderatè, non autem vehementer attractiuus fluxionis-
 que effectiuius adesse debet, & hoc modo reuulsus salubris erit: hinc eo, quia in Cri-
 tone, & in Larisse Caluo hæ tres deserunt conditiones, proinde obierunt. Præterea,
 cum dolor is tantum blandè reuulsus sit; Ideo vnius partis solum dolentis dolor uti-
 que satis non est, immo utrique parti inesse debet: Porro etiam si dolor vehementer at-
 tractiuus, reuulsusque esset, nec etiam sufficeret quidem in vniuo crure, tum qua
 fluxionis utriusque partis generis venosi sursum ascendentis reuulsio deorsum certè non
 fieret, immo duntaxat vnus partis, cruris dolentis, tum, eo quod si etiam utriusque
 partis fluxio tiuelleretur, non tamen vnum crus sufficeret, ad eam totius generis veno-
 si succorum peccantium reuulsam recipiendam, & retinendam copiam, ut Critoni ceci-
 dit. Hippocratis, & Galeni mente. Ex quibus habebis, has quatuor rationes, & expe-
 rimento statutas conditiones reuulsio, salubri, & iuuanti dolori phænigmissi inducto, in-
 esse debere. De dolore autem, in cardialgia excirando, in tibijs, ac femoribus andiamus
 quæso Galenum, affuerantem experimento, ac ratione, ac iterum experimento ratio-
 nem certificante inductuonaliter. Ceterum quod stomachum saepe cum valenter morderetur o-
 leum protinus dulcissimum bibitum sanauit, & iniectum totius ventris, mordicationes leniit, &
 à thapsia, urtica, & scilla in eum iniectum sedauit: eorum mentionem Archidamus non fecit.
 Hæc enim medicamenta calida sunt, acris, ac mordacia, tenuiūque partium: hinc
 etiam humores tenues à centro, seu profundo, ad circumferentiam, seu ad altum attra-
 hunt: ut etiam de calaminta, inquit Galenus. Trahit enim, que in profundo barens ad
 superficiem, veluti etiam canteria, & quatuorque medicamenta calida sunt, & acris, tenuiū-
 que partium. Ea ratione quidam ipsam contra corporis conuersiones, rigoresque per circuitum,
 repentines adhibuerunt: foris quidem oleo iniecit, toti corpori iungentes cum frictione non
 segni: humores namque acres, mordacesque, ut bilioli sunt; in venoso genere, ac in
 toto corpore subsistentes, per cutim euacuati valent: tum balneis tepidis, ac vnctioni-
 bus rarefacientibus, frictionibusque validis, diaphoreticis que prædijs externis, ut pec-
 culariter dicam, vbi de secunda, tertie, & quartæ regionis cruditatibus rectè curandis
 verba facere nitæ. Verum enim verò istatam sententiam complector (si syncope non
 imminet superuentura) quia bilis in hepatis cauo residens, & cardialgiā pignens, per
 cutim, & per vias nobis notas educit nequie, nisi incommodè: cum hepatis eam, ac
 mesenterion in prima cruditatum regione sint, neque humores huius primæ regionis ad
 eam extrahendi sint, quoniam tunc tota massa sanguinea fortassis coingnaretur, &
 hinc plurima frequenter incommoda: Eamque sanè ob causam humores illi incommodè
 tantum vomitur, ac deiectione educuntur per vias nobis notas: tamen etiam commo-
 dè à natura per vias nobis ignotas euacuetur. Ac quoniam cardialgia (ut antea iam
 ostensum

Septima histo-
ria idem afficit,
179.

7. Epid. com. 3.
150.

Quarta hic
historia eadem
dignissima.
179.

B

Secundum ac
tertium.

Quartum nam
quædam requiri-
tum ad vtrius-
que doloris
subiecti crura-
tum.

3. Epid. com. 3.
150.
3. Epid. com. 3.
150.

C

Idem.

In cardialgia
grægia liperhi-
mi utrimque
cui subleuatur
& syncope. De
morbo: viderit
vbi hic famo-
ribus aduocan-
do congruis esse
ostenditur.

3. De Simp. mod.
fac. 13.

7. De Sim. mod.
fac. 13. de cala-
mintis.

D

11. Meth. c. 6. de
c. 6. de 1. 10. de
1. 10. de 1. 10. de
1. 10. de 1. 10. de
1. 10. de 1. 10. de

4. De Sim. mod.
fac. 13.
11. Meth. c. 3.

Lib. 1. de mor-
magn. 140.

Ad oculum 6.
nalem istius a-
gris, de quoque
lorem imponen-
do redigunt.

laborabunt, perpetuo religiosa, & accurata premeditatione, rectè phanigma allata propo-
nam. Ist hæc autem omnia, me disputasse volui, donec ex in veritatis huius rei consequenda
gratiam: ut, hoc auxilio rectè admoendo, meis agris maximum inferre valeam emolumentum,
non autem secus; quia Medici qui oppositam manutinent opinionem, instat eorum.
sunt, qui in præceptoris verba iurarunt, & qui neutiquam vinci possunt, neque rationi-
bus, neque experimentis: immo neque eadem veritate ipsa, à sua falsa existimatione di-
moueri valent.

Finis Libri Secundi.

